




Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
2806/A







Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
2806/A





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
2806/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
2806/A



coll.

2806

A.

N XIV

16/8

supp. not. 36.



# DE STIRPIVM COLLECTIONE TAB

BVLAE TVM GENERALES,  
TVM PER DVODECIM MEN-  
ses, cum Germanicis nominibus, & alijs ha-  
ctenus à nemine traditis, olim per Conra-  
dum Gesnerum conscriptæ ac æditæ: nunc  
auctoris opera locupletatæ, & de no-  
uo in vsum Pharmacopolarum  
luci datæ,


PER CASPARVM WVOLPHIVM  
*Tigurinum Medicum.*

ACCESSERVNT DE STIR-  
pibus & earum partibus tabulae ex Theo-  
phraستي præcipuè libris confectæ,  
eodem Gesnero auctore.

TIGVRI  
IN OFFICINA FROSCHO.  
ANNO M. D. LXXXVII.

*26.n.17.*







# CASPARVS VVOL

PHIVS TIGVRINVS MEDICVS,

D. LVCAE STOECKLIO PHAR-

macopolæ Constantiensi fideli & in-

dustrio, amico suo

S. D.



VANTVM in medicamento-  
rum, quæ in vsum medicum ad-  
uocantur, tum in vniuersum o-  
mnium, tum verò potissimum  
stirpium ipsarum, exacta cogni-  
tione situm sit, id ipsum, vir industrie, abunde  
testatur, non solum ea voluptas, quæ foris ocu-  
los, & animum intus mirifice afficit atque ob-  
lectat, & præterea honestas, quæ ex cognitione  
manat, & sola hominis est ornamentum: verum  
insuper & quidem cum primis hæc ad benè fæ-  
liciterq; viuendum vtilitas, qua nihil magis se-  
cundum naturam est. Quum enim Deus Opt.  
Max. pro sua diuina prouidentia facile nouis-  
set, quis esset futurus hominis status aut condi-  
tio, quæne in morbos præceps & perpetua rui-  
na: varijs hisce morborum incommodis, varia  
quoque, eademq; admirandis viribus prædita  
antidota statim opposuit, ne qui modò in lucem  
esset æditus homo, aut per omnem reliquam vi-



## EPISTOLA.

tam miserè degeret, aut penitus ab exortu statim succumberet atq; periret. Quin insuper eadem etiam, & ea ipsa cognoscendi, recte q; iisdem utendi notitiam studiumq; ingenuit: quod propensissimæ erga nos suæ voluntatis argumentum est. Hinc nimirum, quia maximam esse huius cognitionis præstantiam paulatim homines persentiscerent, eorundemq; usu, naturæ humanæ imbecillitati subsidia magna cõparari, quotidianum comprobaret experimentum: factum est, ut omnis generis & conditionis, summæ, infimæ, homines: ὧς φιλοῦσι αὐτὰς πᾶς ἀνθρώπος καὶ οὐδεὶς τὴν ἑστίν, quotidie ad observandum, & amplius experiendum studio & animi quasi quodam impetu ferrentur: id quod multorum nostri & superioris seculi scripta selecta luculenter testantur. Nam quia hæc materia varia & multiplex, proindeq; non vno tantum modò afficiat, delectet, & ad sui cultum inuitet: pro cuiusq; ingenio & voluntate, modò hæc eius partem, modò illam familiarius tractare, studio seq; excolere singuli instituerunt: Sunt etiamnum, & ante hæc fuerunt tempora multi, qui externa tantum stirpium facie oblectati, sexuum inuenerunt discrimina, partium singularum lineamenta curiosius obseruarunt, & singulis ingeniosas insuper descriptiones affinxerunt: quæ  
perfecto



## EPISTOLA.

perfecto cōtemplatio, vti per se est incunda gratia, ita quoque in medico vsu, sua non destituitur utilitate. Plurimos contra videas admirari, reconditam illam interius, penitusque abditam formam, solam miraculorum omnium, quæ hodie in medicina passim & multa & magna fiunt, effectricem causam: facultates dico, cum specificas & occultas, tum manifestas, hoc est, primas, & eas quæ has proximè sequuntur. Atque hi quidem, dum quod querendo experiendoque sunt consequuti, omne ad communē vitæ vsum contulerunt, laude egregia apud quoscunque sunt conspicui, inter doctos verò amplissimis dignitatum titulis clari. Caterum ad comparandam absolutam huius contemplationis studiique notitiam (dummodo quod profuturum nouimus, ad vsum vitæ conferendum quoque arbitremur) præterea etiam requiritur diligens & accurata Præparatio: & qui hanc rectè præcedit, in colligendo asseruandoque cum ratione Delectus: in quibus duabus partibus, commentando exornandoque, haud perinde multos speciatim laborasse nouimus. Quantum verò referat, quamque sit necessaria tum Medici tum Pharmacopœe diligens & exquisita circa stirpiū, earundemque partium ad vsum collectionē conseruationemque industria, (de præparandi namque ratione hoc loco non agimus) sæpe hactenus ipse nos rerum



## EPISTOLA.

euentus satis superq; docuit. Qui enim hac in  
 parte committuntur errores, quæ temporis lo-  
 ciq; curiosam rationem & tempestiuam expo-  
 scunt obseruationem, plerunq; non ægri solùm  
 valetudinem in discrimen vocant, sed ipsius  
 quoq; medici, quantumuis præstantis famæ exi-  
 stimationiq; periculum creant, nec nisi peniten-  
 do, quicunq; sic error commissus fuerit, corrigi  
 potest. In grauem errorẽ inducunt, nostramq; ex-  
 pectationẽ prorsus decipiunt compositorum vi-  
 res, si, quibus ea constant, facultates ignauæ &  
 inertes, aut prorsus obsoletæ fuerint. Proinde  
 non sine ratione Galenus in Theriacæ compo-  
 sitione, simplicia omnia & quidem singula seor-  
 sim eam componentia, diligenter exploranda  
 præcipit: ne tota antidotus inutilis reddatur:  
 ἢ ὡς ἐν τῷ δὲ γὰρ, inquit ille, πῶς ἂν  
 ἡ φάρμακον πᾶσι. In idẽ studiũ nobis quoq;  
 quotidie medicamenta præscribentibus, incum-  
 bendum est, vt ea, si modo profutura speremus,  
 theriacæ nomen & antidoti, contra præsentis  
 morbi vim, habeant, ea tantũ assumendo, quæ  
 fuerint viribus integra, & in suo genere præ-  
 stantia. Quid enim quæso attinet, simplicium fa-  
 cultates nouisse, si nullæ insint? putare autem  
 inesse, quum non insint, quod colligentis siue in-  
 scitia siue negligentia, non naturæ vitio acci-  
 dit, viri



## EPISTOLA.

dit, viri prudentis non est. Magna igitur medicina nostræ pars in medicamentorum delectu posita est, maior medici gloria, & maxima eorum spes. Solatium ingens est ægrotis, si medicamentorum auxilia præsentia esse viderint: in maiorem verò spem eriguntur, quum de inuentis præscriptisq; remedijs, & eorum integritate nihil penitus sibi dubitandū nouerint. Hæc aliaq; cum satis nota essent Gesnero nostro, putauit suo labore & studio huic necessitati obuiam eundum. Quare ante multos annos, de herbarum, florum, fructuum, & c. colligendi tempore, & conseruandi reponendiq; modo & loco, tabulas generales & particulares edidit, breues quidem illas, pro occasionis nimirum præsentis ratione, alterius verò operis, & plenioris considerationis, quasi quoddam rudimentum. Atque hoc suum propositum persequutus procul dubio fuisset, si Dei voluntate ætas ei fuisset prorogata. In eum namq; finem, paulatim plura obseruare & consignare cœpit, quæ ad locupletandū exornandūq; priorem laborem spectabant. Verum haud incommode, quum per fati necessitatem suum perficere institutum ipse prohiberetur, voluntatem eius promouit hoc tempore, quo res necessariae omnes in angustum sunt contractæ. Typographus noster, qui, vt interea dum ad Germanorum πτυχιπετες ipse descendit, in suoriæ



## EPISTOLA.

operariorum gratiam, ut illorum nimirum domesticam necessitatē subleuaret, hunc qualemcunque à me flagitando, impetrauit. Quaecumque igitur ipse vel studio obseruauit, vel quotidie in hortulo proprio producta vidit, eadem nos, pro ut ipse instituerat, duplici ordine, secundū florum fructuumque tempora disposuimus. Alphabeticè primum: ita enim initia & fines florendi, fructificandi, commodè indicari, & quæ de vna stirpe hactenus diuersis in locis scripta legebantur, coniuncta & simul apparere, putauit. Deinde verò iuxta primum institutum, sed breuius, etiam secundum Menses, adiectis plerisque Germanicis appellationibus. Ad generalē verò tabulam accessit, ex clarissimi Matthioli in Dioscoridem commentarijs, de eodem argumento, quod placere poterit. In frontem in super totius libri retulimus generales aliquot de stirpibus, ex Theophrasti magna ex parte libris, depromptas tabulas, nec inelegantes nec inutiles: quas, si per paginae spacium licuisset rectius diducere, & membra membris opponere, multò elegantiores & ad vsum aptiores apparerent. Cæterum hunc Gesneri libellum, & meum in eundem collatum laborem, tibi vir spectatissime, offero & multis de causis dedico. Ac primo quidem, quod cognitum habeam, te authoris, quandiu in viuis esset & obseruatorem semper  
& ami-



## EPISTOLA.

& amicum extitisse. Deinde, ut quoniam hic liber præcepta & instituta præscribit, quibus futuri Pharmacopolæ instruendi informandiq; sunt: tuq; ipse eius artis usu excellis, præceptisq; egregie præ cæteris abundas: per te tyrones non officij solùm sedulò admoneantur, sed tyrocinij sui etiam rudimenta deponant, rectiusq; ad praxim accedant. Ad has accedit præterea etiam ea, quam ipse iam pridem tum domi tuæ lautè accipiendo, tum hic familiariter conuersando, multis tuis humanitatis & beneuolentiæ officijs mihi præbuiisti. Ne itaq; ingratus omnino videar, meam vicissim tibi hoc ipso probatam volui voluntatem. Rogo igitur te, ut hanc qualem cunque animi grati significationem, hilaris vultu excipias, & boni consulas. Vale.

Tiguri calendis Maij, anni

1587.

\* 5



CONRADVS GESNERVS M B  
dicus Tigurinus Nicolao Speichero  
pharmacopolæ Argentinensi  
peritissimo S. D. P.

**D**Auid Kyberus Argentinensis, felicis memo-  
riæ vir optimus & doctissimus, diligentissi-  
mo suo Rei herbariæ Lexico Tabulas temporum,  
quibus singule stirpes florent aut fructum æde-  
rent, ceu corollarium adiungere statuerat: Id verò  
eius propositum mors immatura interceptit. Huic  
igitur ego suauissima amici memoria inuitatus, vt  
aliquo modo satisfacerem, quantum per occupa-  
tiones meas licebat, eiusdem argumenti Tabulas  
conscripsi. Tibi verò in primis, optimè Nicolae,  
nuncupare eas volui, non tantum quod professioni  
tuæ, in qua excellis, coueniant, tuq; easdem ali-  
quando augere ac perficere possis: sed magis quia  
Kyberus utriq; nostrum amicissimus fuit, vt eius  
amissi hoc veluti solatium quoddam haberes, &  
me quoq; propter communis amici memo-  
riam amares. Vale Tiguri anno Salu-  
tis 1553. pridie Nonas Aprilis.

D E



DE VSV HARVM TAB-  
bularum.

**T**ABVLAE istae non pharmacopo-  
lis tantum, tyronibus praesertim &  
minus exercitatis, utiles sunt futu-  
rae, sed omnibus stirpium notitiae  
studiosis. Qui cum singulis fere mensibus ver-  
nis, aestiuis & autumnalibus, partim cognitio-  
nis, partim animum remittendi & corpus ex-  
ercendi gratia, rusticatum exire soleant, occa-  
sionem ex hisce tabulis capient, quanam eis  
plantae potissimum quaerendae aut sperandae  
sint. Libuit autem non medicis tantum usitatas  
stirpes, & quarum necessaria pharmacopolis  
est cognitio, hic enumerare, sed quasuis simpli-  
citer quae nunc in mentem mihi venire potue-  
runt: & de quibus mihi quo tempore florerent  
aut fructificarent constabat, reliquas sibi quis-  
que suo loco addet, vel nos aliquando si vita  
diuinitus prorogetur: neque enim unius aus  
alterius anni hoc opus est. Atque ita non me-  
dicinalis tantum haec per anni tempora dige-  
stio stirpium fuerit, sed etiam physica & philo-  
sophica. Sic Theophrastus & Plinius non re-  
medijs modo quaesitas, sed omne genus stir-  
pium, cum aliter tum secundum tempora qui-  
bus quaeque florem & fructum addunt dif-  
ferentis, descripserunt. Sed quoniam coeli &  
regionum discrimen facit, ut plurimae descri-



ptæ à veteribus stirpes apud nos non proue-  
niant, & illarum quæ proueniunt tempora nō  
respondeant, operæpretium visum est vt nas-  
centium apud nos siue sponte, siue satione tem-  
pora distincta notarentur. Scio etiam in vna  
eademq; regione diuersitatem reperiri. Diffe-  
runt enim in singulis loci, humiles, æditi, aq-  
uonares, austrini, opaci, aperti, vmbrosi, apri-  
ci, vento expositi, tecti vel non expositi, aquo-  
si, aridi. Memini ego me in altissimis monti-  
bus Augusto mense & autumnii initio, eadem  
ferè omnia quæ in planis Aprili & Maio nas-  
cuntur, reperisse, violas florentes & varios  
flores vernos, fraga maturescencia & matura,  
&c. Quin & pro annorum diuersitate hyems  
aliàs magis, aliàs minus extenditur, & annus  
alter altero magis minúsue pluuius est. Itaq;  
fit vt nihil his de rebus omnino constans &  
perpetuum tradi possit. Rursus verò non adeò  
incerta hæc ratio est, vt nullum in ea descri-  
benda operæpretium habeatur. Quamobrem  
volui pro vnius regionis, hoc est Germaniæ  
nostræ, vsu, has tabulas conscribere, partim ex  
observationibus meis cum alijs tum ambula-  
tionum & rusticationum mearum, partim ex  
Collectaneis amici cuiusdam philiatri, qui  
quo stirpes quæque florem fructumq; æde-  
rent tempore ex Hier. Tragi & Leon. Fuchsi  
illustribus per Germaniam nostram scriptori-  
bus, per singulos menses annotarat. Quod si  
non



non per omnia satisfecerit hæc diligentia nostra pharmacopolis cæterisque rei medicæ studiosis, cogitent hanc lucubrationem hac de re & primam & extemporaneam esse, & sibi quisque ubi voluerit vel emender vel augeat. Nullo enim periculo tum omittere multa, tum labi in quibusdam, hisce tradendis potuimus, ut facilius nobis non dico venia danda (neque enim grauibz istis & ut sibi videntur doctissimis scribimus, à quibus exoranda sit venia,) sed potius gratiæ agendæ sint à candidatis medicinæ & benignis ac æquis lectoribus. Cæterum ut pluribus prodessem, non singularum duntaxat stirpium tempora, sed insuper communes quasdam observationes statim ab initio proponere visum est, ut appareat minimè nobis placere pharmacopolas collecturos certis anni temporibus astrictos esse. Et quanquam illi quibus generalis hæc colligendi doctrina intellecta fuerit, singularium enumeratione non admodum indigeant, arbitratus sum tamen eam quoque nec iniucundam nec prorsus inutilem futuram.



ACHILLES P. GASSARVS L.  
*medicus, Conrado Gesnero medico.*

**C**VM aliud nunc opere precij ad te  
scribendi non habeam, Conrade do-  
ctissime idemq; amicissime, volui saltem  
veteris nostri amiculi carmina ista ad te  
mittere, vt simplicibus tuis vel extremo fo-  
lio adderes. Bene vale cum tuis omnibus.

CARMEN IO. MOIBANI MEDI-  
ci doctoris Augsburgensis, continens ca-  
talogum medicamentorum purgan-  
tium simplicium, quorum nunc  
vsus in Myropolijs est.

**S**VNT suspecta satis Tithymallus & Esula quæuis  
Et quod habet nomen flebile Dacridij,  
**Est** Turbith turbans, sic Hermodactylus is qui  
Colchicon est, seruis perniciofa salus,  
**Euphorbiq;** liquor, sed & Anticyræ medicamen,  
Quodq; solet viduas reddere Mezereon,  
**Sic** nec amara placet Colocynthis, & ipse lapillus  
Pulchro stellarum cœrulus igne micans,  
**Namq;** hæc callosus vel carice textus acuta  
Venter, quo ferrum rustica turba coquit.  
**Aut** stomachus similis rugosis arte cothurnis  
Militis indomiti dira Aconita coquens,

Vix



**Vix impune feret, vel si feret, ardua res sit,**  
 His quæ tormentis subdere colla iubet.  
**¶** Contra civili qui gaudent lege medendi,  
 Et quibus haud vlla est poena luenda grauis.  
 His plenis baccis frondescat Prunus in horto,  
 Et placeat quiuis Irida murus habens,  
 Et suæues spirent Violas in cespite prata,  
 Ornent & pulchras pulchra Roseta domos,  
 Nec desint Manna Calabrorum roscida mella,  
 Et fuluum quod dat Barbara terra Raued,  
 Indorumq; Thamar, Balanusq; Aloëq; Cetrachq;  
 Lymphatas vndas & Galathea ferens,  
 Soldanella, Filix, Ebulus, Sena, Cassia, Nitrum,  
 Et veteris Galli mollia iura placent,  
 Absinthi, Capniq; liquor, vel Agaricus illis  
 Sit cura, tuto quæ redimenda salus.

#### ERRATA . CORRIGENDA.

ἀγαθήλας α, pag. 24. b. Differentiæ sunt, p. 22. a.  
 in præfationem, p. 42. b. in pratis, p. 71. b  
 Saurfle/ pag. 123. b.



CO

GES

TIV

PLA

my

D

A



# CONRADI GESNERI DE PAR-

TIBVS ET DIFFERENTIIS

PLANTARVM PHYSICA SY-

nopsis, secundum Theophrastum, Plinium &

Dioscoridem: in tabulas methodicè dige-

sta, introductionis vice ad quas-

vis stirpium historias

legendas.

**P**HILOSOPHI nostri omnē  
ferè de plantis consideratio-  
nem nō solum quæ historiam,  
sed etiam quæ causas attinet,  
partim ad rem medicam, par-  
tim rusticam reiecissee videntur, vt in pleris-  
que etiam alijs Philosophiæ amplissimam  
professionem circumciderūt, vt ipsis, quan-  
tumuis in paucis vtcunq; eruditi, philoso-  
phos se profiteri minori negotio possent,  
hoc est videri magis quàm esse,

PLANTA, stirps, *φυτόν*, corpus est na-  
turale compositum, animatum, telluri ceu  
parenti, vt alimentum continuè attrahat, af-  
fixum, speciem suam de se propagans, loco  
immobile, insensibile.

A



## TABVLAE STIRPIVM

Stirpium aliæ sunt

Herbæ,

Frutices,

Minores,

Arborescentes.

Suffrutices, herbæ lignosæ, quarum cau-  
les non pereunt quotannis.

Arbores

Iustæ

Fruticosæ.

Quædam fortè ad certum genus vix  
referas, vt sunt Viscum, Fungi, Cora-  
lium, Lens palustris.

## DIFFERENTIAE STIRPIVM

*unde sumantur.*

Loci, à quibus stirpium & partium singula-  
rum differentia sumuntur, in historijs  
Dioscorid. Plinij, Theophra. &c. sunt vel  
i Substantia,

Secundum genera & species planta-  
rum, vt

Arbor.

Herba.

Frutex.

Olus.

Legumen, &c.

Secundum



IN GENERE.

2

Secundum corporis cōstitutionem  
& partium cōcrementum, οὐσυστασις,  
compactionem,

Durum.

Molle.

Densum.

Rarum, vel partium

Tenuium

Crassarum.

Alias tactiles qualitates secundas,  
Quod singulæ vel habent vel non ha-  
bent partes aliquas.

2 Quantitas.

Numerus.

Magnitudo.

3 Qualitas.

Actu & sensibilis

Communis,

Figura

Similitudo

Vnius,

Duorum aut plurium.

Propria

Tactui

Graue, leue, Asperum, lene,

Durū, molle. Lubricū, aridū.

Crassum, tenue. Rarū, densū.

A 2



# TABVLAE STIRPIVM

Visui

Fulgor.

Color.

Odori

Graueolēs, virosum, fœti dū.

Inodorum,

Acre, acutum.

Odoratum,

Suauiter, fragrans.

Caput tentans, grauans.

Gustui

Insipidus, ἀποῖστος.

Dulcis.

Amarus.

Acris, acidus, &c.

Potentia & occulta qualitas. Ab in-  
sito autem calore nostro ex potentia  
in actum producitur.

Prima,

Calidum

1. Obscurē.

Frigidū

2. Sensibiliter.

Humidū

3. Vt ledat sensū.

Siccum

4. Vt destruat sē.

In quarto gradu delibutoria,

δηλητήρια, venena sunt.

Secundæ qualitates à medicis di-  
ctæ, omnes sensibiles sunt, odorū  
præcipuè & saporum differentię.

Tertiæ,



IN GENERE. 3

**Tertiz**, quæ priuatim ad aliquam corporis partem aut morbum facit, propter qualitates, vel propter totam substantiam, & vim aliquam occultam, vnde dicuntur alia

Cephalica  
Ophthalmica  
Cathartica  
Diuretica, &c.

**4 Situs**, locus natalis totius plantæ. Et partium situs singularum.

**5 Tempus**

Ortus  
Occasus  
Maturitas.

**6 Actio**, sed hanc inter qualitates retulimus, quæ si per verbum aut verbale actiuum efferatur, huc pertinet.

**7 Vfus**, ad aliquid, vt ad

Medicinam  
Cibum  
Potum  
Condimenta & voluptatem  
Alia diuersa, vt olea, &c.

Hominum  
Brutorum.

A 3



TABVLAE STIRPIVM  
DE STIRPIVM DIFFERENTIA.  
*quatenus vel hyemis ferunt inclemen-  
tiam, vel non ferunt.*

Ex stirpibus sunt quædam, quæ hieme aut  
Pereunt, idq; vel  
Penitus & totæ, quarum multæ sunt.  
Ex parte, idq; aut  
Caule tantum, seruatis folijs circa ra-  
dicem : cuius generis ferulaceæ  
pleræq; puto sunt.  
Folijs tantum, seruato caule, vt ple-  
ræq; arborum, fruticum, & suffru-  
ticum: Solanum perpetuum.  
Floribus tantum: vt Leucoia.  
Superficie tota, vt Inula.  
Manent, idq; secundum  
Totum, præterquam flore: sed consili-  
go, elleborus, & paucæ aliæ etiam flo-  
rent hyeme.  
Partibus, vt supra dictum est.

PARTES STIRPIVM AN-  
*nue & caducæ.*

Præcipua, & propter quam cæteræ sunt, Se-  
men seu fructus, σπέρμα, καρπός. Licet  
fructus nomine ferè semen vnà cum am-  
biente



IN GNERE. 4

biente pericarpio comprehendatur, vt in

Pomis, ὀπώεα

Sine ofsibus

Cum ofsibus, inter quæ nuclei latent, πυρήνες.

Nucibus, ἀκρόδρυα

Acinis, ῥάξ.

Baccis, Baccæ dispersius rariusq; enascuntur, in hoc ab acinis, qui densius proueniunt differentes. Constant autem acini & baccæ

Carne

Succo

Nucleo.

Vinateis, γίγαρτα, in acinis vitium.

Sanfis, ofsiculum oliuæ.

Acinorum congeries in vite vua, in reliquis etiam corymbus vel raze-  
mus, botrys nominatur. Licet raze-  
mus propriè sit, qui & Scapus quo  
acini fulciuntur.

DE DIFFERENTIA STIR-  
pium circa semen & fructus.

Semine quædam carent, vt

Adiantum \*



## TABVLAE STIRPIVM

\* Polypodium

Trithomanes

Asplenon

Phyllites

Filix vtraq;.

Fructum non proferunt arbores infelices,

ob hoc dictæ, Salix Homero ὠλεσίκαρ-

πη: Similiter tamarix apud nos.

Semina quædam

Præueniunt

Flores

Florum instar paniculæ.

Fouent & tuentur

Folium, φύλλον

Pes

Pericarpia.

Fructus

Præcoces

Serotini

Nunquam maturenscentes, vt

Labruscæ, ὄμφακες

Grossi, ἐεινέοι, in caprifico.

DE DIFFERENTIA STIR-  
pium circa flores.

Flores, ἀνθή, nam alijs sunt

Duplices, διανθή, quod violæ Martiæ tri-  
buitur : & floribus illis, qui stamina  
quædam



# IN GENERE 5

quædam seu crocos, quos & apices vo-  
cant, in medio habent, veluti filamenta  
ab intimo floris sinu: cuiusmodi Pli-  
nius in belli flore pastillicantes barbu-  
las dicere videtur.

Multiplici folio, *σαυπόδια*, gefüllt Blü-  
men: quod arte fit.

Rosæ

Violæ

Caryophylli

Pes corui

Bellis

Malua.

Aquilegia

Bacilli, Moosblumen.

In pappos (*πάππες*.) id est, lanuginem  
quandam deciduam abeunt.

Lactariæ multæ, vt Lactucæ

Syluestres

Hieracion vtrumq;

Sonchi

Chondrillæ

Gerontopogon.

Domesticæ.

Cardui omnes, Atractylis, Scolymus,

Chamæleones, &c.

Et aliæ quædam, vt

Senecio \*



## TABVLAE STIRPIVM

Gramen quoddam palustre,  
Alopecuros quibusdam.  
Vnius folij in calathi formam, vt in  
Conuoluulo  
Maiore : rudimenta naturæ lilia fa-  
cere condiscendis, Plinius.  
Minore , qui Helxine cissampelus  
videtur.  
Iasone.  
Solano Romano.  
Rapum syluestre. Vuulariæ.  
Calathiformes  
Plurium foliorum  
Diuisorum vndiquaq;, vt lilium.  
Continuorū infra, vt rapū syluestre.  
Vnius folij, vt conuoluulus.  
Quatuor foliorum, violæ matronales.  
Pluriū foliorū, vt rosa à quinq; ad centū.  
Folij florū crenatis.  
Exemptiles,  
Borago, Alsine syluatica.  
Buglossus,  
Cynoglossus  
Radiati singuli, per singulos coliculos,  
Bellis  
Maior,  
Minor.  
Gerontopogon.  
Hieracium.

\* Caly-



- \* Calycibus plurimi includuntur antequā  
dehiscant, quo tempore in rosis alaba-  
stros (à valorum forma) & nymphas,  
*νεμφας* vocant, quòd recens appare-  
re incipiant.

Pendentes à

Siliquis, vt in

Herba S. Antonij,

Maiore,

Minore.

Rhododaphne puto: species filio-  
rum ante patrem.

Petiol s.

Flores, *ἀνθ* sunt vel

Florentes

Particulatim

Cū in vna ceu panicula infimi prius  
& alij paulatim post florent.

Bellis item particulatim floret.

Vniuersim.

Muscosi, nudi calycibus, multi, parui, con-  
ferēti, molles. Sunt qui spongiosam  
hanc florum congeriem, muscum ap-  
pellent: vt Ligustrum, Barba caprę, Ru-  
bea, Galion, Cruciata.

Inordinati.

Ordinati & digesti per

Corymbos, vt Androsæmon



## TABVLAE STIRPIVM

\* Paniculam (aliqui iubam vel comam vocant.) quæ sublonga vel subrotunda effigie tumet, veluti lanosa coma, in

Milio

Panico

Arundine

Iuncis

Et graminis generibus aliquot.

Muscaria vel umbellas : quæ sunt in orbem radiatæ herbarum comæ: cacuminaque in fascies coacta, à flabris similitudine, cuius ventilatu muscæ à conuiuis abiguntur. Aliàs Umbella floris seminisq; pedamentum est, in plures digestum longiores pediculos, qui simul ex fastigio eodem orti, in latius continuò radiantur, in orbem circumactum. *Σκιάδιον* ab effigie umbellæ muliebris, qua faciem à sole & æstu defendunt. Apij genera omnia umbellas habent, & his ferè longiuscula, simplex & neruosa radix est.

Verticella, *σφονδύλια*, quæ caulium & ramulorum artus ambiunt & coronant, vt in marrubio, clinopodio: ab instrumenti muliebris similitudine, quo



IN GENERE.

7

\* quo fusi vertendi gratia vtuntur.

Spicas, *σπικα*. Quanquam fortè magis  
ad semina siue grana hoc ordine di-  
gesta quàm flores hoc nomē accom-  
modetur.

¶ In spica, quæ olim specæ, à spe, con-  
tinentur

Grana.

Grano minus

Summum

Frit.

Vruncum.

Infimum,

Gluma, grani inuolucrum.

Solisequi

Heliotropium, per excellentiam ma-  
ius & minus.

Seris, cichorium.

Lutei ferè omnes, & aureo colore  
splendidi, vt calendula, pes corui.

Bellis & radiati pleriq;

Colocassia.

Pilei acuti specie seu cucullati.

Aquilegia, seu Angelica.

Aconitum

Cœruleum

Flauum.

Staphis agria.



## TABVLAE STIRPIVM

Flores, ἀνθ, sunt vel

Foliati, in quibus lata & distincta folia  
sunt. Muscosi enim pilei formes, nō pro-  
priè foliati dicuntur.

Vngues in rosis & foliatis floribus. Sunt  
imæ foliorum partes quibus in capite  
suo cohærent.

¶ Florum colores sigillatim persequi in-  
finitum foret.

¶ Quæ in floribus à figuris dicta nomina  
vsurpâtur, eadē in feminibus similiter.

Florum instar est panicula, quæ dicitur

Cachrys, καχρυς, pilula Plinio, in

Larice

Picea

Platano

Iuglande

Tilia

Abiete.

Iulus, ἰγλ, in auellana, sic fâçle.

Nucamentū, κύτταρον, præcipuè in nu-  
cibus, deinde in illis etiâ, quæ (Græcè)

Canchryn ferre dicuntur.

## STIRPIVM PARTES QVAB

*semen fouent ac tuentur.*

Folium de quo supra.

Pes, petiolus.

\* Peri-



## \*Pericarpium,

Vas, vasculum, theca, loculi, inuolucrum,  
conceptaculum seminis.

Folliculus, de diuersis pericarpijs di-  
citur, de calyce, gluma in spica &  
membranosa cute acini.

Calyx, ἀπὸ τῆ καλύπτειν, folliculus  
quo flos primū, mox seminis fœ-  
tus clauditur. Sic etiam in glandibus  
vocatur, vulgò cupula.

Gluma, tenuis grani tunica. Acus  
purgamentum frumenti leuissimū,  
pars glumæ inde acerosum.

Siliqua, λοβός, valuulus peculiariter  
in leguminibus. Aliæ

Obliquæ vel dependentes, vt legu-  
minum, quæ singulæ & longio-  
res visuntur.

Erectæ, breuiiores, quinæ ferè, vt  
Aconiti cœrulei & flauī, & sta-  
phis agriæ puto, & Aquilegiæ.

Corniculatæ vt in Cardamomo.

Scutulatæ figuræ.

Lenticularis figuræ.

Folliculus vt in ormino, nomen quod  
sciam non habet.

Vulga, instar sacculi pecuniarij:

Caput, (vt in papauere, κώδιον, fortè



## TABVLAE STIRPIVM

\* in carduis etiam, vt cinara, caput dici potest) loculamentis, id est, paruis capsulis distinctum, in quibus absoluta semina sunt. Quædam sine capsulis sunt, vt polemonion, flos Iouis.

Folliculo

Vndiq; adhærente

Inani, vt

Halicacabus,

Verbitne fūchle / frutex arbore-  
scens.

Echinus, pluribus, vt in castanea.

Murex (in tribulo) paucioribus.

## FOLIORVM DIFFERENTIA.

Plantæ aliæ aut

Sine folijs sunt, vt

Spartos

Cuscuta

Adiantum Apuleij.

Habent folia.

Crenata, id est, ferrata, per ambitumq;  
secta.

Fimbriata, quæ in ambitu in quasdam  
fimbrias exeunt.

Laciniata, membratim per flexuras di-  
\* gesta,



\* gesta, vel natiuis segminibus dissecta. Lacinie enim partes sunt extreme de coris causa concise, orarumque summarum cæsuræ. Sic Vetonici sylvestris genus quoddam floribus est laciniosis. Sunt tamen qui laciniosum pro sinuoso usurpent.

Stellata, quæ etiam radiata dici possunt, vt

Rubiæ

Cruciata

Aparines

Horum omniũ geniculati sunt caules, folijs genicula ambientibus.

Bina, terna, quaterna, &c.

In vaginis condita, vt graminis, canariæ, tritici, iridis, & similium.

Striata seu canaliculata, singulis, vel pluribus canaliculis, vt cyperi, pseudocyperi.

Annua & caduca, vel decidua: non decidua

Lanuginosa, γναφαλοειδῆς, vt gnaphalij, dictamni.

Aculeata, vt chamæleontis vtriusque, cinaræ,

Hirsuta, vel mollioribus aculeis præ-

B



TABVLAE STIRPIVM

dita, vt auriculæ muris vulgò.

Leuia.

Splendentia, vt aconiti.

Non splendentia.

Aspera.

Pingua, vt lilij & testiculorum genera  
varia.

Stipulæ, folia sunt culmum ambien-  
tia.

STIRPES ALIIS QVIBVSDAM,  
*rarioribus partibus diffe-  
runt, nempe,*

Lanugine quarundam folia coliculiq; cane-  
scunt.

Mucro est acumen, in quod partes quæcun-  
que definit, vt spinæ omnes, folia multa &  
quædam filiquæ.

Vmbilicus id in pomis est, quod in eis me-  
dium vel prominet vel conditur.

Spinosa.

Semine, vt spanacia, tribulus.

Seminis conceptaculo, vt quæ echinos  
proferunt.

Folijs tantum, spina

Molliore, & figura magis quàm reipsa,  
vt asparagus, corruda.

Durior



\* Duriore, vt Iuniperus.

Caule tantum, vt geinstella suffrutex.

Caule & folijs.

His omnibus, quæ acanacea dicuntur,  
vt cardui, caule, folijs, & pericarpjijs,  
(non ipsis feminibus) spinosi.

TABVLA STIRPIVM SEM-  
per virentium.

Ex stirpibus semper virentibus, aliæ

Tota superficie semper virent, vt in

Arborum genere

Citrus & cognatæ, Laurus.

Buxus, Hedera.

Coniferæ omnes excepta larice

Glandiferæ pleræque: nam ne nostra  
quidem quercus omnino nudatur  
folijs. Ilicum genera, Coccus, Aquifolia.

Sabina vtræque.

Fruticum genere, pauci puto: an philyca, Iasminus.

Suffruticum genere

Odorati,

Samfucum, Thymus, Rosmarinus.

Chamæcyparissus. Salvia

Lauendula, Spica, Hyssopus

Clematis prima. Veronica atilis &  
similia.



## TABVLAE STIRPIVM

Coronarij plerique omnes, vtpote lignosi.

Herbarum genere.

Αἰάριος, vt adiantum, trichomanes, filices vel omnes vel mihi notæ saltem.

Quæ liquorem habent,

Acrem duntaxat, vt tithymalli: qui & florent in exitu hyemis aut prius.

Quibus folia & superficies tota densior solidiorq; est, vt

Chamæpyxus.

Elleborus niger.

¶ Item quæ nullo certo genere continentur.

Coliculis summis.

In fruticibus,

Periclymenum

Cytisus, non tota, sed magna hyemis parte apud me in horto: ruri nondum obseruare potui.

In suffruticibus, Chamædaphne horti mei.

Circa radicem tantum. Herbæ

Quæ liquorem habent

Copiosum, dulcem aut subamarum, Tragopogon, Cichoracea omnia, an sic & Lactucæ.

\*

Paucum



\* Paucum in ferulaceo genere, & si  
quæ alia fortè ἐνοπα sunt,

Olera

Satiua, apium.

Syluestria

Annua ferè ab autumno ad sequen-  
tem æ statem durantia.

Bellis, pastinaca sylvestris, arthritice

Bulbi pleriq;, hyeme amittunt superfi-  
ciem totam: pauci seruant circa radi-  
cem folia,

Lilium album

Crocus, hyeme præsertim viret: æ-  
state se oculit, vt & cylvaminus, a-  
risara, &c.

Bulbine maior.

Stirpium aliæ

Semestres, à vere ad autumnum.

Annua, & totæ pereunt hyeme: nisi  
fortè autumno serantur.

Bimæ, aut longioris vitæ: & harum  
aliæ hyeme

Virent

Totæ

Radicibus.

Non virent, sed radicibus integris  
superficiem amittunt.

Τριεῖς, πολυεῖς.



## TABVLAE STIRPIVM

¶ An pauciora sunt, quæ superficiem totam amittunt.

¶ An quæ semper virent etiam πολυ-  
χρονιώτερον sūt: & magis si etiā florēt

¶ Virent semper lignola potius quam alia: & quæ liquorem habent: hic enim eis pro sanguine est, calidior & concoctus, crassior, (nam succus aquosus tenuior facile gelascit,) inter arbores, quorum lignum densius est. Ideò & in calidiorib⁹ locis plura semper virentia inueniuntur: quia nec frigus magnum est, nec si esset tantum efficeret.

## TABVLA EX LIB. IX. CAP.

VIII. Theophrasti de hist. stirp.

De vsu partium plantarum.

Ex plantarum partibus aliàs utilis est

Radix fit autem radacidium. ῥιζοτομία.

Paucissimarum vere, vt ischiades radix  
πλεται τῇ ἡρῳ.

Plurimarum, autumno post Arcturum, cum folia deciderint: vel postquam decerptus fuerit fructus, si quarum fructus utilis est.

Eleborus autumno maturus est, vere imma-



\* immaturus.

Pauciorum æstate, ( ὑπὸ πυροτομίαν,  
καὶ μικρῶ πρῶτερον ) per messem tri-  
tici ( vt bryonia puto ) panaces in  
Syria.

Radices colliguntur

Totæ

Minores tantum, vt in elleboro.

Liquor, ὁπός. Et hic aut fluit

Sponte, vt tragacanthæ.

Sectione ( ὀπισμὸν vocant. )

Caulium in plerisq;, vt tithymalli,  
lactu cæ.

Radicum, in paucis.

Capitum, vt in solo papauere.

Et horum si succus

Abundet, πολύοπα, vase excipiunt,  
vt tithymalli siue meconij.

Paucus sit, lana, vt lactuca.

Succus, χύλισμα, in ijs qui paucum & a-  
ridum succum habent. Fit autem suc-  
catio, ( χυλισμὸς ) vt quæ vrentes, aut  
torrentes aquamque infundentes ex-  
primunt.

¶ Succus radicum aut est fructu

Infirmior, vt cæteris omnibus.

Vehementior, vt cicuta & thapsia.

B 4



TABVLÆ STIRPIVM  
DE STIRPIVM PARTIBVS, EA-  
rumq̃ differentijs. tabulæ duæ Theophrasti de  
historia plantarum libri primi, capi-  
tibus quatuor prioribus, adie-  
ctis quibusdam ex cap.

17. 19. & 20.

Omnes plantæ humorem calorémque si-  
bi insitum quendam possident. Humor  
autem vel

Dicitur humor, vel liquor (succus,  
ὕψον, ὀπός) & si quidam distinguunt,  
vt & lachrymam, δάκρυον. Hic parti-  
bus omnibus cōmunis est, nihil enim  
est quod careat humore.

Differunt humores vel ratione. Vide  
Plin. lib. 13. 28.

Coloris. est enim quidam lacteo simi-  
lis, vt fici, papaueris.

Odoris. est enim odoratus, aneso, ce-  
drulæ, apio, fœniculo, & similibus.

Saporis. est enim alijs

Vinosus, vt viti, moro, myrto.

Acidus, vt punico & quibusdam malis.

Sed omnes qui huic generi contribu-  
antur vinosos putandum

Dulcis, vt fico, palmæ, castanæ.

Acris,



**Acris**, vt origano, fatureiæ, nasturtio,  
synapi, thymo.

**Amarus**, vt absinthij, centaurij.

**Pinguis**, vt oleæ, lauro, nuci, amygdalæ, pino, larici, abieti.

**Aquosus** siue dilutus (*ὕδαρής*), vt pruno, viti, piro, malo, cucumeri, cucurbitæ, lactucæ.

**Consistentiæ**, (sic nobis diuidere & nominare libet;) vt in abiete, pino, omnibusq; coniferis resinaceus. Huc fortè referri potest etiam lacti similis liquor supra nominatus.

¶ Vnaquæq; planta vt temperamentum proprium, ita succum quoq; peculiarem habet, quo à cæteris omnibus differat. Licet enim pericarpia quarundam stirpium sapore similia videantur, in ipsis tamen seminibus eorumq; tunicis differentia percipitur.

¶ Vniuersæ arborum plantarumq; partes cognationem quandam habent tota cum natura, quanquam odore saporeq; differant, sic vt aliæ odoratæ & benè sapidæ sint, aliæ inodoratæ insipidæq; omninò.

Sunt enim alijs, (ab odore differentia sumpta.)

\*

B 5



## TABVLAE STIRPIVM

- Flores odorati, folia inodorata.  
Contrà, vt coronarijs, quorum folia &  
rami magis olent quàm flores.

Neutrum.

Radix, aut alia pars.

- Sapor, succúsue ad cibum aptus in  
vna parte, in altera ineptus: vt arbo-  
rum aliquot fructus hominibus e-  
duntur, folia non item. Tiliæ contrà  
fructus pecora non attingunt, folia  
edunt pleraq.

## TABVLA DE STIRPIVM *partibus secunda.*

In stirpibus considerantur

Partes, μέρη

Essentiales

Similares, ὁμοιομερῆς, vbi pars quæ  
libet idem nomen cum toto ha-  
bet. Harum alia

Priores

Nervus, ἵς, hic simplex est,  
nec diuiditur in ramulos.

Vena, φλέψ: hæc crassior est  
neruo, humorē continet,  
& in ramulos finditur.

Caro, σὰρξ, quæ quoquo  
versus diuiditur, inter ner-  
uos aut venas sita.

• Hæ



\* ¶ Hæ partes sic nūcupantur per analogiam ab animalib. petitam.

Posteriores, quæ ex priorib. constant.

Cortex, φλοιός, qui flores ambit & se parari potest. Constat aut ex prioribus, vel

Tribus, neruo, humore & carne, ut roboris, piri, populi nigræ.

Duobus,

Humore & neruo, ut vitis,

Carne & humore, ut suberis.

Lignū, ξύλον, hoc fissile est, id est, in longū diuiditur. Cōstat è neruo & humore: quædā etiā è carne, ut quæcunq; per etatē durefcunt & lignefcunt, ut raphani radix.

Matrix, μήτρα, ligno ambitur: aliqui cor, alij medullā vocāt. καρδία, μυελόν.

Sed καρδία, ppriè est durior matrix, ut εντερία, laxior.) Constat ex humore & carne.

Dissimilares, ανωμοιομερείς, & maiores, ut pote ex similaribus compositæ, & primæ quod ad sensum: quæ & organicæ dicuntur. Et harū quædā μονοειδείς sunt, ut tibia, cubitus: quarū particulæ nominibus carent. Aliæ πολυειδείς, ut caput, cuius partes nūcupantur oculus, nasus, &c. Sūt aut.



## TABVLAE STIRPIVM

\* Radix, ῥίζα, quæ alimentum attrahit.

Caulis, καυλός, qui in herbis tum

promitur (est enim seminis causa.)

cum parturiunt, siue eodem anno,

siue secundo, siue serius. Hinc in ar-

boribus caudex seu truncus voca-

tur σέλεχθ. Caulem alia

Habent, non tamen perpetuò,

sed annuum, vt quæ diuturnis

radicibus viuunt.

Non habent.

Ramus, ἀκρέμων, ὄζθ, qui è caudice

proximo oritur.

Surculus, κλάδος, κλών, βλάστημα:

qui è ramis nascitur, vt germina an-

nua maximè.

In stirpibus considerantur

Partes essentielles.

Annua, ἐπίτειοι, quæ non propriè par-

tes dicuntur, vt neq; embryon foetus.

Harum alia

Generationi inserviunt, (quæ ferè

omnia propter semen sunt.)

Folium, φύλλον. Horum alia

constant ex

Neruo, cortice & carne,

vt fici & vitis.

\*

Neruo



\* Neruo tantum, vt harundinis, frumenti.

Flos, *ἀνθός*. Forum alij constant ex

Cortice, vena & carne.

Carne tantum, vt qui inter lolia nascuntur.

Pediculus, *μίσχος*: à quo folium vel fructus hæret. Pediculorum autem alij constare videntur

Ex neruo tantum, vt harundinis, frumenti.

Ex eisdem quibus caules.

Plura de pediculis leges infra in differentiis foliorum.

Fructus, *καρπός*: hoc est pericarpium cum semine incluso,

Fructuum alij constant ex

Carne & neruo.

Carne tantum. Nonnulli etiam cute constant.

Carne & neruo, vt pruna, cucumeres.

Humore & cute, vt morum, punicum.



## TABVLAE STIRPIVM

Alij secus distinguuntur.

¶ Omnium (vt sic dixerim)  
pars exterior, cortex : inte-  
rior, caro: quorundā etiam  
nucleus.

Semen, *σπέρμα.*

Aliam ob causam accedunt in qui-  
busdam, vt

Muscus, *βρίον.*

Capreolus, *ἡ λίσξ.*

Propriæ quibusdam, vt

Robori, galla.

Viti, capreolus.

Partiū differentiæ: vel in eo quod quædā,

Simpliciter habent, aut non habent, vt  
folia, fructum.

Habent, sed

Dissimilia, *ἀνέμοια.*

Figura,

Colore,

Densitate (spissitate) raritate.

Asperitate, leuitate, & alijs huius-  
modi.

Sapore.

Disparia, *ὅτι* excessu vel defectu, se-  
cundum

Magnitudinem.

Multitudinem.

Dissimi-



\* Dissimiliter, *ἀντιόμοιως*, id est differente  
Situ & loco, vt fructum supra vel  
infra folia.

Ordine, vt rami

Inconditi, robori.

Ordinati, abieti.

**STIRPIVM ALIA DIVISIO GE-**  
*neralis, secundum differentias suas.*

Plantæ differunt

Natalibus seu loco. Sunt enim aliæ

Terrestres.

Montanæ

In Iugis montium, Bitterwurz.

Ad latera. Estreatium in saxis &  
præcipitijs montium. Flûblûmen.

Kor flûblûmen.

In planicie.

In vallibus.

In pratis.

Circa oppida.

Circa muros & sæpes.

In ipsis sæpibus.

Circa areas domorum.

In ruderibus.

Locis saxosis.

In muris vel saxis

Naturalibus,

Constructis.

In syluis.



## TABVLAE STIRPIVM

\* In arboribus vel truncis arborum

Viscum

Polypodium.

In hortis

In aruis, vt zizania

Quiescentibus

Non quiescentibus.

Syluestres.

Cultæ, vrbanae, vel propter

Fructum in cibo.

Voluptatem in

Colore, vt horti pensiles,

Odore.

Figura.

Vmbra, &c.

Ambiguae vel in vtroq; genere, vt  
cerasi. Vrbanae verò tantum nul-  
lae, aut paucissimae, vt etiam inter  
animalia.

Peregrinae, vt & aliae quaedam, & om-  
nes nobis Aromaticae,

Radice, vt zinziber, zedoaria,  
cyperus.

Semine, cardamomum

Cortice, cinnamomum

Folijs, vt malabathrum.

Liquore, vt balsamum.

Duobus vel pluribus istorum.

\*

Suae



\* Suæ cuiq; regioni.

Aquaticæ: proueniunt enim aliquæ in  
Paludibus

Plenis aqua, vt nymphaea, lens pa-  
lustris.

Resiccatis, adiantum Apuleij.

Fluuijs, potamogeton.

Mari

Corallium,

Fucus,

Alga,

Bostryches,

Ampelides,

Otacides.

Ripis & littoribus, vt fium, menta-  
strum, sisymbrium, Marinas di-  
xeris, in mari nascentes: Mariti-  
mas, iuxta mare.

Tempore differunt plantæ,

Partium anni quibus crescunt, aut vi-  
gent, aut fructum ferunt, &c. Sic a-  
liæ sunt

Per totum annum.

Vernæ.

Æstiuæ vel alsiosæ, vt ocymum.

Autumnales, vt caltha.

Hybernæ, vt elleborus niger.

Durationis, vt aliæ sunt annuæ, aliæ

C



## TABVLAE STIRPIVM

duobus vel tribus, vt angelica, laser. Vel pluribus annis durant.

Sexu, sic aliae dicuntur

Mares, nigriores, duriores.

Fœminæ, albiiores, fruticosiores, fœcundiores.

## DIFFERENTIAE STIRPIVM

*secundum partes, (quarum plurimæ ab animalibus mutuuntur nomina.)*

Stirpium partes aliae

Simples,

Compositæ,

Communes

Omnibus.

Plurimis.

Paucis.

## COMMVNES OMNIBVS ET

*simplices partes.*

1. Humor natiuus

Expressus, succus, χυμὸς.

E vulnere profluens, liquor, ὀπρὸς.

Lachryma, δακρύδιον. Est autem lachryma humor, qui statim defecto caudice



IN G E N E R E.

18

- \* caudice vel ramo, aut ipso ligno, profilit & apparet.

Lacteus,

Croceus, &c.

Gummi,

Resina.

2. Nervus fissilis est, per carnē & aliam substantiam meat. Fibræ verò seorsim etiam in radicibus procedunt foras, licet pro nervis aliquando accipiantur.

Pectines, ut vocant in ligno, nervi esse videntur.

3. Vena maior & crassior nervo, humorem habens & ramulos, in folijs apparet.

4. Interuētū, quod inter venas intercipitur.

5. Caro diuidi potest omnibus dimensionibus, cortici subest.

Pulpa in arboribus est, quod in animalibus musculus appellamus.

Tori, *κόνδυλοι*, prominentes partium tori, & in se pulparum modo collecti, unde torosum aliquid dicitur.

6. Tunica est tenuis cortex veluti membranaceus, quo arbor vel radix inuestitur.

Imò pars omnis suam ceu cutim & putamen habet. Cæpe folliculis tunicatum est.

In arboribus librum dicimus. Thallia dicitur cæpæ folliculus: In malo punice putamen, malicorium.

C 2



## TABVLAE STIRPIVM

*Partes aliæ ab animalibus dictæ.*

**Caput** dicitur

Infra, vt in bulbaceis, rotunda radice.

Supra, vt in papauere, vbi & *κωδίστιον*  
priuatim.

Caput etiam vocant extremam vitis par-  
tem, id est vltimum & productissimum  
flagellum.

**Vertex,**

Cacumen.

Frons, vt paulò post dicetur.

**Cerebrum** in palma.

**Medulla** pars similis, cor, matrix. *Hæca-*  
*lijs* est

Multa

Pauca

Fungosa & laxa

Compacta & solidior

Nulla, vt buxo, ebeno.

**Ceruix**, pars à capitatis radicibus prodiens,  
prælonga teresq;.

**Capillamenta**, fibræ, acetabula: vel cirri, si  
crispentur: in floribus quibusdam croci.

**Coma**, quicquid hilari venustate, crinium  
modo, summa ramorum vel coliculorum  
exornat.

**Iuba**, arundinacea coma effusa, qualis in mi-  
lio est, à iubis animalium. *Alæ,*



Alæ, Alarum caua, Sinus, *μυχάλαι*, ex quibus noua semper germinatio prodit: cum adnata nullam habeant certam partem vnde emergant.

Adnata, Adnascentia, Appendices, *παρὰφυσες*,

Caulium

Radicum.

Brachia, maiores arborum rami.

Latera.

Genicula, vel Artus, in geniculatis vel articulatis.

Caulibus, vnde polygonos & polycnemon dictæ.

Radicibus, vt polygonaton, arundo, doronicum vulgò dictum.

Internodium, inter genicula medium.

Pes, pediculus, petiolus, tenax, *μίσχθ*, quo folium, fructus, aut flos dependet.

Pars

Prona ad terram.

Supina, remotior à terra.

*Partes stirpium compositæ, communes plurimorum* RADIX.

Radix, oris instar, ad alimentum attrahendum, vt planta sit tanquam animal inuersum. Sunt autem aliæ

C ;



## TABVLAE STIRPIVM

\* Bulbaceæ, bulbosæ, capitatæ. Radices ipsæ bulbi dicuntur : eæq; vel sunt Tunicatæ, vt

Cæpe

Porrum, &c.

Solidæ, vt aliquatenus tamen distincta rubera separentur, vt

Croci

Liliorum.

Narcissi

Scillæ

Arundinum.

Oblongæ, vt in cartilagineis.

Simplices, (quod ad radicem scilicet, quæ recta in profundum agitur. & veluti stirps est) vt olerum.

Multiplices, fibratæ (per excellentiam nimirum, fibris enim omnino radicem nullam carere putarim) multis adnatis.

Rectæ,

Obliquæ,

Spongiosæ, vt asparagorum, quam radículas illigatas & connexas, ac multis irretitas capillamentis, spongas & spongiolas vocant.

¶ De radicum diuisione plura leges apud Theophrastum hist. lib. 7. cap. 2. & 3. Et rursus 7. 11. Et lib. 9. cap. 13. Item in Scaligero in plantis Aristotelis, fortè & in



Anticardano. Lib. 16. radices vocat fynecdochicè pro plantis, quarum radices in vfu medico sunt, &c. Herbas vero, quarum folia.

2. Pars à radice surgens in  
Arboribus, simplex  
Fruticibus, multiplex,  
Vt sunt codex, caudex, stipes. φιτέρις,  
σέλεχθ.

Stolones, μοχεύματα, inutilis fructificatio è radicibus : utilis tamen plantandis nonnullis, vt

Corylo  
Mespilo  
Fico  
Viti.

Herbis,

Caulis, καυλός

Scap<sup>9</sup>, in styli modū sursum proreptās,  
à columnaribus scapis.

Thyrus, rect<sup>9</sup> in virgulæ vel teli modū.

Culmus, κάλαυθ, in frumento.

E frugibus sectos, stramen, stramentum  
vel paleam vocant.

Virgultum furculus est, qui terræ committitur, vt in arborem insurgat.

3. Caulis

Mollis, vt amplexi caulium.

C 4 .



## TABVLAE STIRPIVM

Lignosus.

Leuis.

Striatus. Striæ partes sunt, quæ protuberant & eminent in longum.

Cauus.

Solidus.

Rotundus.

Angulosus.

Latus. Vnde lactuca, πλατύκουλθ.

Teres.

4. Amplexi caules,

Cum capreolis à capiendo, quibus adminicula complectitur vitis.

Cucumis.

Pepon.

Cucurbita.

Vitis.

Cultina,

Syluestris,

Labrusca, quæ fert ὄμφακας.

Caustica, aliàs Viburnum.

Alba, aliàs Bryonia.

Nigra.

Sine capreolis, clauiculæ.

Periclimenon

Volubilis,

Maior,

Minor.

Cycla-



- \* Cyclaminum alterum.
- Cassythæ, vulgo cuscutha.
- Lupus salictarius.

## 5 Cortex, cuius.

Partes

Tunica, extrior.

Liber, interior, in arboribus.

Differentiæ

Planus.

Asper.

Hiulcus, quibusdā veluti squammatus.

Tenuis.

Densus.

Colore etiam, &amp; alijs medijs differunt.

## 6 Rami, quibusdam nodi dicti.

Maiores, tabulata. Aliqui brachia scribūt esse ramulos.

Minores, ramuli, qui in furculos, furculi in germina desinunt. Vocantur & Asparagi seu Turiones, recentia germina stirpium, & tenerrima, quæ edendo sunt: vt Cymæ olerum, brassicæ maximè, delicatiores coliculi, in quibus florum calyces adhuc includuntur.

7 Termes, ram<sup>9</sup> cū folijs & fructu. ἑρπιδῶν.

## 8 Spadix in palma.

## 9 Crada in fico.

## 10 Viticulæ, ὀδόντες, id est dentes, &amp; flagella



## TABVLAE STIRPIVM

sunt, vt in vitibus & cucurbitis, oblongiores & productiores ramuli, qui longè vagantur & vicina complectuntur, olim flabella dicta, quòd ventis impetantur. Quidam etiam arborũ cymas flagella vocant.

11 Frons, pro ramo capitur, sed proprie est, quod ipse ramus circumquaq; producit, multa interdum folia habens, & nonnihil corticis ac velut cauliculi.

12 Virga ex radicibus, aut caudicis laterib⁹ exit, Soboles quibusdam dicta.

13 In vite palmites, è stirpibus ac furculis quotannis prodeunt, dictæ quod instar palmarum hominis virgulas quasi digitos ædant.

Pampini, frondentium ramusculorum comæ, coliculiq; fructum fouentes, & ab impendente vindicantes iniuria: hinc pampinare.

Sarmenta, prælongæ virgulæ, in quas vitis luxurians spargitur, id est, Vitis ipsius brachiorum & caulium ligna, tam dũ sunt in vite, quam dum excæta & exempta sunt.

Malleolus, nouellus est palmes, innatus prioris anni flagello, vbi deciditur ex veteri sarmento, prominens vtrinq;, & malleoli speciem præbens.

Palma,



Palma, maius flagellum, vnde nascuntur  
vux.

Propago grübzäben/ vitis vetula depres-  
sa, atq; in terram per inflexos arcus sub  
mersa, vt ex vna plures emergant.

Gemma vel oculus, in vite & alijs etiam,  
germinis tuberculum vocatur. Vide Ca-  
roli Stephani Vinetum.

**ARBORVM DIFFERENTIAE, EX**  
*Theophrasti de hist. plant. lib. 1. cap.*  
*5. & deinceps.*

*Nota asteriscis distincta poterant hic omitti,*  
*(quanquam Theophrastus ponat) quoniã*  
*infra repetuntur. Vt urbanae etiam & syl-*  
*uestres in differentijs locorum. Durum, læ-*  
*ue, pulchrum & contraria: corticis ferẽ*  
*aut ligni vel caudicis differentia sunt. Ad*  
*ijciuntur autem tanquam obiter, aliarum*  
*quoq; stirpium differentiae.*

**ARBORVM** differentia, quæ cæteris etiã  
stirpibus in plurimis accommodari pos-  
sunt, sumuntur ex his generalioribus lo-  
cis, nempe

- 1 A toto, siue tota substantia
- 2 A locis, in quibus proueniunt.
- 3 A partibus singularibus. Sũt autem
  - 4 Caudex.
  - 5 Rami.



## TABVLAE STIRPIVM

- 6 Cortex.
- 7 Lignum & caulis.
- 8 Medulla.
- 9 Radices.
- 10 Nodi.
- 11 Folia.
- 12 Semina.
- 13 Flores.
- 14 Fructus.

De quibus figillatim tabulis per numeros distinctis agemus ordine.

## ARBORVM DIFFERENTIA I.

*quæ à toto, vel quæ ad substantiam totam refertur, de qua  
Theoph. 1. 23.*

Sunt autem arbores alix

Urbanæ

Syluestres. quædam enim cultu deterioriores redduntur, vt abies, pinaster: & in omni stirpium genere, quæ loca frigida niuosaq; adamant.

Fructiferæ, steriles.

Germine vel fructu præcoces, πρωϊ-βλαστῆ, πρωϊκαρπα, ὁ ψίκαρπα.

Floriferæ, αἰθνηπα. Flore carentes, αἰανθῆ.

Magnæ.



Magnæ, parvæ. Itemque alię (quæ huc referri possunt, ex cap. 14.

Excelsæ, vt abies, & quæcunque simpliciore caudice assurgunt, nec radicibus nec ramis multis præditæ.

In profundum descendentes, (suis radicibus.)

\* In ramos illico sparguntur, vt mælus.

\* Ramosæ, & molem superiorem grandiore gestantes, vt punica.

¶ Fiunt autem hæc singula vel Natura

Arte & cultu.

- ¶ Adhæc plurimum refert alimentum, locus & cultus. Eadem enim si crebræ ferantur, excelsæ gracilesq; redduntur: si raræ contrâ. Et si statim ramos succidas, excelsæ, vt vitis: si relinquas, breues assurgent. Olera etiam nonnulla arboris figuram capeffunt. Omnia locis suis melius augescunt. nam & inter congenera, quæ suis in locis manent, enodiora, ampliora, pulchrioraq; extant. Et in totum sylvestris materies pulchrior & commodior & copiosior parte montis aquilonia, quâ meridiana enascitur.



## TABVLAE STIRPIVM

Duræ, molles.

Læues, asperæ.

Cortice.

Folijs.

Pulchræ, deformes,

Fructus

Boni

Praui,

Syluestres quidē plura ferunt: sed vr  
banæ meliora, suauiora, & in totum  
temperatiora.

Folia amittentes. Perpetuō virentes.

Plantæ quædam in totum folijs carēt.

A loco, differentia II.

Ex arboribus nascuntur aliæ in

Aquaticis

Paludibus, τέλμασι. Quædā palustres

(ἐλεια) omnino sunt, vt salix, & pla-  
tanus.

Lacubus, λίμναις.

Fluuijs.

Mari

Minores, in nostro.

Maiores, in rubro.

Plantæ quædam nisi in solo madente  
nasci non possunt: quædam nascuntur  
quidem, sed longè deteriores.

Aridis



Aridis

Terrenis.

Littoreis: vt ex minoribus quædam.

Vtrobique, quas amphibias dixeris, vt  
myrtum, salicem, alnum.

¶ Addi possunt urbanæ, syluestres: & syl-  
uestrium aliæ montanis, aliæ planis  
gaudent, &c.

A partibus, differentia mul-  
tiplex: & primo III.  
in genere.

Arbores differunt suis partibus: sunt au-  
tem aliæ

Generales: quoniam aliæ aliæ

Habent: sed vel

Plures

Pauciores

Dissimili modo, &c.

Non habent.

Particulares, cuius generis prima dif-  
ferentia sumitur, à

A partibus differentia III. &c.

4. Caudice: qui est aut

Procerus μακροστέλιον.

Breuis βραχυστέλιον.

Rectus ὀρθόφυλλον.

Con-



TABVLAE STIRPIVM

Contortior, σκολιάτερα.

Simplex, μονοσελέχη.

Multiplex, πολυσελέχη.

Sic in herbis μονόκavλα, δίκαυ-  
λα, ἀκavλα. Cæterum in arbori-  
bus μονοσελέχη eadē ferē sunt  
quæ ἀπαλάβλασα: & πολυσελέ-  
χη, quæ παραβλασιγὰ.

Herbis nullus, ἀσελέχη.

Crassus, tenuis.

¶ Olea & oleaster caudicum ca-  
uitate, vitio peculiari laborant.  
cap. 13.

5 Arbores differunt ramis, κλάδοις,  
qui vel sunt

Multi, πολύκλαδα.

Pauci, ὀλιγόκλαδα, vt palma.

Crassi, Tenues.

Validi, Infirmi.

¶ Nodorum, qui rami maiores  
sunt, differentia, inferius ha-  
betur.

6 Arbores differunt Cortice

Tenui, Crasso, λεπτόφλοια, παχύ-  
φλοια. Laxi,



Leui, Aspero. λειόφλοια, τραχύφλοια.

¶ Quædam dum adoleſcunt læui ſunt cortice, cū ſenuerūt, aspero.

Diſſectō, vt vitis, ριζοφλοια, quibus cortex radicis ſpeciem gerit, Gazza. Ego χιζοφλοια legerim.

Deciduo, vt potulaca, arbutus.

Carnoſo, vt ſuber, populus, σαρκώδεις.

Neruoſo & macilente) ἰνώδεις ἢ ἀσάρκας) vt vitis, (arundo, triticum.)

Multiplici tunicis; πολυλόπων, vt tilia.

Simplici tunicis, μονολόπων, vt ficī, arundinis.

7 Arbores differunt ligno et caulibus idē vel

Partibus. Sunt enim alij vel alia

Carnoſi, vt roboris, ficī, σαρκώδεις.

Macilenti, ἀσάρκοι, vt cedri, cupreſſi.

Neruoſi, ἰνώδεις, talia enim ligna ſunt abietis & palmæ.

Enerues, (In Græco eſt μανὰ.)

Venoſa, φλεβώδης.

D



TABVLAE STIRPIVM

Venis priuata, ἀφλεβα.

Et insuper inter frutices & suffrutes caulis quarundam est,

Geniculatus, arundini

Spinosus, rubo.

Inseptus (indistinctus) et equalis,

ἀδιάφρακτος ὁμαλός, iunco.

Qualitatibus, ut

Duritie, Mollitie.

Lentitia, Fragilitate

Leuitate, Grauitate, &c. Suber

viride statim leue est; salix sicca,

buxus & ebenus ne siccae quidem. Bu-

xus & ebenus grauia sunt densi-

tate: robur, quia terrenum.

Item quod alia sunt.

Fissilia, ἐυχίσα, ut abies propter

meatum rectitudinem.

Fragilia, ἐυθεαυσα, ut olea: pro-

pter obliquitatem & duritiem

materiae.

Enodia, ἀόζα, ut sambucus.

Nodosa, ὀζάδην, ut abies.

Flexibilia, ἐυκαμπτα, ut tilia pro-

pter humoris lentitiam.

§ Arbores



8 Arbores differunt Medulla, *μήτεα*, quoniam alia

Habent, eaque vel

Carnosam, ut vitis, sambucus.

Lignosam, ut abies, pinus: & quidē hęc præcipuē quod tædæ plurimum in se gerat.

Duriorem & spissiore, cornus, ilex, robur, cytisus, morus, celtis. Harum omnium, Medulla nigra est, & durior ligno suo, ideoque flecti non sustinet. In robore priuatim melandryon vocatur à colore nigro.

Solutiorem, *μαυοτέα*.

Minus solutam.

Membranis similem, *ὑμνώδης*, ut

Arundo,

Ferula, & alia inter fruticosa vel suffrutices.

Arbores verò nullæ vel raræ.

Magnam & perspicuam, ut ilex, robur, & aliæ prædictæ.

Incertiorem, (minus conspicuam) ut olea, buxus, haud enim ita in his distincta spectatur. Quamobrem sunt qui eis medullam non in medio, sed per totum lignū dispersam esse affirmant.



## TABVLÆ STIRPIVM

Nō habāt, vt videtur, sambucus & palma.

9 Radicibus differunt arbores. Sunt enim alijs. Cap. 9.

Multæ longæq; vt fico. καὶ μακρόρριζα.

Paucæ, vt punicæ, malo. πολύρριζα, ὅλιγα ῥίζα.

Craſsiores. Tenuēs omnes, vt viti. Inæquales, vt lauro.

Vna, μονόρριζα, vt abieti, pino: ita vt vna prægrandis in imum descendat, paræ aut complures ab ea exeant. Harum rurſum quædam mediam radicem

Maiorem & profundiorē habēt, vt amygdala.

Paruam: cæteras verò grandiores contortioresq; ὡς περ κεκαρπινω μέλας, vt olea.

Leues, Aſperæ.

Saræ, Spiſſæ & diuerſæ. Omnium quidē radices rariore corpore partibus ſuperioribus ſunt.

Neruoſæ, ἰνώδεις, vt abietis. Carnoſæ, vt roboris.

Nodoſæ villoſæq; ὀζώδεις καὶ θυσαϊώδεις, vt oleæ. Tenuiores enim radices multas & conferctas emittit.

Altæ,



Altæ, ut robori, βαθύρριξα. Fico radices profundiores: item omnibus raris & rectâ descendentibus. Stirpes circa vigorem longiores & profundiores radices habent quàm vetustæ. Summæ terræ adhærentes, ut malo, cupresso, ὅτι πολυόρριξα. Profundiores quidem & simpliciter longiores fiunt, si solum sit leue, rarum, & facilè transmeatu.

Rectæ & æquales. Obliquæ & inæquales, idq; natura, ut lauro, oleæ, non tantum loci obstantis ratione, ut fico & alijs.

Prolem sursum versus procreant, ut vitis, ὡς βλαστῆσαι εἰς τὸ ἄνω. Non procreant, ut abies, ἀπαρβλαστῆσαι.

Radices omnes medullam habent, ut & caudices & rami. Omnes prius crescunt quàm superiora: nec altius descendunt, quàm Sol penetrat.

Suffruticum quoque, herbarum, reliquorumque, eadem ferè differentia sunt: nisi quæ penitus radice carent, ut tuber, fungus, cranium.

In cæteris enim Radices vel sunt Cap. 10. & 11.

D 3



# TABVLAE STIRPIVM

Numerosæ, vt tritico, ordeo, tiphæ, et huiusmodi. Πολύριζα.

Paucæ, vt leguminibus.

Singularis, vt maiori parti olerum, sed quædā propagines (ἐπιφύδα) magnas subgerunt, vt apium, beta: quæ pro corporis sui ratione altius quàm arbores sanè radicantur.

Carnosæ, vt raphano, aro, betæ, asphodelo, croco, perdicio, vingo in Ægypto: & arachidnæ, &c. silphio, magydari.

Magnæ & carnosæ, vt ferulaceis.

Lignosæ, vt crucæ, ocymo: & syluestribus magna ex parte, quibus non protinus plures & fissæ exeant, vt tritico, ordeo, & priuatim dictæ herbæ. (his enim statim finduntur.)

¶ Annua & herbacea omnia radicib, vel Statim fiduntur in partes æquales.

Vnam aut duas magnas emittūt, & quibus prodeunt minores.

Quædam quasi ex carne & cortice constantes, vt raphanorū & raporum (cartilagineæ Plinio.)

Geniculatæ, vt graminum, & omnis generis harundinacei, caulibus seu calamis suis supra terram similes.

Tunicis multiplicibus constantes & corticosæ



ticosæ, λεπυρώδεις ἢ φλοιώδεις  
 vt scillæ, bulbi, cepæ. Videntur autem  
 hæc omnia, & in vniuersum quæcun-  
 que capitata terraque condita sunt,  
 (κεφαλοβαρὴ καὶ κατὰ ῥίζα, malim,  
 quæcunque capitata sunt, & radículas  
 à capite deorsum duntaxat emittunt)  
 duplex quodammodo genus radicis  
 habere: nempe carnosam illam & cor-  
 ticosam: & eas (minores fibras) quæ ab  
 illa proueniunt. Videntur enim toto ge-  
 nere differre, non crassitie tantum & te-  
 nuitate vt in alijs radicibus. Aut forte  
 caput illud quasi cyma seu fructus est:  
 non enim omne quod infra terram, ra-  
 dix est, vt neque tuber. Fibre verò tan-  
 tum quæ deorsum dependent, propriè  
 radiculæ.

Magnæ, frequentes & validæ, vt capitatis  
 iam dictis, item gramini & harundina-  
 ceo generi.

Radicibus præterea

Succi omniū insuauiores (λειπότεροι)  
 quam in fructu suo habentur, & qua-  
 rundam amari cum fructus dulcis sit.

Hinc fit vt radices quædam sint.

Medicatæ, φαρμακώδεις.

Odoratæ, θυώδεις, vt iridis.



## TABVLAE STIRPIVM

Radices quædam aliquid singulare habent:

Vt quæ prodeunt

Egerminibus, vt in fico Indica (cuius germina ad terram reflectuntur, radicanturnq; in toto circuitu, ita vt caudicem non attingant.)

E folijs, vt in herbula quadam circa Opûnta, quæ etiam suavis in cibo est.

Lupinum terram amat, terraq; operiri non vult, Plin. 18. 14. Et mox, Tellurem adeò amat, vt quamuis frutectoso solo coniectum inter folia vepresq;, ad terram tamen radice perueniat. (Gaza ex Theophrasto, aliter vertit, nec placet.)

10 Arbores differunt Nodis, ὀζοις.

Sunt enim arbores aliæ

Nodosæ, ὀζώδες, vt olea, pinafter, oleaster, idque vel

Natura. Sic paucos nodos habent sambucus, laurus, ficus, & omnia quibus cortex læuis, quæuè concauo & laxo corpore surgunt. Spissæ etiam materiæ arbores, nodosiores quam



quàm raræ sunt: item rarius confitæ  
nodosiores, breuiiores, contortio-  
resq; , quàm densius confitæ.

**L**oco, nam quæ in vmbrosis & à vento  
silentibus & dilutis locis nascuntur,  
ferè enodia sunt: contraria verò, no-  
dosæ. Montanæ campestribus, & sic-  
cæ palustribus nodosiores. Sylue-  
stres vrbani, tum simpliciter, tum  
congeneres.

**E**nodes, ἀόζοι, id est, paucis nodis præ-  
ditæ: nam prorsus enodes stirpes  
nullæ sunt in arborum genere: sed  
inter palustria, vt iuncus, tipha.

**N**odi quibusdam

**I**nordinati, ἀτακτοί, & vt fortè euenit.

**O**rdinati, τεταγμένοι, tam interuallo  
quàm numero, ob id eas egregias  
vocant, δένδρα ἀξιολογώτατα.

Constant enim aliæ nodis

Binis, δίόζα.

Ternis, τειόζα.

Pluribus.

Quinis, πεντάοζα.

**P**ares ferè vndiq; magnitudine.

**A**ssiduè grandiores, quo propius cras-



## TABVLAE STIRPIVM

fiori adiacent parte, vt in oleastris apparet, & in arundinibus, quarum geniculus veluti nodus est.

Inuicem respondentes κατ' ἀλλήλας, vt oleastrorum.

Promiscui, ὡς ἔτυχεν.

Recti & quodammodo infixi tum nodi, tum rami, abieti, ceteris minimè, quam obrem abies validissima est.

Faciebus belluarum similes, malo peculiariter, est enim vnus prægrandis, alij circa eum parui complures.

Cæci, τυφλοί, quibus nullum germen nasci potest, idq; vel

Natura

Læsione.

Fiunt autem cum pars arboris ictu læsa, ad vulnus consolidandum enitens, oris vndique plagis circumactis, callo cicatriceq; tumuerit. Hoc crassioribus ramis potissimū euenit, nonnunquam etiam caudicibus.

Fœcundi, γόνιμοι.

Quibusdam veluti cradæ (nam propriè dicta cradatio, κράδιον, fœco euenit, cum rami eius quos cradas peculiariter vocant, arefcunt.) gignuntur, ceu vlmō, robori,



bori, & præcipuè platano, quæ si asperis, aridis, ventosisq; locis stent, ita omnino fiat necesse est.

Ramus proximus terræ, & quasi iuxta caudicis caput, senescens crassior reditur.

¶ Nonnullæ gongros à quibusdam vocatos habent, vel simile quid pro arboris natura. Gongrus enim oleæ fermè peculiaris est morbus, quem alij premium, alij crótonam, alij aliter nominant. Rectis vnistirpibus minusq; ab imo plantigeris, id aut nullo pacto, aut minus accidere solet.

Ramuli omnium nodosiores semper videntur, quod minimum ijs internodium interiacet: vt ficulnei qui nuper prouenerint, & vitis palmitum sumitates. Est enim gemma in vite, vt geniculum in arundine, nodus in cæteris.

II. Arbores vel plátę differūt folijs, *φύλλοις*.

Secundum hæc enim Plantæ

Aut semper virent, vt

Arbores

Urbanæ: Olea, palma, laurus, myrtus, pini, (*πεύκης*) genus quoddam, cupressus.

Syluestres: abies, pinaster, iuniperus, smilax (taxus Plinio) thuia,



## TABVLAE STIRPIVM

phellodrys, tilia, cedrus, picea, myrica, buxus, ilex, aquifolia (*ἀγεια*) celastrus, philyra (*φιλύκη*) acuta spina, apharca (quæ monte Olympo proueniunt.) Item terebinthus, laurus. ¶ Potulaca & arbutus, cacuminibus perpetuò virent, folia inferiora dimittunt.

Frutices, edera, rubus, harundo, rhamnus, cedrula.

Suffrutices herbæq;: ruta, brassica, rosa, abrotonum, samfucum, serpyllus, papauer, & complura syluestrium. ¶ Origanum, apium, equapium, cacuminibus perdurant, amissis reliquis. Ruta etiam affligitur atq; mutatur.

¶ Omnia quæ perpetuò virent, folijs angustioribus sunt, & pinguedinē quandam suauemq; olentiam reddunt. Sed hæc quoq; non semper eadem durant, verum alia proueniunt, alia exarescunt, idq; circa æstiuum solstitium.

¶ Nonnulla quanquam sua natura semper virere nequeunt, tamen ex loci causa folia nunquam dimittunt, vt quæ in Elephantino agro & Memphi proueniunt, &c.

Aut folia abijciunt. Omnes quidem autum.



summo & per autumnum, sed aliæ

Ocyus. ¶ Decidunt sorbo vniuersa,  
cæteris paulatim, Plinius.

Tardius, vt quædam etiam ab hyemæ  
occupentur.

¶ Quædam germinant præmaturius,  
& tamen tardius folia dimittunt, vt  
amygdala. Quædam ferè germinant,  
nec tamen tardius abijciunt, vt  
morus.

¶ Regio solamq; madidum ad perdu-  
randum conferunt. In siccis & om-  
nino tenuibus locis natæ, prius fo-  
lia deperdūt, & veteres priusquam  
nouæ: quædam & antequam fru-  
ctum percoquant, vt piri syluestres.

Folia aut sunt

Sibi dissimilia, vt quæ

Noua orbiculantur, veterata in an-  
gulum exeunt (in quod omnium  
mutatio desinit) vt populi, cro-  
tonis.

Edera contra.

Vertunt partes supinas mox post  
solstitium æstiuum

Olea

Tilea

Vlmus

Populus.



## TABVLAE STIRPIVM

Sibi similia, vt in cæteris arboribus omnibus.

Ampla seu lata: viti, fico, platano.

Angusta, oleæ, punicæ, myrto.

Rara, vt pino, abieti, cedro, *σπανόφυλλα*, Plinius *τριχόφυλλα* legit, vertit enim capillata, pino, cedro. Rara verò inferius, vt sequetur.

Carnosa, quia constant pulpa  
In rotunditatem

Cupresso, myricæ, Arboribus,

Cneoro, stœbe, Fruticibus,

Sedo, polio, Herbis.

In latitudine, vt betæ, brassicæ, rutæ.

Harundinacea, *καλαμόφυλλα*, vt palmæ, coici, cæterisq; similibus, quæ folijs angularibus constant, vt harundo, gladiolus, butomus, & cætera palustria. Horum folia quasi ex duobus constare videntur, mediumq; veluti carinam habere, vnde & cæteris meatum medius amplius porrigatur.

Omnia folia parte prona supinaq; inter se distant: ac cæterorum pars supina viridior leuiorq; est: neruulos enim & venas in pronis habent, vt manus. Oleaginosorum verò pars ea ipsa candidior, minusq; leuis. Edera quoq; frondes leues  
superne



## IN GENERE.

superius habet (Nervos callum & articulos superius habent, incisuras vero subter, ut manus humana, Plin.)

¶ Omnium folia quotidie ad Solem oscitant, interiores (inferiores, pronas) partes tepe fieri valentia, Plin. Theoph. ut sæpe dubium sit utra pars potius ad ramulum vergat, &c. Theoph.

Differunt figura

Angularia, *γωνιόφυλλα*. Vide Harundinacea.

Orbiculata, ut piri.

Oblonga, ut mali.

In acutum producta, & in angulum depressa, ut similacis, *εἰς ὃξὺ προήκοντα, καὶ παραγούζοντα*. Plinius vertit angulosa edera.

Multifida & quasi serrata, *εὐχισα, καὶ οἷον πριονώδη*, ut abieti, filici. Infecta pectinum modo, piceæ, abieti, Plin. Vitis quoque aliquatenus fissa, (*χιστὰ*) laciniata & (ut ita dixerim) cruciformia *σκολοπώδη*.

Infecta, (*ἐντομας ἔχοντα*) ut ulmi, roboris, coryli.

Cum extrema, tum lateribus sinuata (*πε*



## TABVLAE STIRPIVM

*εγναθιζοντα*, vt ilicis, roboris, smilacis,  
rubi, paliuri. (Sinuosa toto ambitu ro-  
bori: spinosa cute, rubo, Plin.)

**Extremitate pungentia**, pini, laricis, abie-  
tis, cedri & cedriæ. (Plinius legit agriæ,  
id est aquifoliæ.)

**Spinas pro folijs arborum nulla habet**, sed  
inter suffrutices *φυλλάνθηα*.

Acorna.

Drypis.

Acanus.

**Et omne ferè genus spinosorum**. His  
enim omnibus loco folij spina ori-  
tur. **Quod** si quis hæc folia esse ne-  
gauit, carere folijs ea omninò se-  
quetur, vt quædam aculeata qui-  
dem sint, folium verò habeant nul-  
lum ceu asparagus.

**Differunt pediculo**, alia enim  
Habent

Longum, vt vitis, edera.

Breuem,

Tremulum, vt populi folia, quæ & so-  
la inter se crepitant, Plin.

Adnexum, vt platanus, vitis.

Quasi infixum, vt olea.

**Carent**, vt scillæ, bulbi, *ἀμυγα*.

Prodeun-



Prodeuntia ex

Germine, plerisq;

Ramis

Caudice, vt robori.

(Caule, in suffruticibus quibusdam & herbis.)

Radice illico, oleribus plerisq;, vt intybo erratico, cæpe, allio, & bulbosis omnibus, quorum non solum quod primò oritur, verumetiam caulis omnino sine folijs est. Quorundâ folijs iam perfectis caulis assurgit, vt lactuce, ocymi, apij & frumentorum. Item nonnulla ex his caulem primò mitem, post horridulum spinis gerūt, vt lactuca & cuncta folia spinosa redduntur. Atq; etiam magis in fruticum genere, vt rubus, paliurus.

Mali quodam in genere parua medijs pomis emicant folia, interim & gemina, Plinius,

Multa, pauca.

Lata, Angusta.

Plinius aliter: Iam densa ac rara, semperq; lata rariora.

Ordinata, Myrto. Inordinata plerisq; alijs, (pomis, Plinius.)

Concaua, in genere olerum, cæpa, gythyū.

E



## TABVLAE STIRPIVM

Aspera, Læuia, Aculeata. Sine aculeis.

Fruetum interceptum gerentia, vt laurus Alexandrina quæ fructum super folijs gerit.

Ramulosa, vlmo, & cytiso, Plin.

12. Arbores differunt seminibus. Theoph. lib. 1. cap. 18. Plin. 15. 28. ¶ Semen partium omnium postremum est: hoc humorem caloremq; insitum in se habet: qui cum desierint, semen infœcundum sicuti vrinum ouum relinquitur.

Quorundam semen protinus post regmen ambiens subest, vt palmæ, nucis, amygdalæ, quibus ambientia plura vtique sunt, ceu palmæ.

Quibusdam caro & nucleus interiacent, vt oleæ, pruni. ¶ Huic distinctioni fortè eadē est, \* quæ paulò post sequetur: Semina (inquit) quibusdam protinus carnosæ, ceu illa quæ nucum & glandium genere cōprehenduntur. Quibusdam caro in nucleo est, ceu oliuæ, lauro & alijs.

¶ Hæc obscuriora videntur: & nihil tale lego apud Plinium.

Non desunt quibus in nucleo tantum, vel nucleacea & quasi retorrída cōstet, ceu enico & similibus: nec non & multis oleribus.

Hæc sunt  
obscura.



oleribus. Palmæ quidem euidētissima.  
Cauitatem enim nullam habent, sed tota  
plena atq; persolida sunt: quanquam his  
quoq; humor quidam calorq; inest.

Semina quædam

Includuntua

Siliquis *λεβοῖς*, vt

Annua quædam.

Legumina, & syluestriū alia cōplura.

Arbores, vt filiqua, cercis & colœtia,  
circa Liparam.

Folliculis, *ῥυῖνι*, ex annuis quædam, vt  
triticum, milium.

Vasculis, *ἀγγεία, ἰσχυρίσπιννα*, vt papauer  
& similia: nam sesame modus quidam  
peculiaris est. ¶ Nullum in vasculo  
semen arboris est, nisi conum vascu-  
lum dixeris, quod absolui de fructi-  
bus potest.

Nuda

Sunt, vt olerum pleraq; , anethum, co-  
rianisum, fœniculum, &c. *χυμνόςπιννα*.

Arborum nulla semine nudo est, sed ob-  
ducto aut

Carne

Crusta vel cute pelliculari ceu glās  
& euboicum (id est iuglans.)

Lignosa, ceu amygdala & nux (auel  
lana scilicet.

E 2



## TABVLAE STIRPIVM

Congesta atq; promiscua, ἀθρόα μετ' ἀλλήλων. Et horum quædam

Putamine aliquo communi aut tunica continentur, vt punicæ, mali, piri, vitis, fici.

Nulla communi (tegmine) includuntur: vt ex annuis spicata, nisi quis spicam ipsam ambiens quoddam esse putarit. Quod si ita sit, racemus quoq; in se habebit, & reliqua quæ racemata æduntur, quæq; vniuersa ob fertilitatem virtutemq; soli prodeunt: quemadmodum in Syria & alibi oleas fructificare affirmant.

Discreta atq; distantia (διεσώτα καὶ χεδ' ὄρι:) vt cucurbitæ, cucumeris: & inter arbores, fici, mali. (Sed ficum & malum inter ea etiam numerat quæ congesta aliquo communi tegmine continentur.) ¶ Plinius videtur pro hac diuisione hæc verba posuisse: Quædam inter se densa, vt vuz, sorba: quæ ramos circundata ex omni parte vuarum modo degrauant. Alia rara, vt in persicis. Quædam alio continentur, vt granata.

Dependent alia congesta

Pedicule vno & singulari, vt de racemis spicisq;



spicisq; diximus (vux omnes in scapo vno, &c. grana in vna spica.)

Secus, vt grana panici, vbi vnumquodq; semen seorsim acceptum, principium annexus propriū habere videtur. In ficubus id minus euident est, quod earum grana nimio humore conculcentur: Qui quidem humor in eis vnus granis omnibus communis est: in punicis verò su<sup>9</sup> cuiq; grano peculiaris humor inhæret.

¶ Plinius hunc locum, ita voluisse reddere (aut saltem imitari) videtur. Dependent alia pediculis, vt pira. Alia racemis, vt vux, palmæ. Alia & pediculis & racemis, vt ederæ, sambuci. Alia ramo adhærent, vt in lauro. Quædā vtroq; modo, vt oliuæ: nam & breues pediculi & longi. Hæc ille. Sed præter Theophrasti sententiam: fructuum enim hæc potius quam seminum distinctio est.

¶ Differentiæ secundum figuras totasque formas omnibus ferè exploratas habentur, vt explanatione nō egeāt. Vnū hoc dicemus, quod fructus nullus rectilineus, neq; angularis.

13. Arbores differunt floribus. Sunt autem alij, Cap. 21. lib. 1.

E 3



## TABVLAE STIRPIVM

Lanugini, *χλωδεις*: vt vitis, mori, edera.

Foliati, *φυλλωδεις*: vt amygdala, mali, piri, pruni.

Grandes satis, (vt cucurbitis.)

Pusilli, vt oleaginei, quanquam foliati.

Vnicolores Bicolores.

¶ Arborum quidem flores pleriq; vnico-  
lores & candidi sunt, punicæ tantum  
phœniceus, & amygdalis quibusdam  
rubicundi. Ex vrbaniis alia nulla bico-  
lor: & si quæ sit, syluestris fuerit, vt a-  
bies, cui flos croceus. ¶ Annorum flo-  
res pleriq; bicolores exeunt, & dupli-  
ces, (*διανθεις*.) Duplices dico, quod in flo-  
re alterum florem insidentem mediū  
gerunt, vt rosa, viola nigra, lilium.

Nonnulli folio vno emergunt (*μοτίφυλλα*),  
descriptionem tantum plurium osten-  
dentes, vt flos iasione, &c. Oleæ quoq;  
flos penè talis est.

Copiosus & creber est punicæ, & ampli-  
tudinem sui quodammodo poni æ-  
mulatur.

Plantarum congenerum aliæ

Florent, vt palma mas.

Non florent, vt palma fœmina, quæ pro-  
tinus fructum promit.

Simplices & steriles, ceu

Cueu-



Cucumerum, qui postremis sarmentorū  
emergunt.

Mali medicæ, illi qui velut colum quan-  
dam in medio non habent.

Genus etiam vitis quoddam & punice,  
fructum perficere nequit, sed ad florem  
vsq; generatio tantum peruenit.

Differentes situ, nam alia, cap. 22.

Florem circa fructum ipsum producant,  
vt vitis, olea: cuius postremi flosculi  
perforati spectantur.

Complura fructū in medio floris tenent.

Super fructum ipsum florem insidentem  
emittunt, vt punica, mālus, amerina,  
prunus, myrtus. Et in fruticum genere  
rosa, maiorq; pars coronariarum: se-  
men enim sub floribus habent, quod  
potissimum in rosa conspicitur.

Simili modo & herbaceorum nonnul-  
la, vt gith, (anthemion.) Et in olerum  
genere pepo, cucurbita, cucumis. Om-  
nibus enim flos in postremo fructus, &  
crescentibus fructibus flos diu infixus  
seruatur.

Cum seminibus ipsis flores ædunt, vt aco-  
rus, cnicum. & omnia quæ florem folio  
numerofo producant. (πάρτα τὰ ἀνθόδια.)

Singulis enim seminibus singulos flo-  
res annexos gerunt.



## TABVLAE STIRPIVM

Peculiari quodam modo florem in totis fructibus habent, neq; postremis insidentem, neq; in singulas partes ambientem, sed in medijs inculcatum, nisi fortè concerni nequeat propter lanuginem: ceu edera, morus.

14. Arbores differunt fructibus, quos gignunt, aliæ ex

Surculis

Nouellis, vt ficus & vitis.

Annotinis, vt olea, punica, mâlus, amygdala, pyrus, myrtus, omnesq; ferè similes.

Vtrisque, vt mali biferæ, & si quæ aliæ bis fructificat.

Caudice, vt morus Ægyptia: quam tamen alij ex grandibus ramis fructificare aiunt.

Grandibus ramis, vt siliqua arbor, quæ ficus Ægyptias producit.

Cacuminibus, ἀκρόκαρπα: plura ex alijs quàm ex arboribus, vt

Frumentorum quæ spicâ pariunt.

Fruticû, erica, piræa, amerina:

Olerum, quibus radix capitata.

Lateribus, πλαγιόκαρπα.

Parte vtraq; tam arborum quædam, vt  
olea



olea aliquando, quod copiae indicium  
esse fertur: quàm olerum, blitum, attri-  
plex, brassica. Palma etiam fructū quo-  
dammodo cacumine gignit, vt & folia  
& germina.

¶ Fructuum differentias secundum odo-  
res, sapores, & consistentiam: quære su-  
pra, vbi inter partes similes primas  
de humore diximus.

Finis diuisionum in primum Theo-  
phraستي librū, de historia plan-  
tarum, anno 1552.

TABVLA DE FRVCTIBVS AR-  
borum, ex Plinij lib. 15. cap. 24.  
potissimum:

Fructus arborum aut sunt foris

Carnosi, vt

Poma in genere dicta, (ὀπώρεα.)

Māla tum reliqua, tum cotonea per  
excellētiā μῆλα dicta: & in alijs  
generibus, persicum, medicum siue  
citream & punicum: cuius ramen  
non caro sed acini, nec foris, sed in-  
tus, edendo, sicut & citrei, nō quod  
foris est, sed pars interior succo &



## TABVLAE STIRPIVM

carne constans, edi solet, &c. Coton-  
neorum alia m̃alis, alia piris propiora  
sunt.

Pira, pruna, è quorum genere & Armo-  
niaca sunt.

Mespila, sorba fructus Perseæ.

Ficus communis, Cypria, Ægyptia (an  
ad Mora?) Palmulæ & muza dicta.

Myxa (& Sebesten.)

Aliud corpus est terrestribus fragis, al-  
liud congeneri eorum Vnedoni.

Cerasa medio inter baccas acinosque  
genere.

### Mora

Arborũ, cõmunia. (An alia Ægyptia?)

Ruborum, communis, chamæbati, I-  
dæi duplicis.

Acini, vt vuarum, ederæ, sambuci, ( Ri-  
bes vulgò dicti, &c.) Punici mali aci-  
ni soli & interius sunt & angulosi: nec  
cutis vlla singulis, præter commu-  
nem, quæ est candida, totisque suc-  
cus & caro est, ijs præcipuè quibus  
paululum inest ligni.

Baccæ, vt oliuæ, lauri, corni, myrti, len-  
tisci. Aquifolij quidem & spinæ (albæ  
nimirum hodie cognominatæ) sine  
succo. ¶ Baccæ & acini quid differât

non



non satis explicauit Plinius: sed videntur acini complures simul iungi, minores plerunq; & succulenti: baccæ pauciores & ficciores ferè, &c. Germanica lingua discrimen non habet. De baccis vide plura apud Plin. lib. 15. cap. 28.

Medio inter baccas acinosq; genere, pomis adnumerauimus. ¶ Taxi fructus sui generis est. ¶ Frutices pleriq; acinos ferunt, pauci fortè baccas.

Duri, & ceu crusta operti, testæue.

Nuces

Iuglandes

Auellanæ (Pistacia.)

(Balanus, Myrepfica.) nux muscata vel myristica, simili iugladiū, operimēto.

Amygdalæ, tenuiore sed simili iuglandiū summo operimento secundo putaminis (ligni scilicet.) Nucleus dissimilis latitudine & acriore callo. ¶ Persicum fortè inter poma nucesq; ambigere dixeris.

Nuces pini aliarumq; coniferarum: & oxyæ vulgo fagi: Nux cupressi, piceæ, pinastri, piceastri, &c. coni potius quàm nuces dici debent.

¶ Hæc verè ostracodermis animalium conferri possunt, ob testam duriorcm. ¶ Nux Indica, Nux vomica.



## TABVLÆ STIRPIVM

Glandes : quarū minus dura est crusta, ceu malacostracis animalium. Glandi ferarum arborum diuersæ sunt species, vt quercus, robur, escul<sup>p</sup>, cerrus, suber, ilex, fagus veterum Græcorum.

Nuces vocamus & castaneas, quanquā accommodatiores glandium generi. Armatum echinato calyce vallū, quod inchoatum in glandibus, Plinius.

Balanus cognomine myrepfica, inter nuces est.

¶ Anucum natura haud procul abesse videtur & prædulces siliquæ, nisi quod in ijs cortex ipse manditur, Plinius. vulgò S. Iohannis panem vocant. Huc & siliqua Ægyptia vel atra quibusdam cognominata cassia hodie medicis, pertinet. Arbores quidem tam paucæ siliquas gerunt, de vna & altera tantum Theophrastus ac Plinius id prodiderunt, nempe Colutea, ni fallor: sed Anagyris quoque & laburnum siliquas habent: & Acacia. Sicut & in pappos abire fructum, soli arborum coggyriæ Theophrastus: quod tamen in vite syluestri & in cotino nos obseruauimus.

TABV-



TABVLA DE IIS QVAE E RO-  
bore enascuntur, ex lib. 9. Theophra-  
sti hist. Cap. 8. & 9.

Robur, *ῥύς*, arborum omnium præter fru-  
ctum suum alia plurima gignit, vt

Gallam

Paruulam, (& læuam)

Resinosam aliam & nigram.

¶ Galla deterrima ex robore : signum  
eius quòd cauernæ translucent, Pli-  
nius.

Mori specie quiddam durū & fractu dif-  
ficile, id tamen rarum.

*Αἰδοῖωδες*, id est, effigie colis quiddam,  
quod cū perficitur, durū quid parte e-  
micate & perforatū, & tauri caput quo-  
dammodo æmulans profert : id perra-  
ptum nuclei oleæ speciem initium o-  
stendit.

Pilum, *πίλον*. Hic pilula est lanacea, *σφα-  
εῖον ἐλαῶδες*, Plinius videtur legisse  
*καρυῶδες*. Mollis, sed nucleo (*περιπυ-  
ρνήξ*) durior, qua in lucernarum lu-  
minibus vtuntur. Flagrant enim probe,  
vt galla nigra. ( Nascuntur in eo & pi-  
lulae nucibus non absimiles, intus ha-



## TABVLAE STIRPIVM

bentes flocculos molles, lucernarū luminibus aptos: nam & sine oleo flagrat, sicuti galla nigra, Plin.)

¶ Pilulam comigerā, cætera inutilem, ver-  
no autem tempore succo melligeno in-  
ficientem tum tactu tum gustatu.

Pilulam aliam in ramorum alis sine pedi-  
culo, concavoq; sessilem, peculiarem,  
versicoloremq;. Nam eminentes quos-  
dam umbilicos candicantes, vel passim  
variantes nigris maculis habet: partem  
mediam cocci tinctura infectam splen-  
didamque ostendit. Aperta, nigra & pu-  
tricans cernitur. (Φύει δ' ἐν περιώνη  
τῇ ῥοπῶν μαχαλίδας ἑπερὶ σφαι-  
εῖον ἀμυχὸν καὶ κοιλόμυχον.) Gignunt  
& alæ ramorum eius pilulas, corpore  
non pediculo adhærentes, candicantes  
umbilicis: cætera nigra varietate disper-  
sa. Media cocci colorem habent. Aper-  
tis amara inanitas est, Plin.

Pilulam è folijs cōuolutam, compressam  
atq; oblongam.

Pilulā super folijs tergo adhærentē, candi-  
cantem, translucidam & aquosam dum  
tenera est. Hæc etiam muscas interdum  
intus continet, veniensq; ad incremen-  
tum



# IN GENRE.

94

tum iustum, in modum lævis paraula  
gallæ indurefcit. Sed hæc rarenter adna  
fcitur. (Et in folio rubente aquosos nu  
cleos candicantes, &c Plin.)

¶ Pilulæ diuerfæ (σφαῖραι) quinq; generū  
& cachrys sexta. Sed & cætera omnia  
(præter lapillum fortè) pilulæ dici poffo  
videntur à figura.

Lapillum, pumiceū ferè, (κίονος) *κίονος*  
sed rarò. (Aliquādo & pumicos gignit.  
Plinius.)

Horū quædam Gaza obfcurius tranſtu  
lerat. Tranſtulit & Pli. 16. 7. fed quædā  
omifit: in quibusdā differt, vt anno  
tauimus.

Ferunt robora & cachryn, (quæ poſtquā  
folia decidere, hyeme durat in platano  
quoq; nuce, tilia, picea, larice, abiete.)  
Eſt autē pilula in medicina vrendi vim  
habens, &c. Plin. An cachrys etiam flos  
quercuum?

Fungi è radicibus & iuxta radices.  
Viſcum. Sed hæc duo, fungi & viſcum, cū  
alijs etiā arborib. cōmunia habēt, Theo.  
Item mel & apes teſte Heſiodo. Naſcitur  
aut hic melleus humor cœlo cadēs, nec  
alijs magis infidet frondibus, Theoph.  
Videtur aut droſomeli, id eſt, mannam  
intelligere.



TABVLAE STIRPIVM

Quin & cremati roboris cinerem nitro-  
sum esse affirmant, Theoph. interprete  
Gaza. Sed Græcus textus habet, ex  
robore cremato nitrum fieri. Ga-

za pro κατακολεθῆ rectè  
κατακρυβῆ.

DE COL-



## DE COLLECTIONE

STIRPIVM IN GE-

NBRB.

*De colligendis stirpibus ex præfatione  
Dioscoridis.*



NTE omnia curandum est, vt  
tempestiuè legantur & seruen-  
tur omnia. Ex hac siquidem ob-  
seruatione efficacia sunt aut eua-  
nescent medicamenta omnia. Serena itaque  
tempestate colligi debent. Refert enim ma-  
gnopere ne à siccitate aut imbribus legan-  
tur: & vt è montanis, ventosis, frigidis, nec  
vliginosi locis, potius quàm contrarijs pe-  
tantur. Nam quæ in campestribus, vligino-  
sis, vmbrosis nec vento perflatis proueni-  
unt, plerunque ignauiora sunt: Multòq; ma-  
gis quæ non sua tempestate & importunè le-  
cta fuerint, aut infirmitate distabuerint. Nec  
ignorandum illud etiam, sæpenumero hæc  
ipsa loci proprietate & anni temperamen-  
to, ocys aut serius in integram ætatem ab-  
solui.

EX EPISTOLA HIPPOCRATIS  
*ad Cratenam.*

F



## DE COLLECTIONE

Tu quo ad fieri potest, nobis montanas maximè & in altis collibus nascentes herbas radicitus refeca. Sunt enim aquosioribus solidiores & acriores, propter terrę densitatem & aeris tenuitatem. Nam quod attrahunt frigidius est. Conare tamen vt etiam de his quę circa stagna nascuntur, & de palustribus, fluuiatilibus aut fontanis, flores colligas: quas sanè debiles, & exolutas, ac dulcis succi esse scio.

Et inferius, Sed & herbis multa reptilia venenum immittunt, & hiatu suo internæ ipsarum teneritudini adflictionem pro auxilio inspirant. id quod latet, nisi sanè nota aliqua aut macula, aut odor ferus & grauis, rei factę indicationem fecerit.

## DE COLLIGENDIS HERBIS, EX

*lib. 1. pharmaco. Iac. Syluij.*

Ex herbis plurimę solùm virides in vsum recipiuntur, dum hæc vel harum succi in syrupos coquuntur, & in apozemata, clysteres, forus, cataplasmata, & alia id genus, in quos vsus postremos quouis tempore leguntur. In syrupos autem, vel formam aliquam toto anno seruandã, sunt legendę quando sunt efficacissimę, cum scilicet florent,

aut



aut etiam semine iam plenæ sunt, vt fumar-  
ria, calaminthe, & aliæ ex sequentibus in  
syrupos vel alia composita diu seruanda re-  
cipi solitæ. Nam fumariam florentem veris  
initio, semine autem plenam veris fine legit  
Mesues.

Quòd si herbæ nec caulem, nec florem  
nec semem edunt, vt adiantum omne, asple-  
nium, legantur in foliorum vigore: quando  
scilicet maxima & virentissima sunt.

Quædam dum florent aut sementescunt  
quia lignosæ sunt & exuccæ, ante id tempus  
in vsum trahuntur, vt beta, bralsica, cichori-  
um, chondrilla, eupatorium, lapatha, planta-  
gines, verbaseum, verbenacæ.

In quo virium vigore etiam sunt colli-  
gendæ quæ siccantur, & in vsus medicorum  
varios anno etiam toto seruantur, vt absin-  
thium omne, adiantum omne nobis (qui-  
bus enim abundat, virens & vicens vsurpa-  
tur) anethi coma, betonica, carduus bene-  
dictus, cichorium, centaurium paruum, cala-  
minthe, menta, chamædrys, chamæpitys,  
eupatorium, eufragia, fumaria, hysopico-  
ma, marrubium, maiorana, organum, po-  
lium, pulegium, ruta, rosmaris, saluia, (li-  
cet hæ duæ etiam sine floribus sint effica-  
ces) scordium, splenium, thymum, thymbra,



## DE COLLECTIONE

verbascum. Aut saltem cum vigent folia magnitudine, odore, colore, præsertim quæ cacumini sunt propiora.

Absinthium vere legit Mesues ad succum & aquam inde stillandam, flores eiusdem æstatis initio, hic autem æstatis fine vel etiam autumno. Eupatorium quoque legitur & ex eo succus exprimitur in fine veris, Mesues. Siccantur autem in umbra magis, nisi quæ sunt caule crassiore, aut folio humidiores, & ob id apto putrescere. Vbi probè sunt ficcata reponuntur, vt radices, sed minus diu seruari possunt, ob id quotannis mutandæ, Hæc Syluius.

*De herbis colligendis, siccandis, & reponendis ex Matthioli commentarijs in præfatione Dioscoridis de materia medica.*

Demetendi tempus, recondendi locus, perdurandi terminus obseruandus est, tum in stirpium, tum etiam animalium partibus, vt in hirci sanguine, lupi iocinere, intestino, ac etiam stercore, vulpis pulmone, apri vesica, anguium senecta, alijsque consimilibus. Assumantur igitur hæc omnia eo demum anni tempore, quo magis suis viribus sunt præditæ,



ditæ, nullo planè modo neglecto tempo-  
rum ratione, quibus singula decerpi postu-  
lant. Neq; enim damnandi sunt, qui in qui-  
busdam plantis colligendis quædam decre-  
ta tempora, nonnullosq; errantium syderû  
aspectus obseruant: quippe quod apud gra-  
ues auctores scriptum inuenerint, pœoniæ  
radices contra comitiales non esse euellan-  
das, nisi decrescente luna. Quæ quidem opi-  
nio non prorsus reprobanda videtur, nec ad  
ineptas incantationum, aliarumque vanita-  
tum, quas stultè (vt ait Galenus) prodidit  
Pamphilus, comparanda. Nam cum infe-  
riora terrestria à superioribus cœlestibus gu-  
bernentur, & regantur, fieri maximè potest,  
vt luna, vt quæ cæteris errantibus sideri-  
bus est nobis magis proxima, motuque ve-  
locissima, maximam cum plantis omnibus,  
ac rebus quibusuis alijs habeat rationem,  
tum cum augetur, tum etiam cum minui-  
tur singulis mensibus. Quamobrem non te-  
merè à Galeno proditum est, alyssum her-  
bam tantum Sirio ardente ad canum rabio-  
forum morsus esse euellendam, sicuti etiam  
fluuiatiles cancos ad idem peridoneos.  
Quo etiam tempore captamus scorpiones,  
atque anchusa radice constat sanguineo sue-  
co madente. Quemadmodum & stirpes.



## DE COLLECTIONE

quibus facultas excalfaciens insit, perpetuò in locis calidis ac siccis demetere convenit. Quocirca Hippocrates ad Crateuam scribens: Adnitere inquit, quantum potes, vt nobis montanas maximè, & in altis collibus nascentes herbas à radicibus reseces: quandoquidem hæc firmiores, atque acriores sunt ijs, quæ aquosioribus nascuntur locis: idque quod in montibus terra sit densior, & aer tenuior, nam quod attrahunt, frigidius est. Quin etiam dabis operam, vt flores ex his herbis etiamnum decerpas, quæ circa stagnantes aquas, paludes, fluuios & fontes prodeunt, quas sanè debiles & exolutas, ac dulcis succi esse scio. Hæc Hippocrates.

Herbæ similiter atque radices, legendæ sunt, siccandæ ac asseruandæ, his tamen demptis, quæ tum in medicinæ usu, tum in cibis, tum etiam in obsoniorum condimentis quotidie virentes vsurpantur, veluti lactuca, intubus tam domestica, quàm agrestis (cichorium appellant) portulaca, buglossum, beta, atriplex, blitum, brassica, viola nigra, malua, helxine, linozostis, ocimum, apium, hyosciamus, sedum, plantago, asparagus, acanthus, & aliæ complures. Atq; non solum refrigerantibus herbis, verum etiam excalfaci-

cienti-



cientibus recentibus utimur: plerumque enim ex calida potestate præditis, virides siccis præponimus, præsertim ubi minus calfacere sit opus: siquidem humor in virentibus exuberans earum calorificam facultatem haud parum demulcet. Cuius quidem classis habentur, amaracus, crucea, nasturtium, menta, absinthium, thymus, satureia, ruta, calamintha, sisymbrium, pulegium, abrotonum, & id genus permulta.

Sunt præterea & alia, quæ demetiri expetunt, cum primum floribus ornantur, ut centaurium minus, viola purpurea, origanum, symphytum petraeum, pulegium, serpyllum, amaracus, polium, thymus, chamedrys, chamæpithys, anthemis, chrysanthemum, stoechas, hyssopum, fumaria, aliæque consimiles plantæ, quas ne longior, quàm par sit, esse videar, ex industria prætereo. Hæc igitur omnia serena cœli constitutione, non nubibus, non imbribus infestis imprimis colligantur oportet. Deinde terra expurgata, atque alijs aduentitijs excrementis amotis diligenter in umbra siccentur. Nisi ex eo genere habeatur, quæ caulis crassitudine, ut in acantho: vel foliorum lentore, crassitie, & humoris exuberantia, ut in portulaca, & crithamo, omnino insolari expetant, quandoquidem si



## DE COLLECTIONE

eiufmodi herbæ in vmbra ficcandæ reponantur, dubio procul fitu obducentur, & putrescent. Cæterum vt rectè exiccate fuerint, decusso puluere, in facculis ex corio, vel ligneis capsulis, recondantur, ac diligenter claudantur, ne earum vires euanescant. Quæ in re errant seplasiariorum pleriq;, qui herbas iam siccatas in fasciculos digerentes ad officinaria laquearia suspendunt, vbi non solum breui viribus destituuntur, aëris ambientis exuptione, ac ventorum perflatu, sed etiam puluere, & aranearum telis obsiduntur, quin etiam muscarum stercore, quæ illis die noctuq; insident, labefactatæ nigricant. Neque verò planè laudibus efferendi sunt ij, qui in linteis facculis, ipsisq; textura admodum raris eas trabibus appendere consueverunt: quippe æstiuus aër in ipsos penetrans, quicquid boni inest, absomit & abolet, quin etiam puluere obsitæ corrumpuntur, & contabescunt. Idcirco vt tam herbæ, quam radices suas integras asseruent facultates, nihil quidē præstantius, quàm eas capsulis tiliaceis, vel piccis, vel fistilibus, diligenter clausis reponere, vt docet Hipp. ad Cræteuam his verbis scribens. Omnia medicamenta, quæ succi & liquoris fluidi sunt, in vitreis vasis ferantur: quæ verò folia, aut flores,



res aut radices sunt in fictilibus nouis probè obturatis, vt ne ventis perflata, medicamento vigorem, veluti in animi deliquium collapsa, amittant. Quod si Hippocrates in recentibus obseruandum præcipit, id maxime in siccis fieri operæ precium erit. Haftenus Matthiolus.

Sunt quæ in mensis alicuius initio aut fine potissimum florent aut fructificant, quæ nos tamen in tabulis duodecim mensium simpliciter enumerauimus. Itaq; cogitandum est non rarò fieri vt quæ in mensis alicuius initio florere solent, circa finem aut medium etiam mensis præcedentis appareant: & rursus vt quædam à præcedentis mensis siue ad principium aut medium sequentis differantur.

Pulmonaria tota æstate in quercu arbore & saxosis locis inuenitur.

Succus ex herbis colligendus in noua caulium productione, eodemq; modo ex folijs: liquores lachrymæque sectis integræ ætate caulibus excipiendi, Diosco.

#### DE FLORVM COLLECTIONE & repositione ex eodem Matthiolo.

Flores non secus atque reliquarum plan-



## DE COLLECTIONE

tarum partes, eo tempore colligendi sunt, quo magis suo in vigore consistunt, non autem cum iam flaccescentes decidui euanescent. At capparum flores muria asseruandi antea quàm se explicent, decerpuntur: rosarum verò cum non planè exciccati visuntur: cæteri deinde cum omnino expansis folijs patent. Verùm cum maiori ex parte omnes flores ferè sint herbis fragiliores, molliores & tenuiores, idcirco tantum abest, vt in sole siccandi sint, vt ne quidem in vmbra, si calida vel eminentia fuerint loca: quippe, vt solis feruore, sic & aeris calore nimio exoluuntur. Siccentur igitur in locis temperatis, quo tempore sæpius reuoluantur, ne situm contrahant, adhibita etiam cura, ne sicci natium colorem perdant, quandoquidè certum est flores, qui inter siccandum à proprio colore degenerant, nullius esse in medicina vsus. Siccantur autem probè vbi substratis lintheaminibus sparguntur, & ijsdem lenibus operiuntur. Flores itaque in vniuersum sicci ad annum duntaxat edurant, etsi anthemidis, centaurij, chrysanthemi, millefolij, spartij, & rosarum flores etiam longiori asseruentur tempore, si ligneis arculis optimè inclusi diligenter recondantur. Matth.

*De floribus legendis ex Syluio.*

Flores



Fores legantur cū maximè vigent, cœlo sereno, vt capparīs in gemma, rosa expādi cœpta legatur : reliqui ferè aperti, sed haud ita pridem : & ex quibus vis nondum exhalauit, nec folia tenuentur, & sint decidua.

Siccantur sole vel aëre calido, magis, minus, pro varia ipsorum natura, quidam siccandos volūt donec ex ponderibus decem vnicum superfit, minus autem ex montanis floribus quā ex campestribus minuitur, Syluius.

Flores legi debent priusquam decidan Dioscorides.

*De differentia florum ratione temporum anni, locorum, &c.*

Plantæ plerunquē pro peculiari aut loci, aut anni clementia maturius nunc, nunc verò serius, vt adolefcunt, ita etiam florent: sic in Germania omnia vno aut altero mense tardius florere, quā Neapoli, aut alijs locis calidioribus videmus. Sic ex Fuchsij monumentis Geranij speciem primam, quam acum muscatam appellari vulgò ait, Aprili mense florere : in agro tamen Neapolitano ineunte Martio, singulis annis eandem florentem obseruauit Maranta.



## DE COLLECTIONE

Anni etiam constitutio eandem rebus affert diuersitatem : Sic brassicas mense Decembri caules edidisse vidit idem Maranta, ac in flores erupisse : cum vt plurimum vix Februario florere incipiant.

Quædam per hyemem flores & folia proferre solent : quædam bis per annum etiam florere, Dioscor.

Anni parte maiore florent multa quæ coluntur, hoc est verè, æstate & autumnò, & quædam inclusa etiam hyeme, vt Caryophylli, leucoia, violæ dasypodes.

Menses omnes videntur aliquas in ipsis florentes proprias habere, excepto Octobre: & hyemalibus, Nouembre, Decembre, Ianuario & Februario, si tamen Februius in alijs Germaniæ partibus mitior sit quàm Heluetiæ nostræ, proprios ei flores dixerim leucoij bulbosi, tussilaginis, thymelææ maioris quàm zylandt dicimus, quòd Februario florere incipiant licet in Martium extendantur.

Calendula & bellis minor locis calidioribus, toto fermè anno florentes inueniuntur.

Sunt quæ vno tamen mense florent.

Alia non vno aut altero mense tantum, sed diutius, vt pentaphyllum, rhododaphne pu-



ne pumila siue herbacea.

Ocimoides, capficum, bursam pastoris  
hyems superueniens diutius florere pro-  
hibet.

Quæ apud authores æstate florere legi-  
mus, aut fructificare, ad mensem Iunium &  
Iulium apud nos potissimum referemus.  
Maius enim aliqua ex parte vernæ, vt Augu-  
stus autumnalis constitutionis est, hic suo  
fine, ille principio.

Tota æstate florent.

Anagallides à Maio vsq; in autumnum.

Fraga vere & tota æstate, inque maximam  
autumni partem. Hyoscyamus ferè per to-  
tam æstatem, præcipuè Iulio.

Phu. Ranunculi secundum & tertium ge-  
nus apud Fuchsum.

Saxifraga pimpinellæ similis æstate in au-  
tumnum vsq; floret.

Sideritis prima Fuchsi, folijs marrubij,  
Iunio floret vsq; ad autumnum finem.

Symphytum magnum.

Autumnus velut alterum quoddam ver-  
est, & multæ in eo florent, sed parcius incer-  
tiusque, quæ vere copiosius non solum her-  
bæ, sed etiam arbores apud nos aliquando:  
hæc dum scriberet Gesnerus anno 1553. ini-  
tio Octobris pyri arboris flores ad eum al-



## DE COLLECTIONE

lati fuerunt, ut ipsemet scheda manu sua scripta, testatus est.

### *De florum differentia, ob cultum.*

1 Anno 1556, cum apparuisset cometa, ver fuit satis calidum, & flores plerique duabus aut tribus septimanis praeuenerunt.

2 Stirpes vetustiores, quae in locis subterraneis, aut cellis vinarijs, aut alioquin locis tepidioribus aut hortis per hyemem seruantur, multo citius flores edunt, quam recens & modo satae plantae.

3 Flores multiplices, *gefüllte Blumen*, an & prius incipiunt flores emittere & durant diutius in suo genere? & hortensia multa quam syluestria prius diutiusque ob alimenti copiam, si frigus & umbra, & loci natura non prohibeat.

4 Nota, Quaedam anno primo non florescere, ut olusatrum, foeniculum nostrum: nam dulce floret primo.

5 Quae primo anno florent, eodem pereunt.

6 Herbae floribus multiplicibus, *gefüllte Blumen*, plerumque steriles.

7 Herbae aliquae abscissae, vel aliter laesae, de nouo postea crescunt & florent, sed tardius.

8 An ubi in eodem genere albi, & aliorum colorum flores sunt, albi praeueniunt? in rosis, ca-



lis, caryophyllis, cyano, aquileia, ocimoi-  
de. &c.

9 Quæ feruntur, alia prius, alia tardius flo-  
rent, prout vel autumnno vel verno, vel ve-  
ris initio aut fine aut etiâ æstate sata fuerint.

Eorum quæ in hortis quotannis ferun-  
tur, vel citius vel tardius, maior ex eo ipso  
varietas est: & præstat scire quoto tempore  
à satione eorum vnumquodque floreat aut  
semen ferat. Cnicum Nouembri florere vi-  
di, erucam etiam, nasturtium, fœniculum,  
sed rara.

10 Multum refert in vasis, vel in areis plan-  
tari: hæc ferè proceriora fiunt, vel citius flo-  
rent. In vasis tutiora sunt ab animalculis in-  
festis.

*De nonnullis, quæ florent, semen ve-  
rò non gignunt.*

Sunt ex plantis quædam, quæ florent qui-  
dem, semen verò non proferunt, vt omnes  
ferè stirpes, quæ florem multiplicem emit-  
tunt, Chameleuce quibusdam dicta, Arthri-  
tica, Viola Martia, dasypus, Sambucus aqua-  
tica, Ranunculus, Cerasi genus vt sequitur:  
quoniam vis omnis consumitur in florem.  
Aquileia tamen, Calendula, & pauca alia,  
semen ferunt.



## DE COLLECTIONE

Acer maius apud nos, *ahorn*: cuius generis arbores quædam etiam florem non reddunt.

Cerasi genus in syluis prope Scaphusi-  
am ut audio flore magno, multiplici. *Gfülle  
te wilde friese.*

Erica. *Heid.*

Fraxinus in quibusdam locis.

Arbuscula quædam innominata in ri-  
pis fluuiorum quorundam, (*Elzbeebre*) odo-  
re nucleorum, perfici ferè in folijs & cor-  
tice.

Pseudamomum sæpè apud nos. Nam in  
Gallia & Italia fructum maturat, ubi in hor-  
tis colitur. Nascitur apud nos sponte circa  
ripas & alibi, folijs ut ribes vulgaris frutex,  
quem etiam magnitudine ferè æquat. Pseu-  
damomum autem esse, non piperis genus,  
ut quidam putant, ex veterum descriptione  
coniicio.

Salicem Homerus *oleficarpon* à sterilita-  
te nominauit. In syluestri tamen latifolio ge-  
nere pappos à flore auolantes loco seminis  
esse Tragus obseruauit.

Tamarix.

Thymus, cui flos pro semine.

Tilia syluestris.

Viola dasypus, *gfülle viõnle.*

Que



Quæ semen fructumue ædant flore non antegresso (aut nucamento floris loco) nulla aut quàm paucissima sunt, vt mali quædã apud nos (vt audio) & filix fortè. Omnino quæ nec florem nec semen ( aut semen non manifestum ) gerunt, toto anno virent pleraque, nimirum quod succus plantæ natius non consumatur in semen: quæ verò semine abundant, vt ferulacea, & quæcunq; umbellulas gerunt in herbarum censu, hyeme ferè omnia intereunt, vbi semel fructum copiosè protulerint: quod quædam primo statim anno faciunt: alia in secundum aut tertium annum caulis germinationem & fructificationem differunt, vt in angelica nostra obseruatum est.

Sabina apud nos alicubi nec florem nec fructum ostendit.

#### DE SEMINVM COLLECTIONE.

Semina cùm ficcari inceperint, legi debent antequam delabantur, Dioscorides.

Semina deligantur matura omnia, benè habita, plena, & corpulenta, & quæ naturæ suæ vires proprias habeant efficacissimas, & odorem, saporem, colorem, sui generis

G



## DE COLLECTIONE

perfectissimum, si odoris, saporis est particeps. Sint præterea recentia, aut his proxima. Quæ enim diutissimè fuerunt reposita semina, & alia, vires habent imbecilliores, Syluius.

### *De seminum collectione & repositione ex Matthiolo.*

Non minori studio colligenda sunt semina tam ea, quæ suis in stirpibus nuda innascuntur, vt lithospermi, fœniculi, anethi, & cari: vel vasculis, aut capitulis inclusa, vt papaueris, nymphææ, melanthij, hyoscyami, & ocimoidis: aut siliquis tecta, vt fabæ, ciceris, phasioli, dolichi, & lupini: aut corniculis recondita, vt fœnigræci, fertulæ Campanæ, sinapis & erucæ: aut varijs inuolucris contenta, quàm ea quæ circa medullam quorundam fructuum intus conduntur, quale est mali medici semen, aurantij, limonis, pyrorum, cydoniorum malorum, peponum & melopeponum, cucurbitæ & cucumeris. Veruntamen hæc assumere oportet, cum fructus, à quibus eximuntur, suam maturitatem planè senserint: illa verò vbi herbæ iam siccæ, non amplius virent. Et quamuis multa reperiantur semina, quæ ad annum ultra suas asseruent vires, ea tamen quotannis



annis renouare satius ac tutius erit, siquidē pauca sunt, quæ inueterata rancorem non redoleant: quo fit vt calorem nanciscantur extraneum, & sibi non cōgenitum. Vbi igitur sicca fuerint semina arculis ligneis reponantur in locis siccis: facilē enim cōtrahunt locorum humores. Hæc Matthiol.

Quæcunque fruticosa (*ἑρπύδα*) sunt, qualis stichas est, trixago, polium, abrotonum, absinthium, seriphium absinthium, hyssopus, aliāq; his similia suis seminibus prægnantia legi oportet, Dioscor.

DE COLLECTIONE ET CON-  
*seruatione fructuum ex Matthiol.*

Cæterum fructus, quemadmodum pruna, serica, myrti baccæ, cydonia mala, cerasa quæ vulgò marascas vocant, corna, sorba, ficus, punica mala, & aliā id genus, quæ in medicinæ vsum reponuntur, operæpretiū est, vt maturi ex arboribus decerpantur: quamquam sorba, vt siccentur, immatura decerpere conueniat. At animaduertendum est, quod vbi astrictione, & repressione sit opus, fructus astringentes vt paululū potius immaturi, quàm secus, demetantur oportet. Porro iuglandes, amygdalæ, pistacia, nuclei pinei, & auellanæ non prius ex arboribus



## DE COLLECTIONE

excutiantur, quàm planè vltimum maturitatis gradum fenserint. Id autem rectè cognoscitur, cum extima inuolucra sponte sua dehiscunt, & arbore concussa vnà cum fructibus decidunt, alioquin insolatu contrahuntur & sidentur. Ex his igitur, qui siccati afferuantur, capsulis ligneis potius, quàm faccis recondantur, ne extraneos humores concipiant. Qui verò per annum recentes reponuntur, aut maiori ex anni parte perdurant, in locis siccis, minimè asperginem redolentibus appendantur, vt assolet de vuis, pyris, malis cydonijs & punicis: aut super paleas expandantur, vt fit cum malis, sorbis ac mespilis: aut hordeo vel milio sepeliantur, quemadmodum medica, & aurantia mala, Matthio.

Fructus legi debent, inquit Dioscorides, maturi.

Lentiscum arborem quæ mastichè fert, & triplici fructu tria tempora monstrat arandi, Germania ignorat.

Malus medica regionibus calidis per totum ferè annum, si cura adhibeatur, floret atq; fructificat. Citronen/limonen / vnd pomeranzen.

Seminibus & fructibus omninò carent apud nos December, Ianuarius, Februarius & Mar-



& Martius. Aprilis paucissima nec solita colligi (vt hepaticæ terrestris & cyclamini fortassis) profert.

DE RADICIBVS COL-  
*legendis.*

Radices quas seruari oporteat, radicumque succos, & cortices, incipiente in plantis illis foliorum defluuio erui, excipi & auferri oportet: & per se puras locis sine humore, vt erunt, siccari: lutosas verò aqua prius lauari, Dioscor.

Et paulò antè, Sciendum ex herbarum medicamentis durare ad multos annos scilicet candidum & nigrum veratrum, reliqua ad triennium tantum habere vsum.

*De collectione radicum  
ex Syluis.*

Radices omnes incipiente foliorum defluuio legendas, & cælo sereno, censuit Dioscorides, cui in quibusdam Galenus & Auienna & Mesues consentiunt, in alijs diuersa sentiunt. Sunt contra quibus placet magis, radices esse legendas priusquam in caulem, folia, florem, fructum, semen, vis plantæ



## DE COLLECTIONE

propè tota erumpat. Desfluentibus autem folijs, eas esse foetis animalibus similes, hoc est, velut semianimes ac multum imbecillas, nisi si quæ tantum habebant virium, vt etiam earum satis retineant arefacto caule, vt scilla quomodo valida animalia etiam foeta adhuc robusta permanent, nisi dicas etiam in illis quæ viua & veteri radice repullulant saluam vitalem plantæ velut sanguinem per caulem priusquam arescat, in radices, licet non totum, refluere, vt in arboribus fit.

Quouis tempore colligi possunt, quæ hominum cultu & satione crebra in omnem anni partem vegetæ incidunt, quales ferè sunt hortenses, alimentosæ, vt apij vulgaris, buglossi vtriusq;, betæ, lactucæ, intybi, oxalidis, raphani, napi, pastinacæ, sisari, cari, panacis, cepæ, porri, alij: & præter has erraticæ, dauci, gingidij, caucalidis, ari, dracunculi, cyclamini, periclymeni, cotyledonis: nam hæ quinque, vt bulbosæ quædam aliæ, etiam æstate siccatis folijs, plenæ sunt, & frequenter autumnno regerminant, alimenti pinguis & crassi copia.

Quæ verò solius naturæ sponte crescunt, aut semel à nobis tempestiuè seruntur aut plantantur, ferè sunt optimæ solo aut vere,

aut



aut (vt dixi) autumnno, paucissimæ æstate  
aut hyeme.

Quin & hæ quas multis anni partibus  
communes diximus, sunt præstantiores  
cum tempestiuè satæ adoleuerunt & vi-  
gent: alijs verò téporibus ignauiores, quan-  
do vi quadam & holitoris opera & irriga-  
tione coguntur adlescere sub cœlo sibi pa-  
rum propitio, quale æstiuum est ac autum-  
nale & hyemale.

Sic vère ipso quando primùm germinare  
incipiunt, nobis leguntur in annum inula  
(Augusto, paulò post) althæa, iris, acorus,  
symphytū, ruscus, (Ellebori albi radicē vere  
colligit Aëtius) asparagus, petroselinum, a-  
pium, fœniculum, bryonia, cyperus, rubia,  
saxifraga, valeriana; cryngium, tormentilla,  
pæonia vtraq;, polypodium, gramen, lilium:  
nisi recentibus aliquando sit opus, sed quæ  
omnino erunt imbecilliores, quàm si quo  
tempore recentes colligi debent, in vsum  
venissent. Hæc omnia Syluius.

• Et rursus, Radices autem legendas cū m-  
folia cadunt, etiam censet Auic. canone 2.  
& Platearius in Aristolochia: quædam ta-  
men alijs temporibus Saladino leguntur.  
veris fine, aut æstatis initio, acorus, gentia-  
na: aut mense Augusto, quando etiam spina.



## DE COLLECTIONE

alba vulgò bedegar, ruscus, bryonia, cypereus, iris, enula campana, dictamn<sup>s</sup> vulgaris, pæonia, glycyrrhiza: vt Septembri peucedanum: Octobri cyclaminus recens & siccus efficax: Decembri eryngium, ijsdem leguntur. Hæc ille.

*Quo tempore radices eruendæ, & quo partium  
Et ad vsum reponendæ sint,  
ex Matthiolo.*

Radicum vires, sicut & aliarum stirpium, partium, non eodem anni tempore æquè in omnibus reperiri: quandoquidem alia hoc tempore, alia verò illo humore prægnantesprehenduntur. Tametsi non desint, qui haudquaquam infirmis rationibus innixi, radices à terra eruendæ asserant semper autumno, cum videlicet folia decidunt, & caules cōtabescunt: alij verò ineunte vere, priusquam folia concrecant: siquidem hisce temporibus radicibus maior vis inest, quàm ceteris partibus. Sed vt ingenuè in hac re fatear, quid sentiam, crediderim ego omnino maiorem succi vbertatem inueniri in his qui vere effodiuntur, quippe quòd plantæ nondum caules, folia, neque flores emiserint,



emiserint, à quibus omnis radicum succus exhauritur. Sed & rationi consonum mihi videtur, autumnales radices omnes, tum paucioris, tum imbecillioris esse succi, quàm vernaes, quod scilicet paucò ante tempore & caules, & folia, & fructus ediderint. Non tamen inficiari velim, quod quæ vèrè leguntur, copiosiore, quàm par sit, humore redundant, illoque longè minus concocto eo, qui in autumnalibus habetur, putredini & corruptioni non sint magis obnoxia, præsertimq; si longo asseruentur tempore. Quare à Dioscoride animaduersa, is sanè iussit stirpium radices effodiendas esse, cum stirpes ipsæ folijs exuuntur. Quod cum varijs anni temporibus eueniat, pro natura diuersarum plantarum, curam impendere oportet, vt suo tempore vnaquæque radix integrè, si fieri potest, cum omnibus suis adnatis euellatur, & in ijs locis, atq; sub ea cœli constitutione, quam maximè familiarem habent.

Porro radices abundè nutritæ sint oportet, ac omni putredine, & labe vacantes: non ita tamen, vt præ nimio alimento ex pingui solo, vbi nascuntur, accepto, debitam & humoris copiam, & corpulentiam meram excedant, neque vt eiusdem alimenti inopia ina-



## DE COLLECTIONE

nes, & rugosæ reddantur. Quod cum maximè perspexisset Galenus de iridis radicibus differens libro primo de antidodis: In vniuersum (inquit) ex omni medicinarum genere illæ radices inutiles habentur, quæ inanes sunt & rugosæ. Atque illæ quidem deteriores sunt mediocriter nutritis, & mediocrem magnitudinem nactis, quæ crassitudinis modum excedunt, & plus humoris in se continent, quam illis vsu veniat. Hæc Galenus.

Cæterum vbi radices à terra fuerint exemptæ, primum quidem tandiu aqua clara elui debent, donec omni vndique terra, vel limo penitus abstergantur: mox deraditum à fibris, tum capillamentis omnibus, quibus vniuersim ferè omnes comantur: postremo siccare eas conuenit omni adhibita cura. Quod si fuerint quales fœniculi, apij, asparagi, rusci, polipodij, rubiæ, intubi & consimilium, in vmbra, vbi orientales ventii respirent, diligenter siccentur. At omnino cauendum est, ne sole feriantur: quippe quoniam potior earum pars ab eis procul dubio euanesceret, vtpote raris & tenuibus. Verum enimuerò si ex eis fuerint, quæ natura crassæ sunt, veluti gentianæ, heleenij,



nij, mandragoræ, bryoniæ, & id genus aliarum, & aer sit nubilus, & hyems, ne in umbra situ tabescant, ac proinde marcescant, in sole ac vento tuto siccare possunt. Quod commodius fieri potest, si frustatim dissectæ, ita tenui funiculo traiciantur, ut partes non se contagant, aut cratibus impositæ quotidie sæpius manibus reuoluant. At qui curandum est, ante quam siccantur, ut lignea matrix, quæ omnibus ferè radicibus includitur, ipsis in longum fissis, integra eximatur: quippe omnino inutilis est, nullamque vim obtinet, etsi gentiana, cyclaminus, aristolochia rotunda, iris, bryonia, centaurium maius, nymphaea, aliarumque complures absque matrice suas præ se ferant radices.

Siccatis radicibus, quod planè constet eas sine tabe, & teredine, per tempora asseruari posse, ijs reponantur in locis, ad quæ solares radij non penetrent, neque fumo pateat aditus, & quæ neque vliginosa sint, neque puluerulenta. Sit igitur locus eminens & siccus, ad Septentrionem verges, vel etiam ad meridionalem plagam, quando scilicet radices ipsæ non prorsus exiccatae reconderentur: adhibita tamen cura, ne eo tempore austri humidissimi flatus admittantur. Ita de-



## DE COLLECTIONE

nique recondi ac seruari possunt tot annis, quot ab inanitate, teredine, & tabe vindicari valeant. Nam etsi quæ tenues sunt, vt asari, phu, asparagi, rusci, & id genus aliæ anno duntaxat perennent, veratrum tamen vtrunque, quamuis radicibus constet tenuibus, ad 30. annum vsque perdurat. Hæc ex Mathiolo.

Videtur sanè radix quæque melior ante herbam vere, vel autumnno herba denuo marcescente: deinde ante caulem, tertio ante florem, quarto ante semen aut fructum. Quamobrem vtile fuerit scire quo tempore quæque herba floreat, aut semen maturet. Videntur enim quæ autumnno florent & semen maturant, aut paulò ante maturaerunt, illarum radices colligendæ vere: contra quæ vere florent aut fructificant, autumnno: aut certe vere antequam florent, cum primum scilicet germinare apparent. Porro quæ media æstate florent aut fructificant, harum radices vere autumnno colligas parum referre puto. si tamen propius autumnum flos fructusue earum accesserit, vere potius radices colliges, & contra. Denique nunquam florentium, radices vere autumnno colligi possunt, vt filicum: herbæ autem ipsæ earundem, mense Maio potissimum



mum carpendē. Filix quidem (vt Tragus docet) circa mediam æstatem semen habere videtur.

Radices stirpium quæ florent colligendæ sunt aliàs

Citius, Augusto nempe vel autumnō, vt artritice, ellebori nigri, consiliginis.

Tardius aut diu: vt species gentianæ, saxifragæ pimpinellæ similis, vère.

Sed utroque tempore (vère & autumnō) quædam à principio, aliæ medio, aliæ & fine. Vt in fine veris, quæ autumnō florent, & germinat tardius: in fine autumnī, quæ æstatis medio aut fine floruerint: initio autumnī, aut in fine hyemis, quæ vère aut initio æstatis florent, Gesnerus.

De radicum tempore collectionis, exsiccationis modo, & loco conseruationis siue repositionis, vide plura apud Nicolaum Præpositum lib. i. cap. 3.

## DE COLLIGENDIS ET

*asseruandis corticibus ex  
eodem.*

Cortices, qui fructibus auferuntur, vt cytrij, punicis, & cucurbitis, quique arboribus decerpuntur, veluti thuri, ligno gua-



## DE COLLECTIONE

iaco, sambuco, ac fraxino : qui item herbarum radicibus detrahuntur, vt capparum, mandragoræ, thapsiæ, alypiæ, pytinæ, ac aliarum, non secus sunt siccandi, atque radices: quin etiam similiter reponendi, Matthiol.

Cortices, quæ ex radicibus stirpium colliguntur, colligi debent eodem tempore, quo radices legi debere modò dictum est, quæ verò ex seminibus aut fructibus, colligantur tempore seminibus aut fructibus præscripto, & eodem quoque modo reponendi ac siccandi. Durant verò tanto tempore, quanto ea ipsa à quibus illi sunt collecti: nisi quod fructuū cortices, vt citri, aranciorum, granatorum, seorsim à fructu diutius integri viribus conseruari possunt,

ob superflue humiditatis exiccationem. Nicol.

Præpos.

TABVLA



## TABVLA STIRPIVM

PRIMA. ALPHABETICE ENVMB

rans tum florendi, tum fructificandi initia &  
fines: nec non etiam alia, quæ ad ea-  
rum cognitionem sunt non  
inutilia.

**A** Bietes omnes Maio & Iunio folia ve-  
tera nouis succrescētibus abijciūt.  
*Abrotonum mas, stabw in 13. flores Au-  
gusto. ostendit luteos, fœmina v. albos flores.  
e. cal. & fice. in ter-  
tio ordine. recessu. 5. q. abrotonum, & frigidum ante febrilis & rigoris  
invasionem, nung adveniente infestabitur. Lumbricos interimit.*

Absinthium commune floret Iunio: in  
horto verò meo vmbroso, medio & fine Iu-  
lij floret.

Absinthij species, vt quidam non rectè  
putant, welsamen, flosculis luteis, qui sili-  
quis suis præfiguntur, vt in filio ante patrè,  
floret Maio.

Absinthium in hortis floret Augusto.

Acer maius, *aborn*, huius generis arbo-  
res quædam Maio florent: aliæ nunquam  
florent, omnes quidem steriles sunt.

Acer minus, id est opulus, vt ego inter-  
pretor, in planis semen maturat melsis tem-  
pore, hoc est Iulio mense: in montibus Se-  
ptembr.

Aconitum cæruleum, napellus, in hor-



## DE COLLECTIONE

tis floret Iulio, & in montibus tardius ferè,  
nisi aprici fuerint. Semè fert Iulio in hortis.

Aconitum luteum, medio Iunij incipit  
florere. In horto meo Augusti principio, flo-  
re subalbido è luteo. Semen fert, Augusto.

Aconitum flauum in hortis, floret post  
cœruleum, & in fine Iunij.

Aconitum quod Lupariam vocamus,  
flore palido, wolffmurtz floret Iulij medio,  
vel in fine, nisi loco crescat aprico.

Acorus vulgaris floret Iunio: semen fert  
Septemb.

Acorus falsus officinarum, floret Maio.

Ægolethros vere floret: herba veneno-  
sa capris & iumentis, Plinius. Hanc ego in  
Boue cap. 3. descripsi, & ostendi esse illam,  
quam vinitores nostri malum Heinrichum  
vocant, aliqui hundts blumen, Saxones  
Schuppenwurtz.

Ægolethros nigra rotunda, semen fert  
Maio.

Alcali è semine natum, floret Iulij me-  
dio.

Alcea Sigmaris wurtz, floret Iunio, Iu-  
lio & Augusto.

Algæ palustres & fluuiatiles (wasser vi-  
olen: & Ampelos fluuiatilis) itē hydrolapthi  
folio & flore quædam in lacu tantum pu-  
to, flo-



to, florent principio Iulij.

Alismatis genus, quod Fuchsius Ophryn nominat, Alysson Plinij, simile rubiæ, maius & minus, wald meyster/klein vnd groß/florent Maio.

Alisma Italorum, & centaurij floribus purpureis, principio Iunij floret.

Alliaria floret Iunio mense.

Allium alpinum radice reticulata: foliorum eius forma refert allium vrsinum, floret Maio.

Allium montanum radice oblonga, rubescente, folijs angustis, floret Augusto.

Allium vrsinum, waldt noblauch/ramseren/lac exprimitur ei ex pericarpis eius triangularibus, floret in fine Aprilis, & Maij principio.

Allium hortense & sylvestre, florent Iulio.

Alnus vide etiam in Betula. Alnus suis iulis, qui ei non decidunt, floret in Vere. Sed autumnos appetente semine maturat circa Nouembrem.

Alfina hennentarm vulgaris, flosculis albis, floret Februario.

Alfinæ specices in vineis, folijs crassiusculis, angulosis, flosculis cœruleis, floret Februario.

H



## DE COLLECTIONE

Alfinę species duę, flosculis cœruleis quas pingit Fuchsius: quarum altera folijs est sub rotundis, angulosis, carnosis, pilosis, in vineis. Altera folijs parvis, serratis. Item Alfine quędam recto caule, pilosa, flosculis candidis, minimis in corymbis, insipida: Cæteris sui generis sicciior, florent Martio.

Alfine maior & minor florent Septem. & Octob.

Alfines species glutinosa, flosculo concavo, per summum multifido, floret Iunio.

Alfine semen profert Iulio.

Althæa floret Iulio & Augusto.

Althæa peregrina, luteo flore, floret Octobri.

Alysson Ruellij, pseudalysson in pratis, floret Maio. Alysson Ruellij, quā ego quidem herbam inutilem & minime Alysson arbitror, floret Iulio. Alysson pratense seu Ruellij, ~~flaffenfrut~~ / crepitu seminum maturorum intra clypeos concussos, semen fert Iunio.

Alysson quorundam, floret Augusto. Sed aliud Patauio nuper ad nos missum est.

Amaracus, maiorana, samfuchum, floret Iulio, Augusto & Septemb.

Amaranthus communis minor, flos amoris



**moris**, quibusdam, folijs bliti ferè, spica purpurea, folbly, floret Augusto. Et alius flore non vt reliqui, sed herbaceo quodam verticillo floris loco, folij pars media ad pediculum, punicea est. Maior cuius folia nigram maculam habent, paniculis longis, ramosis, Augusto itidem.

Amaranthi Pliniani species procerior, rarior, longissimis paniculis, lange folbly, floret Octobri.

Ammi, floret Iulio & Augusto.

Ammi cuius semen simile est semini petroselini vulgaris, floret Septemb.

Ammi in hortis nostris satum, floret Octobr.

Amomum falsum, pseudamomum, floret Aprili.

Amygdalus cum persico floret in vere, Aprili: fructum fert Septemb.

Anacampteros, habent frut, vide Telephium. Semen fert Iulio.

Anagallis, morsus gallinæ, floret Maio & Iunio.

Anagallis rubro flore, floret Iunio, Iulio & Augusto mensibus. Semen fert etiam Iulio.

Anagallis purpurea, in vitibus, floret Iulio.



## DE COLLECTIONE

Anagallis aquatica maior, floret Maio & Iulio.

Androsæmon, floret Iunio. Vide Bellis.

Androsæmon maius, caule quadrangulo cum eminentijs foliosis, & aliud caule rotundo, florent Iulio.

Androsæmon minus, perforata, floret Iulio.

Androsæmon, id est perforata, & androsæmon Fuchsi, cui paucioria, maioraq; sunt folia quàm perforatæ, fūnrat, ego posteriorem ascyroides dixerim. Sed sunt omnino congeneres herbæ. Vtræq; Iulio & Augusto florent.

Anemone lutea quædam, trollblumen/ floret ad finem Aprilis.

Anemone montana, semen profert Augusto.

Anethū floret Iunio, Iulio, & Augusto.

Angelica odorata, principio Maij floret.

Angelica odorata laser Gallicum, floret Augusto.

Angelica inodora, quæ vulgò Aquileia, floret Maio.

Angelica aquatica, floret Iulio & Augu.

Anguria in horto meo, folijs in cucurbitarum genere maximè diuisis, fert fructū Iulio.

Anisum,



Anisum, floret Iulio.

Anonis, floret Iulio.

Anthemis, flores Iulio.

Antirrhinon folijs hyssopi: & aliud aruense, flosculis purpureis, folijs perangustis, floret Iunio.

Antirrhinum folijs oblongis maius & minus, vel purpureum & album, floret Iunio.

Antirrhini genus, paruis folijs, floribus albicantibus, floret Iulio.

Antirrhini genus flore cœruleo, floret Aprili.

D. Antonij herba, sic dicta, quod igni sacro medeatur: aliqui Lysimachij adnumerant, vt Fuchsius. Sunt qui filium ante patrē vocent, quod semina in exilibus & oblongis filiquis, antequam flos apparet contineantur. Plures huius sunt species. Floret Iulio.

Aphace Fuchsi, genus vicæ sylvestris, floret Maio.

Aphacæ vel vicæ, aut potius orobi species, floribus flauis in caule recto spicatim digestis: folijs è viridi candicantibus, quorum bina semper eminent cum capreolo medio, floret Iunio.

Apios quorundā, erdnuß/floret Iunio.

Apium, floret Iunio.



## EE COLLECTIONE

Apij genus palustre folijs cicutæ latioribus, floret Aprili, & Maio. Vide ne seseli.

Apijs cognata herba umbellifera è semine nata anno 59. in vasis, folijs saxifragæ hircinæ, olens petroselinum, floret Iunio.

Apij genera, hortense & montanum Fuchsij, à quo ille petroselinum vulgò dictum nihil quàm cultu differre conijcit: apium verò hortense veterum id esse quod vulgò apium, Ἐπρίχ vocant: ego neutram eius sententiam probo, sed partim experientia mea, partim doctorum Galliæ Italiæq; consensu, apium vulgò dictum eleoselinon facio, id est apium palustre: petroselinum verò, vulgò dictum, veterum hortense. Vide quid Belonius. florent Iulio.

Apium, semen fert Septem.

Aquilegia, in fine Aprilis floret, & Maio.

Aquilinæ vel Aquilegiæ genera omnia, florent Maio, gfült/wyß/Blanc.

Arbutus in calidis regionibus per Galliam & Italiam, fructum fert Septemb. Germania arbuto caret.

Argemone altera, gensericus, vulgò Potentilla, floret Maij medio, & Iulio.

Argentaria, quæ species herbæ stellæ existimari potest, floret Iunio.

Argen.



Argentaria alpina, floret Maio.

Aristolochia longa, floret Iulio.

Aristolochia phragmites, vt sic vocem, quam nostri haectenus falsò pro rotunda habuerunt, purpurea & alba, floret Martio & Aprilis principio. In fine Aprilis semen fert: siliquæ etiam virides factæ statim dehiscunt: semina nigrore splendent.

Aristolochia crematis, floret medio & fine Maij, & Iunio.

Aron, Iulio & Augusto semen fert, floret Martio:

Arthemisia, floret Iulio.

Arthemisia tenuifolia, vide Mellefoliû.

Arthritica communis syluestris, pallida floret Februario.

Arthritica pallida, quæ singulis pediculis singulos flores sustinet, Curia Retorum, incipit autem florere Decembri si tepor sit, & in Aprilem se extendit.

Arthritica die gfült/floret Maio.

Arthritica præcipuè odorata, & tardius ea montana in rupibus, quam aliqui Lunariam, aut folium montanum vocant, floret Aprili, & species illa Curia missa, tota ferè hyeme floret.

Arthritica alpina lutea, odoratiores flo-  
ribus, rubra folijs, Aprili floret.



## DE COLLECTIONE

Arthritica alpina, gāle/rote/wyse in mō  
tibus iuxta Thunum, floret Iunio.

Arthritica, schlüssel blümly, sed pallida,  
inodora, preuenit odoratam, Martio floret:  
& locis tepidioribus etiam Februario emi-  
cat. Montana saxatilis propter loci frigidita-  
tem tardius floret.

Arthritica odorata

Montana, petræa, gāl/ret: in hortis  
floret Aprili.

Pratensis

Hortensis, gfült/ vnd vngfült

Arthritica inodora

Pallida

Cœrulea

Species est illa Curia missa, cui singuli  
flores in singulis coliculis breuibus.

Omnes Martio florent.

Minor arthritica flore purpureo, sed  
parum odorato, in horto meo, me-  
dio & ad finem Martij floruit.

Arundo, floret Augusto.

Asarum, floret Februario. Aliquando  
in fine Martij, vel etiam eius principio & me-  
dio, itemq; Aprili. Alicubi Augusto. Circa fi-  
nem Maij & Iunio semen fert.

Asclepias, quam vulgo hirundinariam  
vocant, circa medium & finem Maij floret:  
itemq;



itemque Iulio & Augusto.

Ascyron Fuchsj, hyperici seu perforatae species, maius eo, Iunij medio & Iulio.

Asparagus, floret Maio & Iulio.

Aspergula herba repens in terra super muris (ciuitatum praesertim) rubiae cognata, folijs per genicula quaternis, superius binis: plurimis ab vna radice coliculis, flosculorum albicantium corymbis, qui vt plurimum foris puniceo vel roseo colore sunt, floret Iunio & Iulio.

Asphodelus Germanis haecenus falso creditur, goldgilgen. Ego omnino lilij genus facio. videtur autem lilium cynorrhodon dictum Plinio. floret Iunio.

Asphodelus marinus in Vere satus, floruit in Autumno & semen perfecit in Vere sequente demum, in cella seruatus, ac rursus flores emisit, partim eodem caule, partim à radice media, medio Aprili.

Aster Atticus Fuchsj, floret Augusto & Septembri.

Astrantia, floret Maio.

Astrantia, quam aliqui Laser Germanicum vocant: Ego non hanc, sed Anglicam odoratam Laser Gallicum aut Germanicum dixerim, floret Iunio.

Astrantia nigra in horto nostro, floruit Iunio.

H 5



## DE COLLECTIONE

*Astrantia nigra* in monte Pilati, Augusto floret.

*Astrantia vel imperatoria nigra*, maior & minor, floret Iulio.

*Attractylis vtraq;*, Kardobenedicten der zam vnd der wild/ Augusto florent.

*Atriplices* florent Iunio.

*Atriplicis sylvestris species*, Bonus Heinrichus, floret Iunio.

*Atriplex sylvestris*, floret Iulio in aruis & alibi: semen fert Octobri.

*Auena*, floret Iunio.

*Auicularia*, Syluij, vide Viola.

## B

*Bæreutaapen*, *Spica celtica falsa*, floret in fine vel medio Iulij.

*Ballote*, in fine Iulij floret, & Iulij initio: Purpureo flore, in medio Iunij. *Ballote* floret etiam Septembri.

*Ballote rarior*, floret Augusto.

*Balsaminæ pomifera herba*, Augusto & Septembri floret simul & fructus profert.

*Barba caprina* quæ in syluis nascitur, floret Iunio: radice magna, lignosa, flore magno, muscoso, albo, odorato. Diuersum ab hoc genus locis humidis nascitur, *Ulmaria* quibusdā dicta, nostris *Ymbenfraut*, quod & Iulio floret.

Barba



Barba caprina, floret in fine Maij & Iun.  
aliquando citius. Fructum facit Iunio.

Barba senis, vide Coronopodem, *Habermarch*.

S. Barbaræ herba, quam Galli carpentariam vocant, erucæ vel nasturtio congener, Maio & Iunio floret. In hortis Maio mense ferè defloruerat etiam eius initio: & siliquas ostendit. Italica herba sancta.

*Beinhülzen* frutex, floret Maio: semen fert Iulio.

Bellis vrbana & syluestris, Galli Pasquetam vocant, quod tempore Paschatis floreat, floret Aprili. Syluestris maior & minor floret Nouem itemq; Augusto.

Bellis maior, quam vulgò à tempore quo floret Diui Iohannis florem nominant, (vt etiam Androsæmon seu perforatam, quæ Iunij tempore florere incipit) floret Iunio circa 24. diem.

Bellis maior, floret Maio.

Bellis maior syluestris & hortensis, floret Iulio.

Bellis maior & minor, floret Septemb.

Bellis minor hortensis, floret Maio & Septembri.

Bellis hortensis, floret Augusto. & Decembris initio.



## DE COLLECTIONE

Bellis minor, quæ cœlo & regionibus tepidioribus hyeme etiam non deest, floret Martio, eadem hortensis alba, purpurea, Martio.

Bellis albus & ruber in hortis: itemq; sylvestris, floret Iunio.

Bellis semen fert Septemb. floret etiam nonnunquam Februario,

Betæ duo genera, florent Iulio.

Betonica, floret Maio, Iunio & Iulio.

Betonica Pauli Turnero: quæ & Aprili floret & Maio: & fortè toto anno, si in loco aprico sit, flosculis paruis, subcœruleis, herba pulegio vel nummulariæ potius similis est, & similiter repit, (alijs puto, *Steinpooley* est illa betonica.) floret Martio.

Betonica Pauli pulegio similis, quam Turnerus describit. Similis est nummulariæ, sed flores exiguos albicantes ædit: seminum conceptacula, vt alysson vel bursa pastoris, floret Iulio.

Betonica altilis, floret Octob.

Betonicum altile, floret Septemb.

Betonicum altile, flores caryophylli vulgò dicti, *Steinnâgele/wilde grasnâgele/* florent Iulio. In cellis verò domuum vel caueis etiam Decembri floret.

Betonica altilis, caryophyllus flos, medio Iunij



Iunij incipit, albus puto prior, wyß/root/  
lybfarb/treu ffr.

Betonica foetida vocetur, herba foetida,  
caule quadrangulo, cubitali, flore betonicae,  
pericarpis leniter aculeatis, vt & betonica,  
folijs oblongis, angustioribus quam beto-  
nica, floret in fine Iunij.

Betonicae species minor, Friesen eugle/  
root vnnß / principio & medio Maij  
florent.

Betonica Aeginetæ Turnero, floret Apri-  
li & principio Maij.

Betonicum montanum quoddam, flori-  
bus multum dissectis, purpureis, in pratis  
siccis montis Melam, floret Augusto.

Betonicum aliud montanum locis saxo-  
sis vbi ferrum eruitur, innummeris ab vna  
radice cauliculis, flosculis albis, radicibus  
longis, subrufis, floret Augusto.

Betula suis iulis floret in vere, qui simili-  
ter vt alno ei non decidunt, donec autumnus  
semen perficiant: sunt enim illi loco semi-  
nis, vt alno quoq;.

Bistorta maior rugosioribus folijs, & mi-  
nor lenibus, Maio & Iunio florent. Limo-  
nium interpretor.

Blattaria Fuchsj, verbasco similis, aut po-  
tius species verbasci, floret Iunio.



## DE COLLECTIONE

Blitum album, floret Iulio.

Blitum hortense rubrum (puto & viride esse, Badæ vidi) contra dysenteriam calceis imponi iubent, floret Iunio.

Blitum maculis nigris in folijs. Item hortense succo rubro, floret Iunio.

Borrago, floret Iunio, Iulio, Augusto, Septemb. Octobri, Nouemb. & locis tepidioribus Decembri. Mihi quoq; Aprili floruit, & in fine Maij.

Borrago montana Curiz, flore flauo, in fine Maij floret.

Botrys, floret Iulio & Augusto: semē fert etiam Augusto.

Branca vrsina, Iunio et Iulio mensibus colligitur, dū floribus & semine abundat, Fuchs. Facit autem duplicem huius nominis herbam, nempe Acanthum verum & germanicum, qui sanè nō Acanthus, sed Sphondylium est.

Brassica, floret Maio, Brassicæ species florent Augusto.

Bryonia seu vitis alba, floret medio & fine Maij. Itemq; Iunio, Augusto: florem fructui prætendit Iulio. Semen gerit Septemb. Vide etiam Vitis alba.

Buglossus maior, floret Iunio.

Buglossus vulgo dicta minor, quam alij  
Cyrion



Cyrsson esse conijciunt, floret Iunio.

Buglossus Italica, floret Maio.

Bulbine, Blauw meyen rößle, floret April. Primū minor, postea maior, quæ toto anno viret. Bulbine maior, puto circa finem Martij floret.

Bulbus syluestris, flore luteo, instar calathis, quæ Codiaminū dixerim, floret Martio.

Bulbina minor, flores ostendit Martio, sed aperit Aprili demum.

Bulbus ille Kyburgo, floret Martio.

Buphthalmus, siue cotula non foetida, Iulio & Augusto carpitur, & durat vsq; ad autumnū medium.

Buphthalm⁹ von Augspurg, floret Iunio.

Buphthalmus ex Gallia missus, rücht wie die cotula nō foetida, vel vt bellis maior suo flore, floret Iulio.

Bursa pastoris, floret Martio, Iunio, Iulio, August. Septemb. Octob. Nouemb.

Buxus, semen fert Septembri, floret Februario.

## C

Cacalia lutea, vnser frauen schüle, floret in Maio.

Calaminthæ genera tria Fuchsio : sed quam ille tertium genus Calaminthæ facit.



## DE COLLECTIONE

ego conyzæ genus tertium dixerim, iudicet eruditi, florent Iulio.

Calamintha aruensis, sisymbrio cognata specie & odore, floret Augusto. Item aquatica similis aruensi, sed in summo etiam florens: floret Augusto.

Calamintha, incipit florere in fine Iunij.

Calamintha montana, floret Iulio: in collibus passim circa Badam, Augusto & Septembri.

Calathiana verna, Brendel blümle / Junckhere blüm / April. Blauw / in fine Aprilis: alias enim autumnales trium generum noui: floret Aprili.

Calathianæ, autumnales violæ cœruleæ, ex quarum genere Petilium florem Plinij dixeris, radicibus amarissimis, de genere gentianæ, floret Septemb.

Calceoli diuæ Mariæ, folijs ellebori, principio Maij florēt, & Aprili.

Calendula vel Caltha, floret Maio.

Calendula, floret Iunij medio, Septemb. Octob. Nouemb. Tota hyeme floret locis tepidioribus, & in domo condita.

Caltha siue Calendula, floret Iulio & Augusto.

Caltha palustris, maasblūmen: mas ramulis rubentioribus, flore magis tincto: fœmina mi-



na minor, albioribus, flore luteo minus tin-  
cto, floret Aprilis medio.

Campanula siue vuularia, halß frant, Iu-  
lio & Augusto floret.

Campanula cœrulea, 3äpffle frant/ vide  
Vuularia.

Cannabis, floret Iulio.

Cantabrica quorundam (sed non est, cum  
radicem habeat inutilem) caule vno, iun-  
ceo, cubitali: folijs vt polemonium ferè al-  
bicantibus: calycibus elegantibus, pentago-  
nis, calathi forma, & quibus flos quinq; fo-  
liorum roseus prodit. Sponte in aruis nasci-  
tur, & floret Iunio. Lychnis quorundam.  
Cartheüser Blümle.

Capsicum siue Cardamomum Arabicum  
(non placet) Indianischer psäffer/ rooter  
vnd Brauner Calecutischer psäffer/ cuius a-  
liquot differentias, ex figura siliquorum Fu-  
chsius describit: quidam hanc herbam sili-  
quastrum nominant. Atqui capsicum con-  
stat herbam non ita pridem ex nouis regio-  
nibus aduectam esse: siliquastrum verò Pli-  
nij tempore in vsu fuisse, de qua ille lib. 19.  
cap. 12. sic prodidit. Panax piperis saporem  
reddit, magis etiam siliquastrum, ob id pipe-  
ritidis nomine accepto. Et mox: Libanotis  
seritur semine, &c. eadem & siliquaastro satio



## DE COLLECTIONE

(Tarchon non seritur semine, sed propagatur) nec alibi aliud quicquam apud veteres. (quod sciam) de siliquaastro traditur, & quam à siliquis nomen habere videatur, non tamen est necesse, quoniam id veterum nemo scripsit. Potuit enim aliunde hæc vox detorqueri, ut fortè à Salicastro, quæ omnino clematis altera est (ut nos obseruauimus) amplexi caulis planta, & vrens, piperis scilicet sapore etiam ipsa. Ruellius costum hortensem vulgò dictam siliquastrum facit, quæ & ipsa siliquas non fert. Sed hæc amariuscula, & quanquam acrimonia non careat, pipere tamen longè inferior est. Itaque quoniam tam angustis descriptionibus adhibendæ sunt coniecturæ, Siliquastrum esse dixerim herbam. Tarchon (Tarch) Arabibus & Symeoni Sethi vocata: quæ duorum generum est, vna syluestris, pyretro recentioreū quidam adnumerat, altera hortensis. Vidi enim in Sabaudia in hortis & piperitum vocari, ad cōdimenta laudatam, aiebant autem semine feri: aliqui draconem acetarium vocant. Vetus quidem nomen aptum, nemo adhuc imposuit.

Capficum, cardamomum Arabicum, floret Augusto.

Caput monachi, halicacabus puto Fuch-  
sij, floret Iulio. Carda-



**Cardamomum Arabicum**, vulgò piper rubrum, floret Septemb. In nostris hortis florere ante hyemem (Octobri) non desinit, fructus interim maturans. In fine Septemb. vel Octobri potius fructum edit.

**Cardiaca**, quam Lupi pedem Ruellius vocat, lycopodem: floribus hirsutis, mediocriter amara, floret Iulio & Iunio.

**Carlina** noctu se claudit, ad Solem aperit: in horto meo floruit Iulio.

**Caros**, vulgò Carui, *Kümich*, floret Aprili, & Iunio. Carus albus & purpureus, *wyffer vnd roter Kümich* / floret Maio.

**Carduus asininus communis**, floret Augusto. Et alius quidam procerus in syluis angustioribus folijs.

**Carduus asininus**, in nullo medicine vsu, floret Septemb. & Nouemb. fert semen Octob. & Nouemb.

**Carduus aruensis maior purpureo flore** (qui flore nondum nato moschum olebat,) floret Iulio.

**Carduus aruensis**, *Baberdistel* / floret Iunio.

**Carduus benedictus**, de genere Cnici agrestis, sed apud nos & cæteris mihi cognitis regionibus satius tantum, floret Iulio & Septembri.



## DE COLLECTIONE

Cardui genus maculis albis, quod à pleuride vulgò cognominatur, floret Iunio.

Carduus palustris, id est, humidis pratis nascens, flore purpureo, &c. nitt hasen fôl. floret medio Iunij.

Caryophyllata floret Iunio: fert semen Iulio.

Caryophyllata vrbana & sylvestris, floret Maio.

Caryophyllata sylvestris illa, quam aliqui Lychnidem putauerunt, locis saxosis, & apricis, floret Iulio.

Caryophyllatæ sylvestris genus, mürwillen, flore valdè dissecto, floret Maio & Augusto: dicta mürwill, à laceris & dissectis vestibus, quas referunt flores variè diuisi.

Caryophyllata aquatica, floret medio Aprili.

Caryophyllus Indicus vel Portugallie minor, floret principio & medio Iulij. Caryophylli Indici domi inclusi, vsq; ad natalem Domini florent.

Castanea iulis, floret vere: maturescunt verò Septembri.

Caucalidis species puto, multis caulibus, folijs paruis, dissectis vt in Dauco hortensi, rota læuis, radice vt apij, alba, subamara, ymbellis albis, Caro similis est specie & radice, eiusq; sapore, floret Maio. Cen-



**Centaurij** maioris species minor & degener, in campis, flore puniceo, calyce squallido, & squammatim compacto vt cyanus: folijs indiuisis minor, in pratis, heu wblumen: diuisis folijs maior, calyce magnitudine auellanz, in collibus, florent Iulio. Vide Rha ponticum.

**Centaurium minus**, flore rubro: & quod rarius est, albo, floret Augusto.

**Centaurium minus**, circa finem Iunij floret. Item kleine rhaponicken principio & medio Iunij.

**Centimorbia**, nummularia Fuchfio, nater Fraut/pfenningfraut/ fortè Echios altera Plinij, pulegio similis, floret Iulio.

**Cepe**, floret Iunij medio & Iulio.

**Cerasus omnis**, floret Aprili.

**Cerasa duracina**, knellkriese, quòd crepèt sub dentibus edentium, minora cæteris, sicca, cum puncto eminente in summo: Dulcia etiam in alpibus, maturescunt Aug.

**Cerasa dulcia** diuersorum generum maturam habem? Iunio & Iulio: acida verò tùm rubentia dilutiora, amarella vocant nostri, tùm nigricantia solidiora, quæ visula dicūt, Iulio. Sed omnium postrema maturescunt.

**Cerifolium**, chærephyllon maasßblumen, floret medio Aprilis & fine, itemq; Maio.



## DE COLLECTIONE

Chamæbuxus, vt nos vocamus: suffrutex multis à radice cauliculis pedalibus per terram stratis, folijs buxi, floribus vt viciarum dulcibus, sed colore partim ex albo, partim flauo. Nascitur collibus apricis & siccis, floret Aprili.

Chamæcyparissus, floret Maio.

Chamæcyparissus, Cypriessentraut/ quam aliqui abrotonū fœminam putant: ego verò aliam abrotonum fœminā noui, floret Iulio.

Chamæcyparissus, flosculus, qui se in ambitu capituli aperiunt, veluti galion habet, colore & figura, floret Iunio.

Chamædrys vera, floret Iunio & Iulio.

Chamædrys fœmina Fuchsi, cuius apud veteres quod sciam, nulla mentio, floret Iul.

Chamædryi similis herba, quā aliqui Teucrium putant, flore cœruleo, duorum generum, floret Maio.

Chamædryi similis folio, alpina herba, semine lanuginoso, semen facit Augusto.

Chamæleontis genus, quod nostri vulgò radicem apri vocitant, floret in horto meo Iulij medio.

Chamæleuce Ruellij (quam vulgò moosblumen/ id est, florem palustrem dicunt) hortensis, cui folia florum multiplicia, floret Aprili.

Chamæma-



Chamæmalum, floret Iunio, Iulio & Augusto. Floret autem bis in anno, vere inter legetes, & autumnno in agris rapitijs, Septembri.

Chamæmalum nobile repens, floret in fine Iunij.

Chamæpithys, floret Iunio.

Chamæpithys in horto meo, stirps anni superioris, floret Maio & Iulio.

Chamæsyce in aruis, floret Augusto & Iulio.

Chamæsyce, flosculo singulari minimo, vix apparente in hortulo nostro, floret Maio.

Chelidonium minus, floret Aprili: & maius quoq; tempore calidiore.

Chelidonium maius, floret Iunio & Augusto, itemq; Maio.

Chelidonium minus locis apricis, floret medio Ianuar. & Feb.

Chondrilla, floret medio Maij, Iunio & Augusto.

Chondrilla minor propè Curiam, floret Iulio.

Christophoriana, cost' niger, floret Maio.

Christophoriana acinos nigros profert, cum calidius est ver, floret principio Aprilis.



## DE COLLECTIONE

Chrysanthemon Fuchsi, ranunculo simili, floret Maio & Iunio.

Chrysanthemon verum, vnum magis flavum, alterum minus, floret Iunio.

Cicer, floret Iulio.

Cicer sylvestre floribus albis, radice pollicari ferè, foris nigra, intus alba, dulci, cicerum sapore, grad wie käsen, floret Iulio.

Cichorium, vide Intubus.

Cichorium sativum in horto meo, Augusto floret.

Cichorium vel Sonchi genus, flavis floribus, in muris ferè nascens, folijs herbæ S. Barbare, lactescit id, nec abit in pappos, milithen, floret Octob.

Cichorium, cuius flos cœruleus, Iulio mense ferè defloruit: frequentius verò floret illud cui flos luteus, quod Chondrillam eruditi quidam vocant.

Cichorium sylvestre, floret Septembri, Nouembri.

Cichorium, id est, intybus sylvestris, maior & minor, floret Augusto.

Cici, floret Augusto.

Cicuta, floret Iunio, Iulio & Octobri. Et Maio etiam: & ea quam suspicabar Cicutam.

Cicuta aquatica, Bartsenfrant, floret Iulio.

Cicuta



*Cicuta maior* semine magno aspero, Septemb. semen habet.

*Cicuta* 8. Iunij incipiebat florere *Zur-zachi*: herba cinericei coloris, odore graui, hyoscyami ferè (lacte nullo) punicañtibu8 per caulem & ramos maculis.

*Cicutæ* similis minor in prato, seminibus oblongis, quæ in fine Maij apparent, geminis, non grato odore aut sapore, radice simplici, foris fusca, *cicutaria minor* appellatur, floret Maio.

*Cicutariæ* quædam calidæ inter vites duæ, florent Iunio.

*Clematis Ægyptia*, vulgò *Peruinca*, cærulea & punicea, floret April.

*Clematidis Ægyptiæ* genus, quod in hortis colitur, puniceis floribus, sed flores rari, vt & violæ hortensi nigræ, dasipodij, floret Octob.

*Clematis Ægyptia* in siliquis binis vel singulis, vt in hortensi obseruaui, fert semen Iulio.

*Clematis purpurea*, floret Maio.

*Clinopodium*, floret Augusto.

*Climenum* vtrunque *Scrofularia alba* & nigra, vt *Conyza collina*, floret Iunio.

*Cnicus*, vulgò *Cartamus*, floret Augusto.



## DE COLLECTIONE

**Codiaminum, codianon, floret in fine  
Februarij.**

**Colchicum, herbst blumen, Septembri  
erumpunt.**

**Colchicum circa finem Augusti floret,  
& prius etiam calidiori cœlo: & semen fert  
Iunio.**

**Colchici plantæ paucae, quæ alioquin  
autumno tantum florere solent, anno 1563.  
cum Februarius tepidus esset, florebat.**

**Colytea Fuchsi, welsch linsen Baum, flo-  
ret Maio.**

**Consiligo, leißfrant, floret Februario,  
Martio, Aprili, Iunio: Maio per paucos am-  
plius flores ostendit. Sed, & Nouemb. & De-  
cembris initio.**

**Consolida regia minor & maior, floret  
Augusto.**

**Consolida media, Bugla, gunfelen, flo-  
ret Aprili.**

**Consolida regalis vulgaris minor, wyß/  
Blauw/lybfarbw: & alia magna cœrulea tan-  
tum mihi visa, floret Iul.**

**Conyza muralis, sic enim vocare libet,  
quod in muris circa patriæ nostræ mœnia  
nascatur: herba acris, fruticosa quodam-  
modo, folijs per caulem digestis sine petio-  
lo, ad duos digitos longis, simplicibus, an-  
gustis,**



gustis, caule cubitali, striato, fungoso, floribus per summos ramulos in ambitu subcæruleis, foliolis minutis, cum pappis in medio, qui mox ab initio apparent, radice alba cum paucis fibris, flor. Iulio.

*Conyza palustris* quædam floret Iulio.

*Conyza aquatica* flore calendulæ, floret Augusto.

*Conyza aquatica* species indora, insipida, folijs oblongis, serratis, lanuginosis, floret Iunio.

*Conyza* species, ut videtur, quam Lani floram dixerim, floret Nouemb.

*Conyza* genus flore luteo, latiore, minus cæteris, odoratum, floret Octob.

*Conyza* utraq; *Dürrenwurz* Trago, floret Augusto.

*Conyza* species in aridis nascens in horto meo: item *aquatica* longis & serratis folijs, flor. Iun.

*Conyza* species alia, caule cubitali, singulari (puto) à quo singula folia tres aut quatuor digitos longa, angusta, alternis per caulem sine petiolis prodeunt, flos in summo luteus totus ut *Chrysanthemis*, radiculis minutis, rufis, acribus ut in *ptarmice* no-



## DE COLLECTIONE

*Astra*, nascitur collibus apricis: floret Iunio.  
Vide vtrum *Dürrwurtz* esse possit.

*Conyza alia*!, quam in horto habeo, in colle nascens, floret Iunio.

*Conyza alpina* in horto meo, flor. Mai.

*Conyza montana*, *Böny* / floret Augu.

*Conyzae* genus tertium, vide *Calamintha*.

*Conyzoides* quædam in collibus siccis puto, in hortis viuax, flore calendulæ, floret Augusto.

*Conyzoides cœrulea*, *dētelariam* puto aliqui vocant, flos subcœruleus, mox ab initio pappos ostendit: calida, acris & sicca herba, in muris ciuitatis: & in quibusdam syluis in montis Tigurini superiore ad dextram parte, floret Aug.

*Conuoluulus maior*, semen fert Septembri.

*Conuoluulus maior*, cui flos totus albus, & minor alternis purpureis & albis in flore partibus: qui & *helxine cissampelos* vocatur, & a sine vel iasione Theophrasto, vt nos obseruauimus, floret Iulio. Nascitur propè aquas, sed fluentes ferè, vt *solanum* perpetuum circa stantes.

*Conuoluulus maior*, itemq; minor, quæ & *Cissampelos*, floret Augusto.

Con.



*Conuoluulus minor* (helxine *Cissampelos*) sine lacte, vel potius paucissimo in venis foliorum: nam maior lac habet: & *sepiarius* rarior adhuc, floret Iunio.

*Conuoluulus peregrinus*, hirsutus, flore cæruleo, lactis nihil habet, saporem betæ vel cyclamini, floret August. Granum nil vocant in horto.

*Conuoluulus aruensis* & *sepiarius*, floret in fine Maij.

*Conuoluulo* similis præter quam flore, quam Galli tineam vocant, Germani *spyn/oder schwarz winden*. Ruellius & Tragus *Orobanchen* esse suspicantur, sed nos aliam *orobanchen* nouimus, floret Iulio, & Augusto, fert semen Octob.

*Corchorus* ille, genus apij degeneris & vitiosi, floret Iunio.

*Coriandrum*, semen fert in fine Iulij.

*Cornus* interdum Februario floret, frequentius Martio tantum.

*Cornus* foemina, virga sanguinea, capris grata, vnde nomen apud Gallos, floret Maio.

*Cornus* medio & fine Augusti, itemq; Octobri fructum fert.

*Coronopus*, cornu cerui vulgò, floret Iunio.



## DE COLLECTIONE

Coronopus quidam flore cœruleo, calyce ceu squammis multis tenuissimis, aridis, floret Iulio.

Coryli ante folia ædunt flores rubros croci staminibus breuissimis similes: nam iuli, quos nonnulli flores putant, colore luteo sunt, flor. Feb. & Martio suis iulis.

Corylus sativa, cui nux oblongior, frustum fert Augusto: sylvestris nuces fert Septembri.

Costus hortensis minor, floret in fine Iunij.

Costus hortensis, floret Septembri & Octob. Semen habet Nouemb.

Costo hortensi cognata, herba Iulia dicta, Septemb. floret.

Costi hortensis genus minus, quod aliqui herbam B. Mariæ vocant, in hortis nostris satum, floret Augusto.

Cotula foetida, Parthenium Brassauolæ & Fuchsio, floret Maio, & Iunio.

Crocus Vergiliarum occasu floret, id est Septembri, neque ultra mensis spatium flores durât, qui postquam deciderint, mox folia prodeunt, virentq; tota hyeme.

Crocus montanus, in fine Februarij floret: aliquando medio.

Crocus montanus in partis circa Curiam



etiam copiosè, cœruleus, candidus, & ex utroque mixtus, principio Martij, in horto meo Martij medio. Unus tantum ex plurimis bulbis mihi floruit.

Cruciata folijs per genicula quaternis, herbula hirsuta, flosculis luteis, florere incipit Aprili.

Cruciata rubiæ congener, floret Maio.

Cruciata Gallio cognata, floret Maio.

Crucis flores, dicti à Festo, quod crucis hebdomadam vocant, albi, cœrulei, purpurei, medicis in nullo usu, floret Aprili.

Cuculi flos, mürwillen, floret Maio.

Cucumeres, florent Iulio.

Cucumis anguinus, floret in fine Iunij.

Cucumis anguinus in hortis nostris, floret Iulio, vel ex superiore anno, si planta hyeme seruata fuerit in cella vinaria: vel quod nobis rarum est, ex planta eiusdem anni, vere sata.

Cucumis erraticus, quem aliqui asinum cognominant, floret Augusto, & mihi relictus ab anno priore, medio Maij floruit.

Cucurbitarum genera, florent Iulio, Augusto, & Septembri: maturescunt Septemb. & Octob.

Cumini syluestris genus, quod vulgò



## DE COLLECTIONE

consolidam regalem vocant, *Ritterspöily*,  
floreth Iunio, Iulio & Augusto.

Cyanus, *Fornblumen*, floreth Iunio.

Cyanus albus, cœruleus, puniceus, floreth in fine Maij, & Iulio.

Cyanus montanus, floreth in fine Aprilis, & Maio, in Iunio ferè defloruit.

Cyanus in aruis & hortis, floreth Maio.

Cyclaminus, floreth principio & medio Augusti, & Septemb.

Cyclaminus, ex floribus autumnalibus semen fert Aprili.

Cyclaminus prima in hortulo nostro, floreth Iulio.

Cyclamen puto tardissimè suum semè maturat, quod super terram iacet, nescio an in fine Iulij adhuc maturuerit, cum florem Aprili amiserit, aut Martio fortè.

Cynoglossus minor, flosculis cœruleis, *wie vergiß min nitt*, propè Curiam Rhetorum, floreth Decemb. initio.

Cynoglossus puniceo flore, floreth in fine & medio Maij.

Cynoglossus, floreth Iunio.

Cynocrambe *Fuchsj*: Est autem genus Mercurialis sylvestris, floreth Martio & Apr.

Cyperus, floreth Iulio. In horto meo Augusti principio & medio.

Cytisus



*Cytisus suffrutex* ligno duro in colle  
prope Schaphusiâ floribus luteis, wie trauben  
fröppfle/floret Iulio,

## D

*Daphnoides Fuchsi*, *Thymelea* potius  
species, zyland/floret Aprili.

*Cassutha*, id est *cuscuta*, floret Iunio.

*Daucorum* & *Apiorum* genera confinia  
videntur: sed fortè *apiorum* genera *umbell*  
*as* nudas habent, *daucorum* vero foliola  
subnexa eis in orbem radiata. Itè illa fortè  
diuturniora sunt, hæc ubi semen tulerint, in  
tereunt. Iulio ferè florent,

*Dauci umbellis* albis sunt, aliqui etiam  
roseis puto.

*Daucus palustris* in horto meo, floret  
in fine Iulij.

*Dauci* genus parvum asperiusculum,  
quod circa sepes & muros nascitur inutile,  
floret Iul. semen facit Augusto.

*Daucus sepiarius* floret Iunio.

*Dauci* genera tria, & inter alia, vñum ge  
nus cuius semina hirsutiora sunt & multò  
maiora, quam in alijs generibus, flores ex  
tremi in *umbella* medijs latiores, locis cul  
tis nascitur, floret Iunio.

## K



## DE COLLECTIONE

Dauci inutilis genus in aruis, folijs cori  
andri, glyssen/ semen facit August.

Dauci genus in fossa ranarum, in cuius  
ymbella media nihil purpurei, flor. August.  
Vide Pastinaca syl.

Dauci genus aruense, magnis, latis &  
hirsutis seminibus: florifluis latioribus in um  
bellæ ambitu, flor. Aug.

Dauci sylvestris species folijs non hirsu  
tis in prato, flor. Iul.

Daucus quidam sylvestris, flor. Apr.

Daucus creticus vel alpinus, Gärwurtz,  
Meon ut aliqui coniungunt, alijs tordilion:  
nec multum interest, quando vires (ni fal  
lor) eadem ferè omnium, flor. Iul.

Daucus sylvestris maior, (quē Matthio  
lus pastinacam sylvestrē appellare mauult)  
macula in medio umbellæ plerunque alba,  
aliquando purpurea, in collibus apricis. I  
tem minor inter segetes & alibi, florent  
Iulio.

Dentelaria quam aliqui Irionem vocat,  
flor. Iun.

Dentelaria *σινιστος*, humilis herba, à  
Textore medico missa, flor. Iul.

Dentelaria *κρυκκος* petræa, Vide cony  
zæ muralis.

Dictamnus vulgo dicta, flor. Maio.

Digitalis



**Digitalis Fuchfij**, incipit Maij medio flore  
rere vel in fine, itemq; Iunio.

**Digitalis duplex**, flore minore, albidio-  
re: & alia, flore maiore, pallidiore & intus va-  
rio, florent Iun.

**Digitalis minore flore**, vulgaris, albi-  
cans & maiore flore, tum aliâs luteo, tum  
purpureo circa Coloniâ, folio minus lævis,  
florent Iunio.

**Digitalis lutea & purpurea**, florent in  
principio Iulij: & albicans in montibus.

**Digitalis vtraq;**, semen fert August.

**Dipsacus albus & purpureus**, flor. Iun.

**Dipsacus floret Iulio**. Et similis ei herba  
carduo exiguo, echinato, rotundo.

**Dipsacus flor.** Septemb.

**Dipsacus minor**, floret Augusto: & se-  
men fert Nouemb.

**Doronicum in alpiibus**, flor. Aug.

**Doronicum vulgò dictum**, in horto  
nostro, circa Aprilis finem, in montibus: pro-  
pter niues tardius, *gamsenwurtz/graffoy*/  
floret Maio, & Octob.

**Dorycnium quorundam**, floret particu-  
latim Aug.

**Dorycnium Monspelij putatum**, flo-  
sculis albis per summos ramulos, veluti in  
orbem dispositis: figura quæ pisorum vel



## DE COLLECTIONE

loti, sed paruis, floret Septembri.

Doricnium quibusdam falso dictum, toto Iulio floret.

Draco hortensis, medio Iulio & fine. Item aquaticus, Iulio medio floret serratis folijs.

Dulcis radix, Iunij fine floruit mihi in horto.

### E

Ebulus floret in fine Iunij, medio & fine Iulij: baccas fert Augusto.

Echion floret toto Iunio, itemque Septemb. Fert quoque Septemb, semen.

Echion verum, quod Fuchsius triplex facit, floret Iulio.

Echinopus meus, crocodilium quorundam, floret Iulio.

Echinopus carduus, in cuius capitibus flores nulli ferè apparent, sed aculei albicantes undiquaque in diuersum tanquam in echinis rigent, folia puto scissa, angusta, & albicantia, anno 57. defloruerat omnino Aug.

Elleborus albus, floret Aprili: niger quoque eiusdem principio.

Elleborus albus circa lacum nostrum ultra Albium montem, floret Iulio.

Elleborus albus, itemque niger, flor. Apr. initio.



initio. Mas maior & durior : & fœmina maior, & mollior, ex locis ad Larium habui.

Elleborus Agyrtarum, folijs abrotoni ferè, flor. Apr. & Mart.

Elleborus niger, locis tepidioribus, circa natalem Domini, unde nomen ei apud nos trist wurtz/floret Decemb.

Elleborus niger noster & ex Italia allatus, flor. Febr.

Elleborus niger, Martio.

Eiusdem genus à Trago exhibitum (Anemones species potius) folijs nigellæ, flore ranunculi, magno, luteo, ad solem se conuertente, quo defluente semen etiam vt in ranunculis subnascitur, Aprili mense, &c. flos Mart. fine erumpit.

Elleborus niger noster mas, floret Mar. & fœmina, quam ex Italia habui, non tamen purpureus.

Elzenbaum/floret in fine April.

Elzbbere ad ripam Silæ, acinis nigris, magnitudine piperis, osse duro, singulari intus, &c. fert fructum medio Iulij.

Enneadynamis Polonorum, läberblümle/in fine Iul. flor. & Septemb.

Erica vel Solago, heid/floret Augusto & Septemb.

Eruca vera, floret Iunio, Iulio & Augst.



## DE COLLECTIONE

*Eruca hortensis*, floret Maio.

*Eruca sylvestris*, flor. Iun.

*Eruca sylvestris nostra*, flor. Maio.

*Eruca sylvestris non foetida, tenera*, floret Iulio.

*Eruca sylvestris foetida*, florebat Maio, pallidis, tanquam in spica, flosculis.

*Eruca sylvestris Fuchsi*, quam sinapi album sylvestre interpretatur, flor. Maio. Itē *eruca sylvestris nostra*.

*Eruum sylvestre minus* (nam maius in monte Albio reperi) folijs binis, longiusculis cum capreolo per medium: floribus in corymbo pulchris, luteis, loti genus, quod ab ingluvie columbina denominamus, referentibus, flor. Iul.

*Eruum Fuchsi*, flor. Iul.

*Eryca montana Glarona allata*, floret ut aiunt rupibus adnata, toto anno, (siue reuera, siue quod flores etiam siccati fortè colorem retineant) aliās Feb. & Martio.

*Eryngij* id est cardui cuiusdam odorati species, raddistel/*mansthrüw*/ flor. Maio.

*Eryngium marinum* in horto Argentinensi, ad finem Iul. flor.

*Eryngium alpinū cœruleum*, edler distel/ flor. Aug.

*Erysimon Fuchsi*, quod interpretatur sinapi sylvestre, flor. Iun. Erysi-



Erysimon hortense, eruca nobilis vel  
vel minor, flor. Iun. Iul. & August.

Erysimon, aliquando Maio incipit flor.

Erysimi sylvestris species, vide in Ver-  
bena.

Erysimon hortense, parcè florebat O-  
ctobri.

Esula tria genera, flor. Iul.

Esula, pityusa, flor. Apr.

Esula (pityusa Dioscorid.) sed infre-  
quens, flor. Aug.

Esula dulcis, Congener Militari Plinij,  
florete Aprili.

Esula rotunda, peplos, flor. Iul.

Esula, flor. Maio.

Esulam scabiosam nunquam florere pu-  
to: & fortè seminis loco ei sunt asperitates il-  
læ in folijs supinis, vt filici, polypodio &  
alijs.

Euphrasia, argentrost/ flor. Iul. & Aug.

Eupatorium, Augusto florete sed rarius,  
ferè enim iam defloruit.

Eupatorium Græcorum, agrimonia,  
florete Iulio.

Eupatorium Auicennæ vt aliqui pu-  
tant, quod iuxta aquas nascitur, manifestè  
floribus ferè organi communis, Iulio, &  
Augusto.



## DE COLLECTIONE

Eupatorium Mesue secundum quosdam, costo hortensi cognatum, flor. Aug. Eupatorium aquaticum, manserast.

Eupatorium aquaticum. Vide in Iulio.

## F

Faba, floret Maio & Iunio.

Fagus suis iulis circa diem D. Georgij, in Aprili.

Fagus, fert glandes Septemb.

Fagus sepium apud nos dicta, *hagene büch*/cuius lignum durissimum, fructum Septemb. fert.

Ficus principio & medio Septēbri mihi in horto maturuerunt, licet loco ymbroso plantata.

Ficus, in Italia fructum fert Augusto.

Filipendula, floret Maio: principio Iulij ferè defloruerat.

Filius ante patrem maior & maximus, qui rododaphne cognatus videtur; hīc iam in Augusto ferè defloruit, & canos in filiis hiantibus ostendit.

Filius ante patrem maior & minor; vñnd *Das feur fraut*/ id est maximus, floret Iulio. Species vna mollibus & lanuginosis folijs am *Farzen see*/floret Iunio.

Filij



Filij ante patrem species maior ad aquas,  
floret Iunio.

Filius ante patrem minor, in muris ciui-  
tatis, floret Iunio. Et tertia species syluestris  
maxima, rhododaphne folijs, floret Iunio.

Filius ante patrem maximus, rhododaph-  
ne cognatus fortè, semen fert Augusto.

Filix in nocte, quæ diem D. Ioannis sa-  
crum præcedit, vide Tragum, quo tempore  
semen faciat.

Filices effodiuntur vergiliarum occasu.

Flos Iouis, incipit florere Maij medio: flo-  
ret etiam Iulio.

Flos Iouis purpureus & albus, florent Iu-  
nio Augustoque. *Die himmel blümle*, Sep-  
tembri.

Flos Portugallicus vel Indicus minor, flo-  
ret Iunio & Iulio.

*Flûbirle*/propè Curiam, florebat Decem-  
bri 63. anno, & fructus nasci incipientes ha-  
bebat.

Fœniculum floret Iunio, Iulio, Augusto,  
Septembri & Octobri; semen habet Sep-  
tembri.

Fœnogræcum floret Iulio,

Fragaria floret Aprili & Iulio: semen fert  
Iunio,

Fragaria vere, & tota æstate, floret in-



## DE COLLECTIONE

quam maximam autumnii partem.

Fragaria minor sterilis ad sepes apricas (mas) quaternis folijs florum inter se discretis, principio Martij aut prius floret.

Fragaria sterilis, hirsutior, minor, marem dixeris, Feb. floret.

Fraga in altis montibus, Augusto semen ferunt.

Fraga rubra, alba, principio Iulij habentur.

Fraga in fine Maij florent: quædam in medio, pauca. Fructus fragariæ, æstatis initio, ante cerasa, & aliquandiu cum cerasis inveniuntur, montanis quidem locis, & frigidis, tardius quàm contrarijs. Alba Maio & Iunio florent.

Fraxinella, vide Dictamnus.

Fraxinus aucuparia, floret in fine Maij.

Fraxinus, fructum fert Septemb. supra Tigurum ad 4. milliaria copiosè in montibus: apud nos non fert fructum. Bey Walistate: fructum fert Octob.

Frumentum Turcicum, floret Iulio.

Frumentum Turcicum Fuchsij, quadruplex, granis rufis, purpureis, luteis, subcandidis, florent Augusto.

Fumaria, sed rarissima, floret Febr. aliàs Maio, Iunio, Iulio, aliquando & Nouemb.

Fungo.



Fungorum genus præcipuum, & cibo gratissimum gignitur verno tempore, ab Aprilis mense, usque ad Maii principia, hoc Germani vocant *Mo:chlen* (suillos) pileoli instar, foraminulentum foris, hinc dictum pro uerbium, *Du nimmet zu wie die Mo:chlen im Meyen*,

Fungi vulgares, qui vulgò coqui solent, *Heiderling* dicti, Iunio mense primùm cernuntur, & ab eo tempore ad Augustum usque mensem, pileolis rotundis, & latis similes.

Fungi genus magnum, quod à figura vocant *hasenröße*, cinerei ferè coloris, Augusto mense reperitur in syluis propè radices quercuum.

Fungi etiam esculenti vulgò *Rödling* dicti, frutetis & arbustis cæsis, exustisq;, & terra frequentibus pluuijs humectata nascuntur per syluas, Augusto mense.

## G

*Galiopsis* secundum aliquos, *Braunwurtz*, floret Iulio & Augusto.

*Gallion*, *Gälber augentrost*, floret Iunio & Iulio.

*Genista* maior, floret Maio, aliquando autumno.

*Genista* minor non spinosa, circa Pente-



## DE COLLECTIONE

costen floret, mense Iunio, vt plurimum, inde nomen apud nos, Pfingstblumen/ferbblumen; Flos tinctorius Fuchsj, Iunio & Iulio floret. Spinosa & foliosa citius floret.

Genistella, genista minor spinosa, Maio, sed copiosius Iunio circa Pentecosten, Stenchendpfrimmen.

Genistella aculeata, & altera caule foliato, semen facit Augusto.

Gentiana floret Iunio.

Gentianæ species, madelgâr dicta vulgò, floret in fine Iunij.

Gentianæ species quam cruciatam aliqui vocant, madelgâr, ab incisione radicis cruciformi, floret Iulio.

Gentiana cruciata, à dissecta crucis instar radice, semina minima, subruffa, subrotunda, cum gentiana magna lata habeat semina, profert Aug.

Gentiana minor in alpibus, floribus magnis puniceis, caule cubitali, radice pollicis vel duorum crassitudine, amariore quam gentianæ maioris, wechßt höher vnd wilder/floret Augusto. Item die groß Bitterwurtz in alpibus. Item Gentiana palustris florent Augusti medio & fine.

Gentiana pumilla, flosculo cœruleo instar calathi, in pratis humidis, radiculis albis, rara,



bis, rara, floret Octobri.

Geranium primum, Storchenschnabel, floret Aprili.

Geranij genus secundum, folio maluacio tertium & quartum, quæ vulgò dicuntur Taubensfuß/Rüprechtskraut/Kranetehals Euchsio, floret Maio.

Geranij genus, quod gratiam Dei vocat, floret Iunio. Et eiusdem genus montanum, quod radicem sanguinis appellant.

Geranium maius seu montanum, floret in fine Aprilis.

Geranij, vel fideritidis species, quæ vulgò gratia Dei dicitur, floret Augusto.

Geranij species, apij ferè folijs, floret Decemb. princ.

Geranium montanum, Blutwurz, medio & fine Maij floret.

Gerontopogon vel herba illa quam aliqui Tragopogona vocant, habermarf, luteo flore, & alia species puniceo, ex Italia, Girasole, vel barba de becco, floret Maio.

Geum, benedicta, caryophyllata, floret Augusto. vide Cariophyllata.

Gladiolus seu Xiphium, floret Iunio.

Gladiolus aquaticus, Maio floret.

Glycyrriza, dulcis radix, floret Iulio, & semen fert Septembri.



## DE COLLECTIONE

Gnaphalij genus, sed mollius, *Basenpfö*  
ele, cuius flores non decidunt, candidi ro-  
sei, subpurpurei, floret April.

Gnaphalion, *Rürfraut* / floret Iulio.

*Mattenflachs* / cuius flores non observa-  
ui, & nescio an villos habeat, pappi eius in-  
star lamæ xylinæ dependent, fert fructū Iun.

Graminis genera diuersa, florent Maio.

Gramen Fuchsi, floret Maio.

Graminis genus radice geniculata, denti-  
culata, culmo cubitali, flosculis albis, p. spica  
puto ceu folijs floret Iulio.

Gramen collinum, panicula vel spica flo-  
rum pallida, dodrantali coliculo, *eu* *50* *xia* est  
foliorum, per transuersum, radiculae albæ,  
floret Maio. Vide an Schœnantho cognata  
herba?

Gramen vulnerariū, floret in fine April.

Gramen in arenosis & muris minus ple-  
risq; in genere graminis, radicibus denticu-  
latis (sunt autem dentes initia germinum)  
& articulatis reptat, floret Iun.

Gramen quoddam duriusculum, floribus  
subflauis, Martio.

Graminis vel auenæ syluestris genus, ra-  
dicibus nodosis vt in xiphio, sed pluribus in  
terdum nodis, in fine Iun. fructum vt auena  
ostendit. Radicum sapor puto nitrosus.

Grami-



**Graminis genera varia fructum faciunt  
Iunio.**

**Granum nil, vide conuoluulus.**

**Granum Nil, cuius flores noctu se ape-  
riunt, in meridie pereunt, floret Septemb.**

**Gratiola quam centaurium aquaticū di-  
geris. Hoc fortè est polemonium palustre  
amarum, cuius meminit Hippocrates vete-  
rinarius, in Hippiatricis Græcis ca. 32. inter  
remedia hepatica, equo per nares infundi  
iubens cum vino colatum. Sic autē inquit,  
ἐν οἷνῳ διηθήσας διδύκῃ πολεμώνιον τὸ ἐν ἄλσσι τιμωμένον, κα-  
λαμίνθῃ ἰοικὸς, ποικίλτα ἔχει κίτραν. Hoc est, aut pole-  
monium, quod in paludibus nascitur, & ca-  
lamintham refert, amarū gustu, vino perco-  
latum dato. (Incipit aliquando Maio flore-  
re.) nisi de Hydropipere Ruellij sentiat,  
quod & ipsum pro Eupatorio (Auicennæ)  
à quibusdam accipitur: floret Iul. plerunq;.**

**Gratiola minor, floret in fine Iunij. Sic vo-  
co herbulam fruticosam, etsi subdulcem: se-  
mel tantum mihi visam.**

## H

**Hesentol/floret Iulio.**

**Hedera terrestris vulgò dicta, gundelrâb  
floret Martio, Aprili, & Maio.**



## DE COLLECTIONE

Heliotropium minus, folio ocimi, odore graui, floribus albis in se retortis *in xccidit*. Semen quidam commendat ad quartanas puto, floret Iulio.

Heliotropij genus quoddam, vergiß *min* nit, floret Iulio & Iunio.

Heliotropio congener, aut scorpioidi herba, flore cœruleo, in palustribus nascens vergiß *nit mein*, floret Aprili.

Helxine, parietaria, floret Iulio & Octob.

Helxine in horto meo, floret Aug.

Helxine cissampelos, vide conuoluulus.

Helxine cissampelos, floret Aug.

Helxine semen fert Octob.

Hepatica terrestris, trinitas, circa initium Aprilis ferè defloruit, & post florem folia noua producit, hyemalibus amissis.

Hepatica terrestris vulgò dicta, Italis trinitas, guldin läberfrut vel aurea, floret Martio, hæc per hyemem etiam florum calyces ostendit, & cum primū calor inuitat, aperit.

Hepatica terrestris, semen fert Aprili.

Heptaphyllon, Tormentilla, principio Iunij floret.

Herba Iulia, vel S. Mariæ, vt aliqui vocāt, costo hortensi congener, floret Octob.

Herba Iudaica, floret Iulio. Cognata ei quædam ex loco ymbroso, vß dem hard/ in horto



horto meo, caule quadrangulo, graui odore, floribus purpureis, tanquam vrticæ mortuæ, dilutioribus.

Herba nascens in aruis, similis ferè folijs herbæ Iudaicæ (vide ne sit illa ipsa: videtur sanè) vel tetrahit dictæ, dodrantalis, graui odore, floribus albis vna, altera purpureis, semine nigro, quaterno vt in vrticæ mortuæ speciebus, flores & semina Augusto mense profert.

Herba S. Antonij, Augusto semen fert.

Herba Trinitatis cœrulea sex plerunque folijs florum, alba, id est, albo flore, folijs nouem, vt in meo hortulo apparet: audio etiâ purpuream inueniri, floret Martio.

Herniaria de anno superiore, floret Iul.

Herniaria, floret medio August.

Heydenbysop, floret Iulio.

Hieracium vtrunq, floret Aug.

Hieracij genus in pratis, floret Iunij fine & Iulio, herba pauci succi, folijs molli lanugine, &c. & in muris ciuitatum.

Hieracium pratense asperum, quod & in muris ciuitatis, floret Iulio.

Hieracium syluestre in pratis, herba asperæ lanuginis, caule striato, folijs tres aut quatuor digitos longis, integris ferè ambitu modicè angulosis: horum quæ inferiora versus

L



## DE COLLECTIONE

radicem sunt, initium habent angustius, & in latius abeunt: superiora verò contrà è latioribus contrahuntur. Caulis simplex, flos luteus, floret Aug.

Hieracium minus, vulgò dens leonis, floret Aprili.

Hieracium minus, sed rarius. Item procerum in pratis, floret Maio.

Hieracium minimum, calyculo nigrante, floret Septemb.

Hieracium quoddam radice satis magna, sed folijs quàm in còmuni minoribus, Martio floret.

Hieraciũ alterũ, Ròz lefrant, floret Octob, & semen profert Octob.

Hippofellinum, olusatrum, floret Iul.

Hippuris vtraq;, floret Iulio.

Hippuris lacustris quædam, folijs mansuarenoſis, in fine Iulij floret, vt puto.

Hirci barba, herba dulcis lactaria, habermarcst, alia quàm Tragopogon veterum, floret Iunio.

Hirundinaria, vide Asclepias.

Hordeum Iun. sine fructum fert.

Hordeũ metitur alibi Agu. alibi citius.

Hyacinthi siue bulbi sylvestris, floribus cœruleis genera quatuor, florent Martio.

Hydropiper, persicaria acris, semen fert Aug. Hydro-



Hydropiper, id est, persicaria sine maculis, floret Aug. & subinde semen profert.

Hyoscyamus tota æstate, sed præcipuè Iulio floret.

Hyoscyamus vulgaris, floret medio & fine Maij.

Hyoscyamus communis & Syriacus, floret Iunio.

Hyoscyamus è sylua semine luteo, floret Iul. medio.

Hyoscyamus Syriacus, semen fert Aug.

Hypericon Fuchsj, perforata, floret Iul. (species maior, caule quadrangulo, folijs nõ perforatis.)

Hypericon, vel androsæmon perforata, floret Augusto.

Hypericon minus, floret initio Iunij.

Hypoglossis vel laurus Alexandrina, floret initio Decemb.

Hyssopus, floret Iulio.

Hyssopus alba, floret Iulio.

Hyssopus rara, floret Nouemb.

Hyssopus in horto meo, floret Aug.

I

Iacea, Iunio floret.

D. Iacobi herba, floret Iun.

D. Iacobi flos, floret Iul. & Aug.

Iasminum, medio Iunij incipit florere, & Iulio.

L 2



## DE COLLECTIONE

Iberis, gauchblumen, genus nasturtij syl-  
uestris, floret Maio.

Iberis Matthioli, floret Aug. & Octob.

Ibiscus, floret Iunio, Iulio & Augusto.

Herba ignota, Lepidion vel Iberidi cog-  
nata, puto, flosculis albis, priusquam se ape-  
riant puniceis, folijs serè nasturtij maioris,  
ramulis multis distortis, bipedalis: radice al-  
ba, simplici, intus nervosa, acri, cum superfi-  
cies insignem acrimoniam non habeat, flo-  
ret Septemb. Est autem Iberis Matthioli.

Ignota circa lacum Felium, flosculis cœru-  
leis, vt in hedera terrestri, geminis semper,  
&c. floret Iul.

Herba ignota, quam heliotropium puta-  
bam, folio ocimi, læui, Corchorus vocari po-  
test, floret Iulio.

Innominata quædam fœtida, pinguis, fo-  
lijs vt botrys, floribus senecionis, floret  
Iulio.

Ilex aquifolia, Stedend palmen. Fructu  
Septemb. fert.

Illecebra, vel Telephium sedi genus mini-  
mum, floret Iunio.

Indici flores crocei, Caryophylli Indici  
dicti: minor & maior specie, floret Septerm.  
(Sed maior nunc primum incipit florere:  
minor Iunio) simplices & cōferēti in vtroq;  
genere.

Intubus



Intubus satiuus Iunio & Iulio floret. Cichorium etiam, id est, syluestris intubus eodem tempore incipit florere, in autumnum vsq; durans.

Intubi genus quoddam luteo flore, scabrum, subtenerum, ex amaro subdulce, floret Iunio.

Intubus, vide supra Cichorium.

Inula, floret Iulio, Augusto.

Iouis flos, Dondernägele/himmelröfle, floret Iulio.

Iouis flos, floret Octobri, purpureus & albus.

Iouis flos rarissimus, floret Nouemb.

Irio non foetidus (dentelaria quibusdam) acerrimus, in horto meo fructum ferebat Octobri.

Iris, floret in fine Aprilis, Maij principio & medio.

Iris minor syluestris in horto meo, floret Maio.

Et satiua itidē in horto meo Maio floret, Isatis syluestris, floret Maio.

Iua illa aruensis, fortē arthemisia heptaphyllos: quæ & pro scordio videtur substitui posse, paulò minus efficax amarore, simili flore, toto similiter viscido, floret Iulio.

Iulia Italis dicta, sub finem Iun. incipit flo



## DE COLLECTIONE

rere. An Iulia à mense Iulio dicitur?

Iuniperus Maio mense, cum pluuium fuerit cœlum, luteam è cortice sudat lachrymā, quæ magna in copia tanquam fungi exigui arbori adhærent, nec admodum adorata est.

Iuniperis, Maio mense tenuissimus, ac luteus puluis in auras auolat: quod semen illi esse animaduerti, quanquam & è nucleis lapidosiss, quæ baccis continentur, nouæ iuniperi plantulæ fructificant, Tragus.

Iuniperus cuius baccæ altero demum anno maturescunt, Septemb. fert.

Iuniperus, baccas fert Octob. maturas.

## L

Lactucæ, florent Iulio & Sept.

Lactuca syluestris, qua pro endiuia hætenus vsi sunt Pharmacopolæ, Fuchsius: floret Iulio.

Lactucæ syluestris genus in muris, flosculo cœruleo instar calathi exigui, floret Sep. & eodem semen fert.

Lactucæ syluestris genus quoddam procerum, flosculis exiguis luteis, pappis nullis, floret Iun. Lactuca syluestris Galeni in muris sæpe nascens, rote Bletter, floret Iun.

Lactucæ syluestris genus læuis, floribus lauis, in arca mea, floret Aug. La-



Lactucam syluaticam, quæ cœruleum flo-  
rem apud nos fert, in altis montibus, vidi  
melino flore, mensis Augusti fine florere.

Lactucæ syluestres semen habent No-  
uembri.

Lagopus, aruense trifolium, floret Iunio,  
Iulio.

Lagopus, fâzle flee, floret Aug.

Lampfana, floret Maio.

Lampfana, flore luteo vel Lapsana, (& al-  
bo flore puto rapistrum) floret Iunio.

Lancea Christi, quæ locis riguis prouenit,  
folijs oblongis, dissectis, quadratis caulibus,  
verticillatis, vt in marrubio, flosculis albis,  
cum exiguis parpureis punctis, floret Iulio.  
Sideritin primam facit Matthiolus.

Lantana vulgò Italis dicta frutex, virgis  
lentis, floret Maio & Iun. dictus fortè à len-  
tis ramulis: Fleiner mälbaum.

Lantana frutex rubros potius adhuc aci-  
nos habet, in Iul. qui Aug. demum puto ni-  
grescunt, & Sept.

Lappa maior, vide Personata.

Lapathi genera quatuor, florent Maio.

Lapathi seu rumicis genus, quod vul-  
gò bonum Heinrichum vocamus, Fuchsius  
tertium genus Lapathi facit, floret Sept.

Lapathū, cuius radicis vsus est ad scabiē,  
floret Octob.

L 4



## DE COLLECTIONE

Lapathum hortense magnū, floret April.  
Lapathum aquaticum, hydrolapathum,  
folijs angustis, parum lanuginosis, ad fossas  
aquarum. Hydrodracuntium Aldrouando  
à floris similitudine cum bistorta, floret Iul.

Lapathi genera semen faciunt Iulio.

Lapathum, oxalis, fructum fert Iunio.

Lathyris floret in fine Maij & Iunio.

Lathyris, cataputia minor, floret Augusto.

Lattoris Plinij secundum aliquos, in hor-  
to meo, genus lactucæ sylvestris, floret O-  
ctobri.

Lauendula floret Iunio.

Lauendula Iulio mense ferè defloruit.

Lauendulæ paucæ, florent Septemb.

Laureolæ illud genus, quod vulgò *Sy-  
land* vocant nostri, ante folia floret Feb.

Laureola vulgaris, *Syland* in alpibus se-  
men fert Augusto.

Laureolæ puto species in monte propè  
Curiam, parua, angustis folijs, paulò maio-  
ribus quàm roris marini, flosculis purpu-  
reis, odoratis, ut etiam *Syland*. Cauliculus  
lignosus, sed valde lentus est, non ultra sep-  
tem digitos altus, floret Iunio.

Lens palustris flosculis tripartitis, floret  
Maio.

Lens floret Iunio & Iulio.

Lenti-



Lentibularia, vide Meon aquaticum.

Lepidium Æginetæ, in horto meo flo-  
ret Iulio.

Lepidium folijs lauri, semen profert O-  
ctobri.

Lepidium Æginetæ folijs laurinis ma-  
ioribus, floret Iunio.

Leucoij genera tria, florent Maio.

Leucoia, florent Septemb.

Leucoium, keiri, Martij principio e-  
mergens, statim floris rudimenta ostendit,  
integer apparet ad finem eiusdem.

Leucoium, keiri: & Strasburger nä-  
gely puniceum, & Roseum, odoratius, rari-  
usque: & album, flor. Maio.

Leucoiō bulbosum, weißhornung bli-  
men/violas subolet.

Leucoium bulbosum, Theophrasti, flo-  
ret Mart.

Leucoium, floribus violaceis, in horto  
Didymi, flor. Iul.

Leucoion luteum, & album, floret A-  
prili.

Leucoia medicorum, florent Aug.

Leucoium purpureum, Strasburger  
nägely / flor, Octob.

Leucoium sylvestre floribus luteis, par-  
uis, flor. Iul. Argent.



## DE COLLECTIONE

Leucoia, rara, floret Nouem.

Libanotis, coronaria, rosmarinus, floret  
Septem. & Octob.

Libanotis Italica vel Ferula, floret Iu-  
lio.

Libanotidis species ex Italia, floribus  
luteis in umbellis, &c. flor. medio Iul.

Libanotidis ferulaceæ genus, ex Italia  
missum, his annis, in hortis nostris satum nō  
potuit semen perficere ante frigora, etiam  
Octob. Perfecit postea anno 57. circa medi-  
um Octobrem pauca, eadem planta, quæ  
iam annos durauerat circiter octo, & fortè  
diutius durat, quod seminibus maturandis  
non exhauriatur & radices, validas ac li-  
quore plenas habeat.

Lichen, hepatica, flor. Iun.

Lichen, flosculis stellatis, loco humido,  
Bym rad (non videntur odorati, vt in lapidi-  
bus) flor. Iul.

Ligustraria, qua pro elleboro nigro qui-  
dam vtuntur, flor. in fine Apr.

Ligustrum, incipit florere Maij medio.

Ligustrum, vel (vt aliqui putant) philly-  
rea, Iunio plerunq; floret.

Ligustrum, Brinhülzen / Ferngerten/  
fructum fert Sept. Octob. & Nouemb.

Ligustrum aquaticum, faulbaum / 3ae  
prena



pfenbaum/in medio medicinæ usu, Septem.  
fructum habet.

Lilium Mariæ, quod quidam narcissum  
putant: mihi non videtur, vnser frauwen gil  
gen/ flor. April.

Lilij genus quod pro Asphodelo vsur-  
pant, floret Maij medio & fine.

Lilium rubrum flor. Maio.

Lilium album in fine Iunij: & croceum,  
vel rubrum, medio eiusdem floret.

Lilium aquaticum, vide Acorus fal-  
sus.

Lilium conuallium, cui & nomen a-  
pud nos ab hoc mense, Meyenryß / floret  
Maio, & aliquando April.

Lilium conuallium, fert semen Iulio.

Limonium Fontanoni, in horto Didy-  
mi, flor. Iul.

Limonium nostrum, vide Bistorta.

Limonium, bistorta rara, floret Au-  
gusto.

Linaria, floret circa finem Iunij, aliàs me-  
dio eiusdem: itemq; Iul.

Linaria, quam aliqui veterum osyrim  
putant, flor. Aug.

Lingua herba, Natterzung/ flor. Maio.

Linum, floret Iun. & Iul.

Linum syluestre, flor. Iul.



## DE COLLECTIONE

Lithospermi florum principia Decem.  
se ostendunt locis tepidis.

Lithospermon, vnicaule locis cultis, flo-  
ret Aprili.

Lithospermon minus, aruense, vnicaule  
& multi caule, Maio florent.

Lithospermon, floret Iun. & Iulio.

Lithospermum, milium Solis, semen  
fert Augusto.

Locusta herba, *Nüßle Kraut* / in acetarijs  
grata, floret Iulio & Maio & præterea No-  
uembri.

Lotus urbana *gäl stund Kraut* / id est, Tri-  
folium caballinum, floret Aug.

Lotus urbana, floret Octobri & sylue-  
stris, aliquando, pro sationis diuersitate.

Lotus syluestris, floret in fine Iunij, *das  
gmein stund Kraut mit wyssen Blumen* / Vr-  
bana eiusdem generis, eodemque odore, flo-  
re tantum luteo, & filiquis differt, tardius in  
horto meo, ex Italia nuper missa, floruit Au-  
gusto, Septembri, & Octobri mensibus, Ita-  
li veram melilotum putant.

Lotus syluestris, id est trifolium caballi-  
num, floret Iunio, & semen fert Augusto.

Lotus syluestris, *ziger Kraut* / principio  
Iul. ferè defloruerat.

Lotus inodorus floribus luteis, crispis,  
flor. Iun.

Loti



Loti vel Meleloti quædam species inodora, gâle Dubenfröpfle / primo quo nascitur anno, florem edit Iulio. Itemq; species alia maior, am farzen see.

Lunariæ species folijs oblongis, asperis, albicantibus, crispis plerisque: flosculis ceu in vmbello subflauis, singuli flosculi foliolis constant quaternis, reflexis. Seui initio veris, & Octobris nono primum, in vna stirpe flores apparuerunt: in alijs nulli dum.

Lunaria Græca, toto Aprili floret.

Lunaria montana circa stabula pecorū, Bōni / floret Maio.

Lunaria Græca, quæ filiquas latas producit, vna rotundiores, altera oblongas, Augusto semen fert,

Lunarea lutia Alyssos quorundam, floret Aprili.

Lunaria Fuchsi, Non fraut, alia quam lunaria arthritica, floret Iunio.

Lunaria in horto meo Glüblümen / gâl / audio & albas inueniri circa Vefam. Græca, filiquis argenteis. Alia à Gratorolo missa, filiquis scabris, flosculis luteis, in planta à superiore anno relictâ, florent Maio omnes.

Lunaria Græca tert semen Iulio.

Lupinus floret Maio, & Iunio, & in horto meo Iulio.



## DE COLLECTIONE

Lupus salictarius flor. Aug. & eodem  
mense semen habet.

Lyfimachij genus secundum quosdam,  
quod herba scilicet Antonij vocatur, & fi-  
lius ante patrem. Habet autem cum flore, se-  
men quoq; partim maturum, partim etiam  
elapsum Augusto mense.

Lyfimachium luteum & rubrum radi-  
ce lignosa, weiderich/ flor. Iul.

Lyfimachium flauum, incipit Iunij fine  
florere, paulò post purpureum lyfimachiũ.

Lyfimachij genus, in quo flosculus pur-  
pureus exilibus siliquis extremis enascitur,  
flores & semina profert Aug.

Lyfimachij genus flore rubro: & alte-  
terum luteo, floret Augusto.

## M

Mahaleb ad Vuesam semen facit Iul.

Maiorana, flor. Iul.

Malux tria genera Fuchfio: quorum pri-  
mum vocat hortense, Ern roffen/ nobis di-  
ctum quod messibus floreat, flore magno,  
& patulo rosarum instar, & similiter aut mul-  
tiplici, aut simplici flore, purpureo, vel can-  
dido: hanc Apuleius videtur hastulã regiam  
dicere: (malua maxima,) Sed hanc veteri-  
bus



bus pro hortensi, & sativa in cibis vsitatam fuisse, non est veri simile: quin potius vulgarem maluam: siue punilam siue maiusculam (quam Fuchsius arborescentem vocat. Nos longè aliam dendromalachem id est arborescentem maluam cognoscimus) sativam olim fuisse crediderim. Hortensis (inquit Fuchsius) floret Iulio, & Augusto præcipuè, flos ei diuturnus. Sylvestris minor per totam æstatem & in maximam autumnii partem durat: maior Iunio, & Iulio mensibus in primis floret. Est & aliud malux hortensis genus, paruum, pulcherrimum, quod Tragus depingit, & alceam peregrinam seu Venetam vocat, id quoque Iulio floret: Item aliud flore flauo, folijs integris in acutū desinentibus, sativum.

Malux maxima, hastula regia Apuleij Fuchsi o, Ernrosen / gfült / einfach / weiß / vnd rot / flor Iul.

Malua hortensis maior, cui nomen apud nos à messe, flor. Aug.

Malua magna hortensis ernrosen / flor. in fine Iunij.

Malua vulgaris, flor. Aug.

Malua quædam domestica, item Sic ernrosen / Septemb.

Malua crispa, magna, magnis & crispis



## DE COLLECTIONE

ambitum folijs, floribus paruis, floret Augusto.

Malua crispa in horto meo, Septembr. floret & Octob.

Malua sylvestris, flor. Maio.

Malua sylvestris maior, Iunio & Iulio in primis floret.

Malorum genera initio Maij ferè florent.

Mala diuersorum generum, Augusto & Septembri maturescunt.

Mali vernæ, Theophrastus meminit Iunio fructum facere.

Malus præcox, paradysle batum, fructu Iunio fert, & Iulio.

Mala quædam in primis cotonea, & sylvestria (quæ sint ex malis priora, quæ tardiora) Octob.

Mala insana maturantur Augusto: herba personatæ ferè folijs, & caule.

Malum insanum Fuchsij & aliorum, flore cœruleo, apicibus luteis, flor. Augusto.

Malum insanum, in horto meo 59. Septemb. florebat, nullum ostendebat fructu, neq; Augusto.

Marrubium floret, Iunio, Iulio, & Augusto.

Marrubio similis herba, verticillis suis aculea-



aculeatis, purpureis floribus, folijs mercurialis, &c. Veteres quidam huiusmodi alysson describunt, flor. Aug.

Malua crispa, flor. Iul.

Medica duplex. Satiua<sup>a</sup> flore violaceo, Iunij fine floret: crescit ad duos cubitos, & vix iam sustinet seipsam: tertio anno altius crescit, hominis statura, & citius floret. Altera sylvestris, medio & fine Iunij floret, corymbis flosculorum luteis: sapore eodem & reliqua specie similis: folia vtrisque modicè mucronantur: & versus mucronem margines leuiter exasperantur. Calidæ sunt in secundo gradu, inodoræ. Crescit hæc ad murum & in muro, & albi ad margines aggerum, & fossarum siccos.

Medica sylvestris & hortensis, flor. Iun.

Medica ex Italia floribus violaceis, floret Aug.

Medica cœrulea in fine Maij flor.

Medica, vide inter Trifolia.

Melampyrū vel Myagrus in horto meo, floret Maio.

Melampyrum, vide Myagros.

Melissa Fuchsij, flor. Maio & Iun.

Melilotus albus, flor. Iun.

Melissophyllon flosculis albis, & peregrinum (quod fœtidius & magis cimices

M



## DE COLLECTIONE

refert) cœruleis, floret Augusto.

Mellissophyllum floribus pallidis, flor. Iulio.

Melilotus, lutea & alba, **guldiner Flee**, eius guten geruchs / sunderlich so er dūr is als Theophr. leert. Medica quibusdam cre- dita, vtraque flore coloris violacei, & altera apud nos vulgari (locis saxosis) flaua, meliloto nostro similis inodora, &c. flor. Iul.

Melilotus lutea, & alba, odorata, florent Augusto.

Melilotus inodora folijs ternis à caule remotis, & ad caulem binis, **gäle Dubenfrö** pfe / Lotus puto Fuchsj, flor. Iun.

Melilotus crispa, flore crispo, inodora, semina conuoluta habet cochleatim ferè vix medica, sed minus & minora, floret Iunij initio.

Meliloti inodori species in muro fossa ciuitatis, in fine Maij flores habet in corymbis luteos. Calida est in secundo gradu, subacris, tenuium partium: non reperiō in Tragō. An Medicæ species?

Meliloto similis inodorata, capitulo florum rotundo, flauo, **stein Flee**. Medicæ species aliquibus, flor. Aug.

Meliloti inodori species **stein Flee**, quæ Medica syluestris dici potest, flor. Iun.

Meliloti



Meliloti syluestris species humilis, binis  
 & regione foliolis, cuius lutei flores, suauem  
 quendam & ferè lactis odorem referunt: in  
 prato infra turrim in *Hard* / floret Maio &  
 Iunio. Siliquas curuas & vnguium specie  
 profert Iunio adulto, vel in fine Iunij.

Melilotus agrestis, flor. Iun.

Meliloti loco quidam herba trifolia flo-  
 ribus luteis, sed inodora vtuntur: *stein flec*.  
 Sed est alia quoque saxifraga lutea, quam  
 sic nominant, in Germania inferiore, fo-  
 lijs ferè aquilegiæ, radice lutea, floret Iu-  
 lio.

Melo, vel Melopepon, floret Augu-  
 sto.

Menthæ genera, flor. Aug.

Menta, flor. Iul.

Mentastrum florere incipit initio Iunij,  
 Iul. & Aug.

Meum quorundam, alijs species seselis,  
*Beerwurtz* / flor. Iun.

Meon aquaticum circa lacum felium,  
 folia enim vt Meon *Beerwurtz* exilia & si-  
 militer diuisa habet, ijsque adnatas passim  
 bullas quasdam *panoeides*, floret Iulio  
 dentibularia nominetur (nam Meon alijs a-  
 liud ostendunt) sine radice floribus fla-  
 uis, &c.



## DE COLLECTIONE

Mercurialis, floret Maio, Iulio, Augusto,  
Septemb. Nouemb.

Mercurialis fœmina, flor. Iun.

Mercurialis syluatica mas & fœmina,  
sed ille rarior nobis, Martij medio floret.  
Mercurialis syluatica, teste Trago, se occul-  
tat vel interit Maio vel paulò post.

Mercurialis mas & fœmina semen ferunt  
Augusto.

Mespilus nostra, in fine Aprilis, quando  
que in Maio floret: fructum Octob. profert.

Millefolium vulgò dictum, garben/ al-  
bum & rubens, flor. Iul. & Aug.

Millefolium flore rubro, floret Iunij  
medio.

Millefolium luteis floribus: item pere-  
grinum vel odoratum, flor. Iul.

Millefolium aquaticum quoddam, flo-  
re albo ranunculi, insipidum, &c. floret  
Maio.

Milium, flor. Aug.

Milium Indicum vel Æthiopicum, an-  
no 58. in horto meo flor. Iul.

Nießbeere fructum ferunt ad finem  
Martij, sub niuib. maturescunt, bin fas-  
gen see.

Morsus diaboli, flor. Aug. & Sept.

Morus fructum fert Augusto.

Musca-



Muscattella Cordi (Ophiogloss.) Maio  
interit vel se potius occultat.

Myagrus aliquando, relictus nimirum a  
superiore æstate, Feb. flor.

Myrica floret medio & fine Maij & Iul.

Myrica Iunij initio ferè defloruerat.

Myrrhis, id est cicutaria, vt quidam pu-  
tant, flor. Maio.

Myrrhis cerefolij ferè sapore, dulcior,  
floret anno secundo, medio & fine Apr.

Myrrhidis (sic nominemus vel cicuta-  
riæ, vel Pastinacæ syluestris) species in vijs  
inter vites versus Sollicken. Item Peregri-  
na quædam satiuæ: vna olet folijs cuminum  
Romanum, alia veluti raphanum syluestrè,  
habent radices magnas & validas, flor. Iun.

N

Nardus vulgaris, pseudonardus floret  
Iun. Iul. deflorescit.

Narcissus ille quorundam, & Tragi ve-  
ras, qui mihi potius anemone limonia vi-  
detur, nostri Lilium diuæ Mariæ vocant,  
cuius floris odor suauissimus sed lenis, flo-  
ret Apr. & Maio.

Nasturtium floret Iun. Sept.

Nasturtium pratense, gaudy Blumen/

M 3



## DE COLLECTIONE

floret April. Itemque hortense anni superioris.

Nasturtium palustre, floribus melinis, parum acre, flor. Maio.

Nasturtium aquaticum, floribus flavis, circa lacum, flor. Iul.

Nasturtiolum petræum, herbula omnium minima, flosculis candidis, floret Aprili.

Nigella, flor. Maio.

Nigella flore luteo, flor. Iul.

Nigella coronata calyce, satiua, maior, foliosa. Minor sylvestris puto flore è luteo subuiridi: prior cœruleum florem habet, floret Iunio.

Nigella satiua, flor. Octob.

Nigella, Schabab semen edit Iulio, Augusto.

Noli me tangere, flor. Iulio, & Iunio: locis verò frigidioribus & vmbrosis, medio, & fine August.

Nummularia floret in fine Maij (& genus minus acutius erectum in syluis) floret & Iunio.

Numularia Fuchsi, Vide Centimorbia.

Nux Iuglans, iulis verè floret: Augusto & Septembri maturescit fructus & excutitur.

Nux



Nux vesicaria, pimpernüggle, floret Ma-  
io: maturefcit Septemb.

Nux Methel, Vide strammonia.

Nymphæa utrâq; apud nos Maio, Iunio  
que floret.

Nymphæa lutea floret Iulij principio  
in lacu nostro.

## O

Ocimū basilicū fl. Iun. & Aug. Basilien.

Ocimi duo genera, Flein vnd groß Ba-  
lien/florent Iulio.

Ocimum, basilicum medium, album &  
purpureum, & ocimum citratum, odore me-  
lissæ in horto meo, flor. Aug.

Ocimi folijs herba circa sæpes nascens,  
flosculis albis, post quos verrucæ relinquū-  
tur, flor. Aug. Heliotropij genus aliquando  
putabam.

Ocimum Tragi, heidenkorn: quod ali-  
qui crysimon Theophrasti putant, flor. Iun.

Ocimoides, flor. Sep.

Ocimoides album duplex, rubrum du-  
plex, & flauum, quod semel tantum vidi Lin-  
dauiz in horto Matthiz Kurtz mercatoris,  
floret Iulio.

Ocimoides rubrum, quod floret in Iu-  
nio, in hortis consitum.

Ocimoides rubrum, rarum inuentu:

M 4



## EE COLLECTIONE

& facilius in montibus quam alibi, floret Aug.  
gusto

Ocimoides rubrum alpinum, Maij medio floret: & mox etiam album, quod tamen aliàs Iunio primum floret. Huius flores in sole flacescunt, vesperi & nocte redintegrantur: rubri semper integri manent, minusq; odorati sunt. Videtur & Ocimoides quoddam album minus odoratum esse in horto meo.

Ocimoides albo flore, calyce purpurascente vel viridi: vnum, medio apicem exerit: minus odoratum: alterum non, odoratius, quod eodem die marcescit: eadem differentia est in purpureis, floret Iunij fine.

Ocimoides albis floribus odoratis, quod aliqui non rectè ben album vocant, vt alij polemonium, Lidweich mit linden/ haraschen Bletteren/ gstatet wie die großen Basilien/ vt ego interpretor, flor. Aug.

Ocimoides purpureum floret in fine Apr. & Octob.

Ocimoides purpureum dilutum albo cognatius odoratiusque alpino, etiam die se claudit: at album alpinum non clauditur, flor. Maio.

Ocimoides croceo flore, floret Iunij medio. Vocari verò sic potest propter floris



ris speciem, omnino inodorum tamen.

Ocimoides peregrinum maius perenne:  
& minus, quod eodem anno floret, floret  
Augusto.

Ocimoides peregrinum minus, floret Se-  
ptembri.

Ocimoidis species peregrina minor, Au-  
gust. semen profert.

Ocimoides iam rarum, circa finem No-  
uemb. mensis floret.

Oenante herba filipendula, floret Iunio.

Oleæ plantula, in calidioribus locis Ger-  
maniae, vt circa Rhenum, floret circa S. Ioan-  
nis diem, in Iunio.

Olusatrum in horto nostro floret Maio  
anno secundo puto à satione.

Ononis floret in fine Iunij & Iulio.

Ophrys Fuchsi, quæ alismatis species vi-  
detur, Maio & Iunio mensibus floret, dein-  
de euanescit circa festum D. Ioannis Ba-  
ptistæ.

Orchis, vide Satyrium.

Orchis, genus bifolium ante caulem, cum  
& bulbum vnicum ostendit, postea caulis ac-  
cedit, flores è viridi pallidi, & foliola alia in  
caule, floret Maio.

Orchis genus illud rarius & elegãs, quod  
in flores habeat albicantes, minutos &



## DE COLLECTIONE

punctis rubicundis asperfos, capitulum ostendit puniceum, quod floribus nondum apertis constat, floret in Maio.

Orchis gen<sup>9</sup> illud quod *Tüfels angficht* vocant, flore albo, item flore purpureo, vel communi, floret Iunio. In genere testiculorum, odoratiores sunt, quibus flosculi minores.

Orchis, id est, testiculi herbæ genera quædam: ex quibus id quod Serapiadem vel triorchin aliqui esse putant, in fine Maij, & initio Iunij apparet, deinde nusquam inveniri potest.

Oreoselinum aliud circa Basileam, floret Iulij principio.

Oreoselinum von Baden, floret Iul. & alię species duę oreoselini.

Origanum vulgare, floret Iunij fine, Iulio & Augusto.

Orminum hortense & pratense *scharlach*, floret Iulio: ferè enim tardius floret satiuo. Sed Fuchsius orminum vtrunq; Iunio mense floribus & semine prægnans esse scribit.

Orminum hortense, id est, Gallitricum, vt recentiores multi putant, *Scharlach*/vel potius *alectorolophos*, id est, gallicrista, à folijs cristæ gallinacæ instar ferratis, vnde & gallitrici vox corrupta videtur, floret Iunij



Iunij principio & medio.

Orminum syluestre, floribus purpureis,  
nunquam prius mihi visum, floret 8. Iu-  
nij.

Orminum syluestre, vel schlarea sylue-  
stris, flore albo: & commune cœruleo, floret  
Maio.

Orminum syluestre, quod & cœruleum  
& album inuenitur, floret Iunio.

Orminum vel gallitricum syluestre, flore  
cœruleo, semen fert Iulio.

Ornithogalum, floret April.

Ornus, grosser mälboum/wielâsch, vt e-  
go interpretor, floret Iunio.

Ornus aucuparia, wielâschen. Aug. fru-  
ctum fert, & Sept.

Orobanche nostra, quam nonum satyrij  
genus Tragus facit, floret Maio.

Orobanche Ruellij, floret Aug.

Oxalis, floret Maio.

Oxyacantha, Berberis, Erbßlen. Sed ali-  
qui spinam albam vulgò dictam oxyacan-  
tham potius esse asserunt, quibus assentior:  
vtraq; floret Maio, fructum facit Aug. Sept.  
& Octob. Augusto autem collibus & locis  
calidioribus.

Oxylapathum vulgare, floret Aug.

Oxys, alleluia, floret April. & Maio.



## DE COLLECTIONE

### P

Panaces Chironium, herba Doria, ni fallor, quorundam, nonnulli Limonium Matthioli vocabant, quod tamen non probo: in horto meo floruit Iunio, aliàs Iulio, primo gradu amara.

Panicum, floret Iunio.

Papauer satium, floret Iunio, & Iulio.

Papauer cornutum, floret Iunio, Iulio & in fine Maij. Semina fert Nouembri.

Papauer erraticum, floret in fine Maij, Iunio, Iulio et Augusto: semen fert Septembri.

Paris herba, quam aliqui non rectè aconitum pardalianches faciunt, floret Maio.

Parthenium, matricaria, floret Maio, Iunij medio vel principio potius, & quandoq; Iulio.

Pastinacæ genera tria, radicum colore distincta, florent Iulio.

Pastinaca maior, Pastaney, semen fert Augusto.

Pastinaca erratica purpureo apice in medio umbellæ candidæ, vogelnâst, floret Iunio & Augusto: semen profert Septembri et Octobri.

Pastinacæ genus erraticum umbellis luteis, elaphoboscus quorundâ, floret Iunio.

Pastinaca sylvestris, umbellis luteis, Brentraut/



**Frant**, diuersa à Dauco syluestri, quem Dioscorides Pastinacam syluestrem vocat; floret Iunio & Iulio.

**Pecten** veneris, floret Maio, in aruis, qui post flores albos relinquit siliquas tanquam acus: & Iulio.

**Pelecinus** floret Octob. **Securidaca**.

**Pelecinus** syluestris, herba & frutex in colle propè Scaphusiam, floret Maio.

**Pentaphylli**, id est, quinq; folij, tria genera, florent Maio.

**Pentaphyllum**, floret Iulio.

**Pentaphyllum minus**, quod locis apricis & siccis nascitur, præcipuè collibus, floret Mart. aliàs Septemb.

**Pentaphyllum petræum**, in saxis iuxta aditum fodinæ Ferrariæ in monte supra Sergans: sed plantæ erant paucissimæ, floret Augusto.

**Pentaphyllum erectum**, magnam, candidum subdus, trib<sup>9</sup> aut amplius à radice caulibus, floret Iunij initio

**Peplus**, esula rotunda, floret Iulio

**Peplus**, floret Maio.

**Perfoliata**, **Surchwachs**, floret Iunio.

**Perfoliata** alia, quam aliqui ineptè centaurium maius vocant floret in fine Iunij in colle vbi calamentum gegē ser sylb: ugg.



## DE COLLECTIONE

Flores in corymbis sunt lutei, folijs octenis conditi, subamari, bono sed leui odore. Item in colle ob der Spitaaler wysen.

Perfoliata rubra, Iunio floret.

Perforata, vide Androsæmon.

Periclymenon, caprifolium, incipit flores Maij medio & fine, Iunio & Iulio: item- que Augusto, semen Septembri producit.

Periclymenon, Speck gilgen, principio Septembris floret. Bis floret in anno eadem ætate, sed fructum post secundum florem non potest perficere.

Periclymenus minor, gemellis acinis, rubentibus viscosis, Iulio fert acinos.

Perficus cuiuscunq; generis (trium generum) floret April.

Perficus Armeniaca, Berillele, floribus albis, odoratis, floret Mart.

Perficus, fructum Sept. profert.

Parfica duracina, carne rubenti, matura sunt Octob.

Perficaria maculata, quam aliqui molybdænam vocant, flore purpureo & albo, floret Iulio, & Iunio.

Perficaria, vide hydropiper.

Personata lappa maior, floret Iulio & Septembri.

Personata



Personata, Lappa maior, cuius seminis  
ad calculum vsus laudatur, semen fert O-  
ctobri.

Pes anserinus Tragi, & Fuchsj, Sewtod.  
nimirum Chenopus Plinij, floret Iulio.

Pes leonis, Sinnam, floret Iuni o.

Petasites, pestilentz wurz, floret Martio,  
Aprili, & quandoq; Feb.

Petroselinum Fuchsj, si in hortis sera-  
tur: putat autem id esse quod officinae vul-  
gò amomum vocant: nesciens fortè Galenū  
scripsisse petroselinum, verum & Macedo-  
nicum propriè dictum, adeo amarum esse,  
vt amarore suo totam Theriacam inficiat,  
quod amomo vulgò dicto non conuenit, id  
ego igitur potius ammi verum, aut cumi-  
num Æthiopicū esse suspicor. Pro vero au-  
tem petroselino astrantia nostra, vti consu-  
lo, donec verum adferatur. Iam enim ex Ma-  
cedonia & Cōstantinopoli nuperrimè quos-  
dam detulisse audio.

Peucedanum Fuchsj, floret Aug.

Peucedanum in horto meo, caule dod-  
rantali, folijs crassiusculis per terram spar-  
sis, vmbellis albis, floret Maio.

Phalangitis, grassgilgen, asphodeli foemi-  
na quibusdam: Et eiusdē species maior mon-  
tana, odore & sapore in flore radiceq; lilij  
albi, floret Iul.



## DE COLLECTIONE

Phalangium vel phalangites Kentmanni, in fine Iunij floret, *Die wilden gras gilgely.*

Phalaris folijs arundinis, flore gramineo, pallido, spica elegante & conferta, latiuscula. Olingerus Norinberga misit, floret Iulio.

Phillyrea nostra, ferngerten/ floret Maio.

Phoenix, roten wilden haber. Iunio floret.

Phu tota æstate floret. Fuchsius, qui Phu in maius, hortense, & minus, vulgare distinguit. Est & saxatile quoddam montanum, & palustre minimum, quod Aprili floret.

Phu hortense (& sylvestre in horto meo) circa finem & medium Maij floret & semen fert Iulio.

Phu (maius) Dioscoridis, floret Iunio.

Phu saxatile, & phu parvum saxatile, quod in vmbrosis & humidis montium saxis crescit, floret Aprili.

Phu minimum sylvestre, geniculatis radiculis, floret Aprili.

Philosella maior & minor. Maio & Iunio florent.

Pimpinella, floret Aprili, Maio & Iunio: Maior in pratis humidis Iulio: semen facit Iunio & Iulio.

Pimpinella, quæ & sanguisorba, Maio & Iunio floret.

Pirus plerumque cum ceraso, floret Aprili.

Pirorum



Pirorum genera diuerſa matureſcunt Auguſt. & Sept.

Pira quæ à fœno denominamus *heuwbyren*, quod hæc ſola immatura etiam fœno obruta & calore emollita, edantur, Iulio matureſcunt.

Pira præcocia, & ſuperba, *Muſcat byrle*, Iulio matureſcunt.

Pira quæ noſtris *heerenbyren*, matureſcunt Aug. medio.

Pira quæ *ſchûrbyren* à nobis, matureſcunt in fine Aug. & Sept.

Pira quæ noſtris *Grauw eugſtler* dicuntur, à calore nomen habent, boni ſaporis, & ſucco mediocri prædita, id eſt, non ſicca aut friabilia, matureſcunt medio Auguſt. & poſt.

Pira quædam, præſertim ſtragulanea & ſylueſtria, matura ſunt Octob.

Pirola vulgò dicta, *wintergrûn*, quam quidam limonium putant, floret Iunij principio: ego biſtortam pro limonio ſemper habui, nec dum muto ſententiam.

Piſum, floret Iunio.

Plantagines florent Maio & Aug. Iulio item, quo & ſemen edit, itemq; Auguſt. Nouemb. & Sept.

Plantago maior vel media potius, floret Iun.

N



## DE COLLECTIONE

Plantago minor, floret Iul.

Plantago aquatica, quam aliqui alisma v-  
terum esse putant, floret Iunio.

Plantago aquatica semen fert Iul.

Pœonia, floret Maij principio & medio.

• Pœonia, floret circa finem April. Mas in  
principio in horto meo, alias in fine, loco  
umbroso & hyeme longiore.

Polemonium, floret Maio & Iulio, præsen-  
tim eius principio.

Polemonium Dioscoridis, floret Iul.

Polemonium petræū, floret Iulio: & hoc  
& Dioscoridis dictum, suavius olent vespe-  
ri: in meridie flos ferè euanuit, vt hesperides  
dici mereantur, vtriq; ferè idem odor, sua-  
vis, non plenus.

Polemonium: quod duplex esse puto, v-  
num maius & longioribus folijs, nisi natali-  
tij soli differentia est, floret Iun.

Polemoniū, Widerstoss, vt ego interpre-  
tor quod aliqui ben albū nō rectè vocitant,  
vt aliqui ocimoides album, in quo genere &  
tiam rubrum habetur. Polemonium verò  
album tantum, floret Aug.

Polemonium Fontanoni in horto meo,  
floret Iunij principio.

Polemonium viscosum vel saxatile, flo-  
ret Iunio.

Polemo-



Polemonium palustre, vide Gratiola.

Polemonium petraeum, floret Maio, semen fert Iunio.

Polium nostrum Maij fine & Iunij principio floret.

Polycnemon, langer doft, floret Aug.

Polycnemon, origano simile, floret Iulio & Septemb.

Polycnemon origano vulgari simile, sed raram, Lunariæ speciem refert, folijs oblongis, asperis, albicantibus, crispis plerisque: flosculis ceu in umbella subflavis, singuli flosculi foliolis quaternis constant. Scui initio veris, & Octobris nono primum flores apparuerunt, in alijs verò nulli dum.

Polycnemon origano simile, quod & Clinopodion fortè appellari posset à figura: nam verticillum florum, aut seminum in summo caule impositum habet, veluti capitulum, vna hæc herba, quod sciam, semen Octob. facit.

Polycnemon vel Clinopodion maius semina gerit rotunda & subruffa, Nouembri.

Polygonatum, Weyßwurtz vtrumque, initio Maij floret, vel medio: alterum tamen prius sæpe Aprili.

Polygonatum erectum, semen fert Aug.



## DE COLLECTIONE

Polygonon, wāgtritt, floret Aug.

Polypodij radix colligenda est in fine Augusti.

Polytrichum Apuleij, vt quidam vocant, guldinwiderthon, floret Iun.

Populus suis iulis, floret Mar.

Populi nigre gemme turgentes colliguntur mense April.

Populi nigre gemme, mensis Sep. 19. turgere succo suo flauo vidi: & fortè is hoc tempore vtpote sicciore melior est, & minus aqueus quàm vere.

Porrum, floret Maio & Aug.

Porrum sectiuum syluestre in rupibus ripæ Rheni zū Clausenberg, floret Iun.

Portulaca, Iunio & Iulio floret.

Potamogeton, Samfraut, floret Iul.

Prunella vulgò dicta, floret Maio, Iunio, Iulio, August. Septemb. Octob. & Decemb. mensibus.

Prunus plerunque cum ceraso, floret April.

Pruni genera quædam urbana, inter quæ tardissima sunt minima, cerea ferè per maturitatem. Zipparten, maturescunt Septe. & Octob. Alia verò cerea magna sunt, quæ Augusto, si benè memini maturantur.

Pruni genus, maturescit fructibus circa finem



finem Iulij, cui fructus parui cœrulei dulciores, **Blauw friechen.**

Pruna cerea vel cereola, magna subdulcia, minima subcœrulea, acida, parum humida, **Wyn friechen**, maturescunt Aug.

Pruna nostra maturescunt Augusto.

Cœrulea, **Blauw friechen.**

**Haber friechē** fleiner dan die anderen.

**Wey n̄ friechen**/fleine sure, subcœrulea vt & **Haber friechen.**

**Wyß friechen**/tardi⁹ aliquando matura gar vnd gar wyß.

**Bockshödle** halb wyß / halb rotlecht/alium puto magis soluunt:& hæc aliqui alba vocant, sed minus propriè.

Prunus syluestris, in fine Martij floret perunq;, & April. principio.

Prunus syluestris, spinus, **Schleehensbaum**, Sept. & Octob. maturus est fructus.

Pseudamonium, floret April.

Pseudochamædrys, **Schaaffkraut der wild**, caule puto simplici & longiore, floret Iunio.

Pseudochamædrys, **gamanderle**, floret Maio.

Pseudocyperus corymbis foetidis, semen fert Iulio.

Pseudomelanthium, **Katten**, floret Iun. semen fert August.

N. 3



## DE COLLECTIONE

Pseudonardus, vide Nardus vulgaris.

Pseudorhaponticum, folijs oblongis, florere puto mense Iunio circa finem.

Psyllium, Iulio & Aug. floret.

Parmice, floret Iunio & Augusto, quam Ruellium quidam sequuti pyrethrum palustre esse putant. Ego verò aliam noui ptarmicem montanam, folijs ferè plantaginis, flore aureo, radiculis ruffis, non sine odore, acribus, *Gälbe mütter wurtzen*.

Pulegium saxatile (regale puto quibusdā) polycnemon fortè, floret Iulio.

Pulegium ceruinum, floret Iulij fine Monspelij.

Pulmonaria Plinij, floret Mart. & April.

Pulmonariæ Plinij species, sine maculis foliorum, *Heine walwurtz*, floret April. Vide Symphytum.

Pulmonaria Gallis vulgò dicta, floret Maij fine, semen fert in Iulio.

Pulmonaria muralis, *Büchspick*, species syluestris Lactucæ, fortè reseda Plinij: nam similis eius vsus est hodie apud nos ad collectiones aut inflammationes sedandas, præsertim Paronychias, in quarum remedijs multi etiam incantationes adhibent, magis quàm ad vllas alias inflammationes, &c. floret Augusto.

Pyre-



Pyrethrum, in Aprili floret.

Pyretrum alpinum chamæmalo simile,  
(perenne) radicibus repens, floret Iulio in  
alpibus nostris.

Q.

Quercus circa diem D. Georgij flores seu  
cachryes suas emittit.

Quercus quædam fructificant, circa diem  
D. Bartholomæi, aliæ tardius.

Quercus quædam glandes ferunt, quæ-  
dam etiam pilulas fungosas : in quibus ver-  
miculi conduntur : aliquando squamu-  
las rotundas, candidas, in sinistro foliorum  
latere, quas rustici flosculos vocant, indiciū  
copiosi prouentus glandium anno sequen-  
te: glandes Septemb. producit.

Quinquefolium, floret Iunio.

Quinquefolium minus in locis siccis, ra-  
dicibus suis repit, floret Aprili & Maio.

Quinquefolium palustre floribus puni-  
ceis, radicibus repens oblongis, floret me-  
dio Maij.

R

Ranunculi genera hortēsia & syluestria, far-  
doniū, aruenſe, echinatis seminib. Aquaticū  
flore plantaginis : & alterum minimū folijs

N 4



## DE COLLECTIONE

minimis, multifidis, vt in cottula. Item flammeus. Item maior albus nō hortensis, tantū puto apud nos: florent Maio.

Ranunculi species diuersæ, & quæ apium risus vocatur, florent Iunio.

Ranunculi genus primum, Martio floret & initio Aprilis, deinde disperit.

Ranunculi genus quartū Fuchfio, quod vulgò vocamus Martios flores, qui albi & purpurei sunt: & secundū Fuchfium etiā lutei, apparent Martio & Aprili.

Ranunculus sardonius, quem apium risus vocant, & alius quem aliqui flammulam, floret Aprili.

Ranunculus sardonius semen fert Maio.

Ranunculus hortensis, albus flore denso, florem ostendere incipit in fine Aprilis.

Ranunculi quidam (hortensis, flauus, dēsus) florent Iulio.

Ranunculi pratenses pauci, florent Oct. vt & hortensis, flore denso, paucus.

Ranunculus pratensis sine plumbo: cæteri enim præter aquaticos, pleriq; plumbum id est, maculas nigras habent, Causticus: florent Aprili.

Ranunculus pratensis, floret Septembri.

Ranunculus pratensis, hirsutus, floret Augusto.

Ranuncu-



Ranunculus albus in fummo Braulio,  
monte Rhetorum, folijs simplicibus oblon-  
gis, angustis, &c. flor. Iul.

Ranunculus syluestris, albus, fidertsche/  
medio April. flor.

Ranunculus alpinus petreus, albus, ex  
monte Pilati mihi translatus, flor. Apr.

Ranunculus palustris, quem Dodonæ-  
us ouibus exitialem esse scribit, flor. Iun.

Ranunculus palustris am Farzen see/ flo-  
ret Iulio.

Ranunculus chamæmeli folijs, rara her-  
ba & caustica, locis palustribus, flor. Apr.

Ranunculus, rarus, flor. Nouem.

Ranunculus hannen süß/plumbum ha-  
bet: interea serpit, in olera recipitur, flores  
habet maiores, iuxta semitas crescit, Maio  
floret.

Ranunculus humilis, radice crassa digi-  
tali, causticus, rarus, flor. Apr.

Ranunculus parvus calyce inuerso, flo-  
ret Maio.

Ranunculo cognata herba, quæ in ole-  
ra admittitur, flor. Aug.

Raphanus æstate, floret Iul. & Octob.

Raphanus maior, flor. Maio.

Raphanus syluestris rapistrum, filiquis  
acumatis, acribus, flore albo, flor. Maio.



## DE COLLECTIONE

Rapistrum flore albo, vel sinapi agre-  
ste, flor. Iun.

Rapistrum flauis floribus, heiderich/ flo-  
ret Iul. August. & Octob.

Rapum, flor. Iun.

Rapum syluestre, flore

Calathi, cœruleo (Vuularias etiam vo-  
cant.

1 Maius, quod medium putant, &  
albo etiam flore inuenitur.

2 Minus, quod suis radicib. serpit.

3 Die rächten rapünzle/ in quibus  
cœruleus color dilutior est.

4 Petræum, in muris.

5 Partense, flore in corymbos col-  
lecto.

6 Vnguium instar recuruatis in sum-  
mo floribus, in collibus & montib.

7 In spica quadam, in syluis, tolia ma-  
culosa.

8 Non Maculoso.

Rapum syluestre, rapünzle/ floret Iun.  
Iulio. Itemq; minus.

Rapi sylvestris species parua in muris,  
campanulis cœruleis: primum & fermè vio-  
læ folijs minoribus, flor. Iul.

Rapi sylvestris genus pratense, puniceo  
flore in corymbis, confereto, & syluaticum  
in mon-



In montibus cæruleo, floret Maio.

Rapum sylvestre petræū, augen fraut/  
fleckenfraut, flor. Aug. Vide Vuularia.

Rapum sylvestre, Rapünzle/ duorum  
generum, commune quod procerissimum  
est: minus cui corymbi sunt in summo: me-  
dium folijs latiusculis, non longis vt primū,  
(sunt & sylvestria quædam genera.) Item  
minimum petræum in muris ciuitatis, flo-  
rent Iunij fine.

Rapunculi sylvestris genus floribus cæ-  
ruleis in se recuruis: Item die rächten Ra-  
pünzle/ flor. Maio.

Rhamni genus Sandthorn/fronthorn/  
fructum fert Septem.

Rhaponticum spurium, flor. Iun.

Rhaponticum ignobile, collinū vel pra-  
tense folijs angustis, valde dissectis, flo. Aug.

Rhapontici genus degener, flore rubro,  
calyce squaroso, flor. Septem.

Raponticum minus & degener, calyce  
infra florem, protuberante squamis alter-  
nis viridibus & fuscis corticato, flor. Iul. Vi-  
de Centaurium.

Rhododaphne vera, in horto Massarij,  
flor. Iul. medio.

Rhododaphne, pumila. vel filius ante  
patrem maximus, flor. Iul.



## DE COLLECTIONE

Rododaphne minor vel herbacea **feura**  
**frant** / floret in fine Iunij aliàs in principio.

Ribes vulgò dictum, floret Martio, April,  
li, Maio.

Ribes frutex vulgaris, cuius fructus, à  
tempore, acinos D. Ioannis vocamus, Iunio  
producitur.

Ribes syluestre, aquaticum, sabinæ ferè  
odore, flor. Apr.

Rosa Maij sine spina, floret April. me-  
dio & fine.

Rosæ minoris fruticis, quæ à Maio d-  
nominantur, *Weyen rōse*: circa Maij medi-  
um florent in monte Alpjo propè Tigu-  
rum copiosè proueniunt: inde in hortos  
transferuntur.

Rosa vna & altera etiam Augusto, in ro-  
seto meo nascebatur.

Rosæ, primum albæ, deinde purpureæ  
vel incarnatæ, tertio rubræ, florent Iun.

Rosæ albæ & incarnatæ dictæ: & cynor-  
hodon, flor. Maio.

Rosæ semina Septembri maturescunt &  
Nouemb.

Ros solis, die 20. Iulij iam ferè deflo-  
ruerat.

Rosmarinus, flor. Maio.

Rubia satiuā in horto meo, floret Iu-  
lij fi-



lij, fine, minima squinantia.

Rubię genus prauum, asperula puto, folijs per genicula inferius quaternis, superius binis, floribus albis, specie vt in Phu, floret Iun. & Iulio.

Rubia syluestris, flor. Iun. & Aug.

Rubia alia parua syluatica flosculis paucis violæ dilutæ colore, flor. Iul.

Rubea syluestris, waldmeyster / floret Augusto.

Rubea minor syluestris, flor. Maio.

Rubiæ syluestris species hepatica, hertz froyd / flor. medio & fine Maij, & Iun,

Rubea syluestris, floret Augusto, Sonchi genus vt videtur, floribus luteis, pastillicantibus, barbatis multis, calyce foliosa (vt & lactuæ syluestris genus quod in area creuit, & aster Fuchsi) folijs molliter aculeatis, flor. Augusto.

Rubia palustris parua, flor. Iul.

Rubus humilis, chamæbatus, floret Maio & Augusto.

Rubus maior, & minor siue chamæbatus sua mora maturant Aug.

Rubus maior Augusto, & Septembri fructus fert.

Rubus maior, & florem adhuc, & fructum Augusto mensē producit.



## DE COLLECTIONE

Rubus Idæus, hindbeere/ Maio & Iulio  
flore.

Rubus idæus in montibus semen fert  
Augusto. Et quidam in monte Pilati sine vl-  
lis spiciis.

Ruscus in horto meo semel perpaucis  
flosculis Martio floruit, anno 1562. & rursus  
63. pluribus.

Ruscus flore medio & principio Apr.  
in horto, medijs è folijs flosculi radiati cum  
orbiculo puniceo in medio.

Ruscus florū rudimenta viridia, sed clau-  
sa Decemb. ostendit.

Ruta flore Iunio, Iulio, & Augusto: se-  
men fert Octob.

Ruta capraria, flore Maio: semen fert  
Augusto.

Ruta, rara, flor. Nouemb.

Ruta pratensis, cui flos capillaris, vt viti  
syluestri causticæ, flor. Maio.

Ruta pratensis circa finem Aprilis

## S

Sabina, flor. Apr.

Sabina fœmina rudimenta quædam ger-  
minum exiguorum ceu flosculos subluteos  
in summis ramulis in Martio & Aprili o-  
stendit.

Sabina



Sabina medio & fine Maij floret exiguis flosculis quadripartitis.

Sabina baccas profert Septembri, & Octobri.

Sabina flosculis exilibus, quadrangulis, albicantibus, flor. Iunij principio.

Salices incipiunt florere Martio, & Aprili mense, sed ante cæteras sylvestris latifolia.

Saliunca in horto meo è montibus Vallesæ allata mensis Septemb. 7. flosculos ostendere incipit.

Salvia, flor. Iul.

Salvia nobilis, floret Iunio: communis etiam incipit florere medio Iunij, Iulio.

Sambucus Maij medio floret & circa finem eius, Iunio etiam: baccas fert Sept.

Sambucus montana vel rubra, floret Aprili.

Sambucus montana, Buchholzer/ acinis rubris, non in umbella, sed ~~horpus~~ fert, in Iul. & Aug. maturescunt.

Sambucus aquatica Tragi, schwelcken/ in fine Maij floret, & eadem floribus densis hortensi cultu.

Sambucus aquatica flore denso sterilis: item in sepibus nascens, flor. Apr.

Sambucus aquatica Tragi: fructum Septembri facit.



## DE COLLECTIONE

Sampfucus, maiorana, flor. Iul.

Sanicula vulgò dicta, floret Maio & Iun.

Sanicula alpina, flor. Apr. & Iul.

Sanicula alpina, guttata, id est guttis sanguineis in flosculis albis, flor. Maio.

Saponaria vulgò dicta, quam Struthium aliqui malè nominant, floret in fine Iulij, Iul. & Aug.

Satureia, flor. Iul. semen fert Octob.

Satureia sed rara, flores simul & semina matura habet Octob.

Satyrium basilicum, quod palmā Christi vocant, (vti etiam Ricinum) mas, sine maculis foliorum floret Maio & Iunio.

Satyrium basilicum fœmina, maculosa folijs, Maio flor.

Satyrium basilicum alpinum flor. principio Iulij: Rüstölble an à colore fuliginoso: sicut & Brendle & Styracem olet calamitham.

Satyrium basilicum alpinum, Brendle à colore, Rüstölble, ab odore suauis puto, quo etiam rosas vincit. Rölble verò à figura flores in capitulum quasi clauæ coacti, floret Augusto.

Satyrii genus exiguum, in apricis montibus, flor. Iun.

Satyrii genus quoddam exiguum, autumno



rumno appetente, floret in vliginosis cam-  
pis, & pratis, Septembri nempe.

Satyrion trifolium Fuchsj, quod poti-  
us orchis species fuerit, floret Iunio.

Satyrionis genus quadrifolium, folijs an-  
gustis, floribus purpureis, paucis, odoratū,  
lactis quodam odore, vt genus quoddam  
meliloti, flor. Iun.

Satyrion Erythraicum Augustæ in hor-  
to Herwarti/ flor. Apr.

Saxifraga Fuchsj, floret Iunio, Maur-  
rauten, vere, & æstate inuenitur, potissimū  
autem Iunio, hanc ego adiantum nigrum di-  
xerim, sed ea nunquam floret.

Saxifraga maior seu alba, cui radix mul-  
tis granis orbiculatis compacta est, flor. Ma-  
io: Deinde statim euanescit.

Saxifraga alba in fine Iun. flor.

Saxifraga granata flor. albis, flor. Ap. Se-  
men verò habet in fine Augusti, & Septem.

Saxifraga pinpinellæ similis, vel hircina  
minor & maior. Item maior alpina, purpu-  
rea umbella in Pilati monte, flor. Iunio, Aug.  
& Nouemb.

Saxifraga hircina pimpinellæ similis,  
maior & minor: & maior montana, floret in  
horto meo in Iul.

Saxifraga montana, radice alba, nodosa,

O



## DE COLLECTIONE

quam nulli alteri compares nisi saniculæ albæ Hefſorum, aut ægoletthri radicibus initio: duplex eſt: alia folijs quinis, alia ſeptenis, in vno coliculo, flor. Apr.

Saxifraga alba radicibus granulofis, floret Maio.

Saxifraga montana folijs quinis flore purpureo: alia ſeptenis flore ex albo pallescente, floret ad finem Martij in horto meo.

Saxifraga aurea Dodonei, flor. Apr.

Saxifraga aurea Dodonei florebat Feb. cum tepidior ille eſſet.

Saxifraga lutea, umbella parua, floribus albis ſui generis, radicibus luteis, flor. Iul.

Saxifraga ſemen fert Nouemb.

Scabioſa, (trium aut quatuor generū,) floret in fine Maij, Iunio, & Iulio. Pauca florent Octob. & Nouemb.

Scabioſa læuis, flor. Octob.

Scabioſa læuis & hirsuta minor, floret Iulio.

Scabioſa læuis & hirsuta minor, inſipida ferè & hirsuta maior in montibus florèt Auguſto.

Scabioſa maxima incipit florere Iunij medio. Item communis læuis & media aſpera, floret vt prima.

Scabio-



## Scabiosæ

Hirsuta folijs

Semper integris, in collibus & montibus, humidioribus locis.

Diuisis, in der spitaler wysen alicubi.

Læuis, plenus est ager polij hac herba, flor. Iul. decimo simul omnes.

Scolymus, cinara, Artischoek / floret Iulio.

Scordium, floret Iun.

Scordium in horto meo, floret Iulio, & Augusto.

Scorpioides secundum aliquos herba palustris odore borraginis, flosculis cœruleis, &c. vergiß nit mein / floret Maio, Iunio, & Iulio.

Scorpioidi palustri cœruleæ cognata herba, sed floribus albis, nec ita in se retortis, floret Martio.

Scorpioides minus, in muris, Fleiner uergiß nit mein / flor. Apr.

Scorpioides Matthioli in horto meo, floret Iulio flosculis luteolis, binis, an semper?

Scrophularia maior, Brunwurtz / floret medio Maij. Vide Climenum.

Secale, Roßhen / non (vt alij volunt) filigo, flor. Iun.



## DE COLLECTIONE

Securidaca, flor. Iul.

Sedum, id est, semperuiua, & species eius vermicularis dicta, florent Iunio.

Sedum maius vulgare, flor. Iul.

Sedum minus (vulgare) album & purpureum, flor. Iul.

Sedum minus obtusioribus folijs, flor. Iunio.

Sedi genus tertium, illecebra, **Maurpfeffer**/floret Maio.

Sedi montani genus, **fischzung** / floribus candidis, guttis sanguineis, vt sanicula alpina, flor. Maio.

Sedi vel Phylli montani genera quædam, vnum longè minimis foliolis in orbem circinatis candicantibus, flosculis albis. Et duo sedi minoris genera floribus croceis, maculosis perpulchris, flor. Aug.

Sferra cavallo Italis, floret Iunij principio.

Senecio, **Freutblum** / floret Martio, Aprili, Maio, Iun. Iul. Octo. Nou. & Decemb. initio: In vineis Febr. Semen facit Octob.

Serpillum, flor. Iul. Aug. Septemb.

Serpilli quædam genera, odore inter se differentia: alia pilosa, albiora, alia glabra, alia sat ureiam odore refert quàm proximè & acrimonia ferè: quædam marginibus foliorum



rum punicañtibùs, florebat Iunij initio.

Serpillum acinarium, Moosbeere/acin-  
nis rubentibus, subacidis, astringentibus, flo-  
ret Maio. Incipit autem eodem tempore in  
paucis à superioribus fructus se ostendere.

Sesamoides Anglor. flor. Maio.

Seselis genus in pratis palustribus, flo-  
ret Aug.

Seseli montanum, semen fert Aug.

Sideritidis vel geranij species, herba Ro-  
perti, Iulio floret. Herba Iudaica. (Cognata  
ci quædam ex loco umbrato, vñ dem Bard/  
in horto meo, caule quadrangulo, graui odo-  
re, floribus purpureis, tanquam vrticæ mor-  
tuæ dilutioribus.)

Sideritis prima quæ & Tetrahit, in ar-  
uis, floribus albis, flor. Aug.

Sideritis prima Matthioli : lancea Chri-  
sti, flor. Iul.

Sideritidis species, gratia Dei, flor. Ma-  
io, & Iunio, & Octob.

Sideritis prima, Vide Lancea Christi.

Sideritis, Blütwurz/floret Maij medio,  
& fine.

Silybus in montibus, überwurz/floret  
Iulio, & Aug.

Sinapis duo genera Fuchsio, florent  
Iulio.



## DE COLLECTIONE

Sinapi sylvestre vel lapsana floribus luteis in aruis, flor. Iun.

Sinapium sylvestre quoddam luteis floribus, floret Maio.

Sisarum hortense, flor. Iul.

Sisarū sylvestre Fuchsi, wildpasteney/ floret Iulio.

Siser, girgelin/ semen facit Septemb. maturescunt Octob.

Sisymbrium capitulis purpureis & albis, flor. Aug.

Sium, cardamine, Brunnenfressich/ floret Augusto.

Smilax hortensis, id est phasiolus, floret Iulio.

Smyrnum vulgo Libisticum, flor. Iul.

Solanum, floret Iulio, Aug. & Septemb.

Solanum commune & lignosum semen habet Nouemb.

Solanum perpetuum vulgò dictum aliquibus, ie lenger ie lieber/ cui flores cœrulei, acini rubri, fortè Malacocissus, floret Maio, Iunio, Iulio, & Augusto, semen facit Aug.

Solanum vesicarium, halicacabus, alkekengi, flor. Aug.

Solanum Indicum, floret medio & fine Iulij strychnodendron ad aquas stantes ferè.

Sola-



Solanum pomiferū, poma amoris vulgò, flor. Aug. Iul. Iun.

Solanū syluaticum, baccæ vna cum flore, Aprili.

Solanum syluaticum tetraphyllum, non propagat sese in horto, flor. April. & principio Maij früzle fraut.

Solanum somniferum vulgare, schlaffbeere/ flor. principio & medio Iulij.

Solani somniferi genus, flore purpurascente, cauo, instar calathi, vt hyoscyami fore, floret Maio.

Solidago Saracenica heidnisch wunde fraut/ flor. Aug. Virga aurea. Species eius alia maior neruo folij p uniceo, &c. in monte prope Sergans, flor. Aug.

Sonchus vterq;, Iunio, & Iulio floret, ci cerbita, gens distel.

Sonchus agrestis marginibus foliorum aculeatis, Augusto mense semen & flores emittit, semen fert Octob.

Sonchi genus quoddam syluestre, procerum, luteis floribus, subdulce, in horto meo, folijs non dissectis, angulosis, totum leue est, id est sine aculeis, flor. Aug.

Sonchi species, terra crispa, lactuca syluestris Gal. flor. Iun.

Sonchi vel lactuce syluestres, flor. Nou.



## DE COLLECTIONE

Sonchi species lævis, floribus lactucae paruis, luteis: herba est odore grauiore quam alia huius generis, frigidior scilicet, in muris nascitur, floret in fine Iunij, & Iulio.

Sonchi species, mulchen/ flor. Iul.

Sonchus pinguis, caulibus & neruis rubicundis, floret & semen facit Octob.

Sorbus, fructum fert Septem.

Sorbus torminalis, quam Tragus pingit, fructum fert Octob.

Sorgi, welscher hirs. Panicum Indicū vocant Parisijs, Iulio, & Aug. floret.

Spatula foetida, quam aliqui veterum xyrin esse conijciunt, flor. Aug.

Spica nardi herba vulgò dicta, flor. Iun.

Spina ceruina, flosculis viridibus circa nouos furculos conferetim erumpentibus, odoratis, odore fragorum ferè perquam suaui, flor. Maio.

Spinæ ceruinæ acini leguntur, messis tempore Iul. mense, ad croceū colorē: autumnō (initio Septem.) ad viridem: circa D. Martini diem, ad puniceum.

Sphondylium, floret Iunio, Aug. Vide Branca vrsina.

Spina alba vulgò quam eruditi oxycantham putant, floret initio Maij.

Spinæ albæ species Fuchfio, vulgò carduus



duus Mariæ, *stechfrut*/florete Iunio & Iulio.

Spina alba Dioscoridis, cardui genus, semen habet Augusto.

Spina alba quorundam fructu echini marini specie rotunda, florete Iulio.

Spina solstitialis, &

Spina citrina, Argentinæ in horto D. Didymi Obrechtii, florete principio Iulij.

Spina appendix, frutex spinosus, quem aliqui oxiacantham putant, vulgò spina alba dicitur, *wyßdoorn*, Augusto fructificat, Septemb. & Nouemb.

Spinachia olus, florete Iunio.

Stachys herba alba, hirsuta, odorata, marrubio congener, locis siccis & asperis nascens, bicubitalis ferè, caule quadrato, subacris, nulla verò amaritudine, quam suæ Stachyi Galenus tribuit, marrubio congenerem esse figura odorq; ostendunt, *μηλίξει γὰρ πῶς τὴν ὁσμὴν ὁμοίως τῷ πρασίῳ*, descriptio Dioscoridis planè cum hac herba facit. Habet non modò verticillos vt marrubium, sed stachyn quoq; id est spicam supra in qua flores partim albi, partim purpurei, figura ferè vt in vrticæ mortuæ floribus, minores, florete Iulio.

Stachys Fuchsi, *Riechender andorn*, florete Iun.



## DE COLLECTIONE

Staphisagria, floret Iulio.

Stichas, floret Iunio.

Stichas citrina, quam aliqui stichadem veterum, alij ageraton esse putant, Reinblūmen, floret Iulio.

Stramonium, folio oleracio, grauis odoris, vt venenatae herbæ frigidae. Flos conuoluu li, maior candidus: suauis odore nescio quali, medicato, alijs nuxmethel dicitur: Augustæ etiam albo flore reperiri audio, floret Aug.

Symphytum maius April. floret: semen Augusto fert.

Symphytum alterum, floret Maio, Iunio, Iulio, walmurtz.

Symphytum alterum minus flore cœruleo purpurascete, Glauwer augentrost. V. Pulmonaria, floret April.

## T

Tamarix. myrica, floret in vere, Iun. pappos verò suos fundit, in quibus nimirum semen continetur, Septemb.

Tanacetum, floret Iulio & August. semen fert August.

Tanacetum fatuum, floret in fine Iunij.

Tanacetum minus dixerim, quod Basileæ circa Birsam nascitur, locis arenosis, odore

&



& sapore tanacetum referens, imbecillius tantum: umbellis ad millefolium accedit. Ramosa est herba, multis ab una radice caulibus, cubitalis ferè, folia quoq; nonnihil ad tanaceti folia accedunt, minora. Flores sunt minuti albicantes, radix lignosa, fibrosa. Meminit eius Tragus in millefolio & tanaceto, ambigit inter utrumque, floret Iunij initio.

Tarchon, floret Iulio.

Tarchon sylvestre serratis folijs, floret Iulij medio.

Taxus floret Martio: Acinos rubros umbilicatos fert Sept.

Telephium, id est, crassula maior seu faba inuersa, ut quidam interpretantur. Sed mihi diligenter conferenti Telephium Dioscor. (quod caput in veterib. exemplaribus non legitur) eadè planè herba cum tertio sedi genere (*Maurpfäffer*) illecebra siue portulaca sylvestri (quod nomen utriq; tribuitur) esse videtur. Cæterum faba inuersa fortè fuerit epipetron Aristotelis, quod lib. 4. cap. 5. de partibus animal. etiam absolutum à terra, & suspensum diu viuere scripsit, & Hippocrates in lib. de vlceribus, ubi Cornarius non rectè ligustrum transtulit. Hippocratis locum citat Galenus lib. 4. Methodi, epipetro siccandi vim tribuens, ut doctissimus medicus



## DE COLLECTIONE

Michael Alysius nos admonuit. Eadem & Anacampseros Plutarchi in libro de facie apparente in orbe Lunari mihi videtur, quā ait euulsam etiam virere & germinare adhuc: id quod facit ferè cacumine reflexo, nimirum quia paulatim siccatur, & ceu spasmo conuellitur, ut inde veluti amoris etiam redeuntis seq; reflectentis vim quandam habere superstitiosè existimata sit. Aniculæ nostræ talem vim vocant *widerthon*, ut in Adianto Apuleij. Hoc est quod Plinius dicit, *anacampserotis herbæ amores vel cum odio depositos redire*. Varinus quoq; meminit, apud Plutarchum non rectè *anacampseros* legitur. Nec aliud apud veteres reperio.

Thaliætrum, Aprili floret.

Thlaspi quod Matthiolus pingit, *bursæ pastoris* dictæ planè similis herba, ut pro ea fallere legentem possit, adeò floribus, folijs, fructu & magnitudine totaq; specie illam representat, sed gustu acri: floret Iunio. Aliud est thlaspi Syluij, quod alliū redolet. Thlaspeos folia non sunt incisa, ut *bursæ pastoris* adultæ.

Thlaspi Lucæ Gyni, amarum, floret Iulio in horto meo, Augusto & Octobri.

Thlaspi verum Tragi in aruis nascens, folijs cauli adhærentibus, ut in sesamo, *unicau le, &*



de, & alterum multicaule in hortulo nostro,  
flore Maio.

Thlaspi allium redolens vnicaule, idem  
fortè Tragi, Maio flore.

Thymelææ genus illud (Zylānd) & Februa-  
rio & Martio flore, nisi nix impediāt.

Thymelææ generis quod nostri Zylād vo-  
cant, bacca Septemb. rubent, cum florem  
Februario ædat, vt nulli fortassis fructus a  
flore tardius perficiatur.

Thymelæa, vide Daphnoides.

Thymus, huic flos etiam pro semine est,  
Maio & Iunio flore.

Tilia vrbana, circa diem D. Vrbani ( qui  
est Maij 25.) flore, syluestris tardius quā  
latiua.

Tilia vrbana: nam syluestris sterilis est,  
Augusto fert semen.

Tithymalli quidam, vt helioscopius, &  
myrsinites, flore Februario.

Tithymallus myrtites, principio Aprilis  
flore.

Tithymallus folijs myrti ferè subhirsutis,  
vnicaulis in aruis, alibi multicaulis, flore  
Maio.

Tithymalli species myrti folio, flore Iun.

Tithymalli genus paruum in cultis, na-  
scens, quibusdam peplus videtur, flore No-  
uemb.



## DE COLLECTIONE

**Tithymallus minimus** flores & semina ostendit Augusto.

**Tithymallus heliotropius**, floret Octob.

**Tithymalli heliotropij** semina in medio Nouemb. nondum matura reperi.

**Tithymallus Helioscopius**, floret principio Decemb.

**Tithymallus Paralius albicans**, in horto meo, floret Iun.

**Tomentum** (vulgaris herba) floret in horto meo Iul. medio.

**Tormentilla**, heptaphyllum serò apparere incipit, & cum iam vites florent, Iunio floret.

**Tormentilla**, floret Iul. Aug. semen fert Augusto.

**Tormentilla**, vide Heptaphyllon.

**Tribulus terrestris** in hortis satus, floret Iun. & August.

**Trichomanes**, carpitur estate, & autumnii initio.

**Trifolij pratensis** tria genera, florent Iun. Maio, Octob. & Nouemb.

**Trifolium pratense album**, floret Iun. August. Sept.

**Trifolium pratense purpureum**, floret Iunio & Aug.

**Trifolium, steinklee** (sapore medicæ) luteis  
Tri-



floribus, nullo odore, flor Iul.

Trifolium odoratum Fuchsj, quod Mat-  
thæolus ineptè cytisum facit, omninò est Lo-  
tus, siue satina, siue potius sylvestris: vide su-  
pra, Lotus, floret Iun.

Trifolij species alta, inodora, florum co-  
rymbis flavis, circa aggeres & dumeta, nitro-  
so sapore, folijs in summo tantùm incisis, flo-  
ret Iunio.

Eiusdem puto species alia in horto meo  
sata, est Medica, flore violaceo, floret Iun.

Trifolium asphaltites, floret Iunio & Au-  
gusto.

Trifolium asphaltites verum. Primo quo  
nascitur anno, floret Iul.

Trifolium acre maculis foliorum, & ip-  
sum albis, aliquando nullis puto, in colli-  
bus siccis & aruis aliquando, floret Iun.

Trifolij genus calidius & tenuiorum par-  
tium flore purpureo, rariore (folijs minus  
latis nec maculosis) aliquando per ambi-  
tum purpurascens, acribus in gustu, ca-  
lidis in tertio gradu, nascitur in collibus,  
itemque aruis, floret in fine Iunij.

Aliud genus in area mea (Medica est) flo-  
ret Iunij fine, folijs mucronatis parum, post  
medium ferratis, flosculis purpurascens,  
sapore nitroso.



## DE COLLECTIONE

Trifolij species floribus purpureis ad cor-  
ruleum inclinantibus per corymbos quinis  
aut senis, aliquando nouenis aut pluribus  
inodora, folia leuiter post medium serrata,  
Medica est, floret Iunio.

Trinitas, das guldinlärerkrout/alba, cor-  
rulea, maior & minor, floret Februario.

Trinitatis (vt Itali vocant, nostri Hepati-  
cam auream) flo. rudimenta, cœruleo colo-  
re proximè terram se ostendunt Decemb.

Triticum, floret Iunio.

Triticum vaccinum, Brand/füweizen,  
à Trago descriptum, inutile medicinæ, viti-  
um tritici, floret Iulio.

Tussilago, Martio floret & etiam Feb. &  
Aprili.

Typha, Enospen, floret Iulio, herba nascēs  
in locis palustribus, gladioli aquatici folijs.  
Vocant autem locum palustrem Græci τῖφος  
per iota, & sic typha etiam herba scribi debe-  
ret, nisi fortè differentię gratia à typha triti-  
ci genere per y scriberetur.

## V

Valerianæ diuersæ, vna plantaginis folio,  
odoratissima, floret in Alpibus nostris, Iul.

Valeriana minima, semina fert in fine  
Maij



Maij cauliculis pedalibus cauis.

Valeriana, vide Phu.

Verbascum, floret in fine Innij, Iulio & Augusto: Germanis *wulfrant*.

Verbascum murale, in muris ciuitatis nostræ flores lutei in pappos soluuntur, vt in Conyzis in corymbis, floret Aug.

Verbasci genus apicibus purpureis, floret Aug.

Verbascum similis herba in muris nascens, flore luteo, &c. in nullo vsu, floret Sept.

Verbenaca supina, vt ego nomino, consolidam quibusdam dicta, flore cœruleo, *Blauw oder guldin gunsel*, floret Maio & Aprili.

Verbena, floret Augusto & Sept. semen fert Octob.

Verbena fœmina seu supina Fuchsiij circa canis ortum floret, & colligi debet. Item verbena recta & mas floribus luteis, sed aliquando citius. Sed posterior erysimi herbæ poti<sup>9</sup>, aut sinapis similium (nasturtij, erucæ) genus syluestre fuerit: nā cum verbena nihil commune habet.

Verbena lutea Fuchsiij, floret Aug. & Sep.

Verbena altera Fuchsiij, floret Iun.

Verbena alba in locis vmbrosis, flor. Iul.

Verbena quædam rarior (è prouincia)

P



## DE COLLECTIONE

pulchrior & maioribus floribus, si benè me  
mini, floret Iul,

Veronica, Erenbryß, floret Iunio.

Vetonica, floret Maio.

Vetonica, vide Betonica.

Viburnum: vide vitis sylvestris, floret Au  
gusto.

Vicia, floret Iunio.

Vicia minor, vogel wick, filique subrubre  
antequam maturescant, floret Maio. Tüben  
wick. Vicia maior, ist schier wie erbs, eodem  
floret.

Viciæ genus floribus flavis, vide Aphace.  
Viciæ quædam species (an Aphaca) angu  
stioribus, longioribus folijs, locis humidis,  
floribus è cœruleis ferè, ad ripam lacus, flo  
ret Iunio.

Alia flore luteo, folijs binis: an orobus syl  
vestris? floret Iunio.

Viciæ sylvestres, florent Iun.

Vicia quædam sylvestris (circa sepes & a  
libi) floribus cœruleis, floret Iul.

Vicia montana, folijs latioribus, floribus  
subcœruleis, radice nigra. Vicia floribus ru  
bicundis: Vicia sylvestris flore purpureo,  
florent Maio.

Vincetoxicum, vide Asclepias.

Violæ Martiæ purpureæ seu nigre odo  
ratæ



rata & inodoræ: item albæ, quæ nigris præueniunt, florent. Mart.

Viola purpurea vel Martia, Iunio semen fert.

Violæ nigræ syluestres, florent Aug.

Viola matronalis Fuchsi, alba, purpurea, punicea, quam aliqui bacharin esse putant. Fuchsius hoc nomen ad imitationem vocis Germanicæ, *Frauwen veiol*, effinxit, nos quod circa pentecostem florere incipiant, vocamus *pfingstnägele*, floret medio Maij, Iulio & August.

Viola trinitatis vel septicolor, heptachr<sup>9</sup>, floret April. Maio, Iunio, Octob. Nouemb. Decemb.

Violæ purpureæ odoratæ, inodoratæ & septicolores dictæ, florent April.

Violæ inodoræ genus, quam vulgò Trinitatis appellant, à triplici colore florū, aliqui iaceā, Iul. mense & flores & semina edit. Itali Trinitatem vocant hepaticam terrestrem.

Violæ inodoræ, quas nostri vocant septicolores, Iulio mense florent & semina proferunt.

Viola inodorata, quam septicolorem dicimus, floret Sept.

Viola multicolor inodora, floret Maio.

Viola quædā anonymos inodora est, è vio



DE COLLECTIONE

lacco purpurea, inter fruges (Auicularia Syl-  
uij) floret Iunio.

Violæ genus inodorum, in aruis, albicās:  
in hortis purpureum & maius colunt, floret  
Augusto.

Viola flammea, vt quidam vocat, Caryo-  
philli Indici vel Portugallici, floret. Sept.

Viola dasypus, vide paulo ante in Clema-  
tide.

Viola alpina, folijs asari minoribus: floscu-  
lo cœruleo; campanulæ instar conglobato,  
sed minutatim dissecto, floret Maio.

Virga aurea, solidago Saracenica, floret  
Iulio.

Virga aurea, vide Solidago.

Virga sanguinea Plinij (quam aliqui cor-  
num fœminam putant) Itali sanguanum vo-  
cant, hartrygel, floret Maio & Iunio: semen  
fert Septemb.

Viscum, veris initio floret.

Viscum baccas fundit Septemb. & Octo.

Vitis sativa floret Maio & Iunio, & quæ-  
dam Iulio: locis verò calidioribus fructum  
profert Iulio & Augusto, & Septembri.

Vitis alba & nigra, floret Maio.

Vitis Idæa, heidelbergere, vt ego ex Theo-  
phraستي descriptione interpretor, floret Ma-  
io: acinos suos cum cerasis maturat mense  
Iunio



Iunio & Iulio. Itemq; moosbery, vitis Idæa maior Sueuis sic dicta.

Vitis Idæa duplex in alpibus nigra & rubra, cuius acini acidiores sunt, sine umbilico, maturescunt Augusto.

Vitis sylvestris caustica, nielen, quam & viburnum aliqui vocant, ab usu viendi. Galli viornam vulgò. Fuchsius non rectè vitem nigram facit, Iulio & Augusto florent: semē profert Augusto, Octob. & Nouemb.

Vlmus ante folia florem Martio producit, qui & fructus eius est.

Vlmaria, in fine Iunij floret: semen fert Septembri.

Vlmaria, vide Barba caprina.

Vnifolium palustre, läberblümly alicubi, semen Iulio fert.

Vrticæ, florent Iunio & Augusto.

Vrtica mortua flore purpureo, Martio floret.

Vrtica mortua, Binsaug, floret Aprili, & Augusto.

Vrtica mortua, floret Octob.

Vrtica mortua, Galliopsis, floret Decem. principio, & semen facit Augusto.

Vrtica mortua, Lamium, floret Maio.

Vrtica mortua, & cognata ei quædam in ripa lacus nostri, conceptaculis florum spi-



## DE COLLECTIONE

nos. Vim habet discutiendi, floret Iul.

Vua crispa, Fruselbeere, floret Mart. April. Maio.

Vua crispa, Galli grossularium vocant, unde Germanica vox corrupta videtur, nimirum quod acini eius crassi quodammodo, hoc est, pleni, & solidiusculi sint, maturescunt Iunio: Fructui præpilantur reliquæ floris, etiam maturo.

Vua quercina circa radices quercuum, sub terra vere inuenitur, ut Christophorus Encelius observauit.

Vulneraria quædam corymbis florum luteis, dulcibus, glauis quibusdam, non rectè. Flores sunt penè wie gälte tubent röp fle/has senflee, floret Maio.

Vuularia siue campanula vulgaris, halskraut, alia quàm laurus Alexandrina, quam aliqui vuulariam vocant, floret Iulio.

Vuularia maior, flore intus piloso, ex cœruleo purpurascēte. Campanula, halskraut, floret Aug.

Vuularia minima, Glauwer augentrost: cuius flos calathi vel campanulæ instar, cœrulei coloris est, herba lactescit, nascitur in muris & locis saxosis, floret Aug.

Vuularia pratensis, Grune gloggenblumen, vide Rapum syluestre, floret Maio.

Vuula-



Vuularia illa quæ flores cœruleos habet,  
qui prodeunt è singulis per caulem folijs al  
ternatim positis, multos verò & conferctos  
in summi caulis corymbo, floret Iun. Hæc  
puto humilior & pratensis est. Item altera  
maior, in horto meo, durat annos aliquot,  
radicibus puto se propagat, floret itidem  
Iunio.

Vuularia, vide Rapum syluestre petræū.

## X

Xanthium, Lappa minor, Flein Fletten, se-  
men habet Sept. & Octob.

Xiphion siue gladiolus, floret Iun.

Xiphium radice simplici Curio missum,  
floret Iulio.

## Z

Zea, spelta, Einfoirn, floret Iunio.




# TABVLA SE-

CVNDA STIRPIVM NOMINA  
LATINA ET GERMANICA

continens, quæ singulis mensibus  
aut florent aut fructum  
maturant,

IANVARIO FLORENT.

 I frigidior sit, vt solet apud nos, nullæ  
florent stirpes, nisi paucae forsan in  
cellis aut hypogeis incluse: Sin tepi-  
dior, circa finem eius aut florent, aut  
florere incipiunt, eadem quæ Februario. Circa  
medium huius mensis, locis præsertim apricis,  
flore

Arthritica, cui flores singuli in singulis petio-  
lis: hæc tepida ferè hyeme tota floret, & inde vsq;  
ad aprilem, Schlüsselblümle.

Chelidonium minus, Flein schellkraut.

FEBRVARIO MAXIME CIRCA  
finem, & locis calidioribus, florent.

Alfne, hennerderm, albis flosculis.

Alfins cæruleis flosculis.

Arthritica, de qua in Ianuario.

Arthri=



*Arthritica communis syl.*

*Asarum*, haselwurtz.

*Bellis*, Mäulenblümen.

*Buxus*, Buchsbaum.

*Chelidonium minus*, klein schellwurtz.

*Codiaminum*.

*Cornus interdum*, thierlinbaum.

*Coryli*, haselstand.

*Consiligo*, leüßfraut.

*Crocus montanus*.

*Elleborus niger*, Christwurtz.

*Erica montana*.

*Fragaria sterilis*.

*Fumaria*, erdrauch.

*Leucoium bulbosum*, wyß Hornung Blümen.

*Myagrus*.

*Petasites*.

*Saxifraga aurea*, guldin steinbrey.

*Senecio*.

*Tithymallus Helioscopius*.

*Tithymallus myrsinites*.

*Trinitas*, guldin läber fraut.

*Tusilago*, Roßhub/Brandlattich.

*Zyland*.

# MARTIO FLORENT.

*Alfne duæ species*, hânendarm.

*Anemone species*, Anemon rößlin.

*Aristolochia phragmites*.

*Arthritica species*.



# MARTIVS.

- Arum, teut scher pfäffer.  
 Azarum, Haselwurtz.  
 Bellis minor, Nüllenblümlin klein.  
 Betonica Pauli Turnero.  
 Bulbus syluestris. Ackerzwibeln.  
 Bulbina minor & maior.  
 Bursa pastoris, Teschelkraut.  
 Caltha palustris, Moßblümen.  
 Clematis, peruinca, Blauw vnd Braun syno  
 grün/yngrün.  
 Consiligo, Reußkraut.  
 Cornus, Thierlinbaum.  
 Corylus. Haselstaud.  
 Crocus montanus.  
 Erica montana.  
 Fragaria minor sterilis.  
 Gramen duriusculum, Riedtgras.  
 Hedera terrestris, Gündelrüb.  
 Helleborus vterq;, wyß vnd schwarz, Nieß=  
 wurtz.  
 Herba trinitatis coerulea, Denckenblümlin/  
 oder Dreyfaltigkeit Blümlin.  
 Hepatica terrestris vel aurea, Guldi läbero  
 kraut.  
 Hieracium quoddam.  
 Hyacinthi genera quatuor, Hyacinthen.  
 Leucoion, Keiri, Gelbnegeli.  
 Leucoion bulbosum Theoph.  
 Mercurialis syluatica.  
 Penthaphyllon minus, Klein fünffinger Frut.  
 Persicus



Persicus armeniacus, Berillen.

Petasites, Pestilenzwurtz.

Populus, Sarsbachbaum.

Prunus sylvestris, Schlehdorn.

Pulmonaria, Lungenkraut.

Ranunculi genus primum, Ranenfuss / Moß  
blumen. & Ranunculi genus quartum.

Ribes, S. Johans treibel.

Ruscus, Meißdorn.

Sabina foemina, Seuybaum.

Saxifraga aquatica.

Saxifraga montana.

Salices, Wydenbaum.

Senecio, Creützfrut.

Taxus, Ibenbaum.

Thymelææ genus, Zylant.

Thussilago, Rossbüß.

Viola martiæ diuersæ, Violen.

Ulmus, Ulmerbaum.

Urtica mortua purpureo flore.

Vua crispa, Kruselbeer.

## APRILI FLORENT.

Aegolethras, Bößblüm. *Guinßblüm / Guinßkraut*

Allium ursinum, Wald Knoblauch. *Knoblauch*

Alliaria, Knoblauchkraut.

Alnus, Erlenbaum.

Amomum falsum.

Amygdalus, Mandelbaum.

Antirrhinum, flore cœruleo. Oriant.



# A P R I L I S

*Apij* genus palustre.  
*Aquilegia*, agleyen.  
*Aristolochia phragmites*.  
*Arthritica odorata*, schlüsselblumen.  
*Arthritica alpina lutea*.  
*Arthritica pallida*.  
*Asarum*, haselwurtz.  
*Asphodelus marinus*, ein geschlecht der gold  
wurtz.  
*Bellis urbana & sylvestris*, Müllen blümle.  
*Borrago*, Buretsch.  
*Bryonia*, hundtsfürbs.  
*Bulbine*, Blaw meyen rößlin.  
*Betonica Aeginetæ*.  
*Betula*, Bircken baum.  
*Castanea*, Festenen baum.  
*Chamæmalum*, Chamomillen.  
*Calathiana verna*, Brendel blümli.  
*Caryophyllata aquatica*.  
*Cerasus omnis*, Firsy baum.  
*Chameleuce Ruellij*.  
*Chelidonium minus*, Klein schell Fraut.  
*Clematis Aegyptia*, Peruinca, Ingrün.  
*Consiligo*, Leuß Fraut.  
*Crucis flores*.  
*Consolida quædam*, gurselen/Bugla.  
*Cruciata folijs in geniculis quaternis*.  
*Cyanus montanus*.  
*Cynocrambe Fuchsj*, id est, *Merculialis syl-*  
*uestris*.

Christo



Christophoriana.

Chamaebuxus.

Caros, Kümmch.

Cerisolum, Rôiblyfraut.

Calceoli diuæ Mariæ.

Caltha palustris.

Daphnoides Fuchsj, Zyland.

Daucus quidam sylvestris.

Elleborus agyrtarum.

Elleborus vterq; weiß vnd schwarz Vieß-  
wurz.

Esula, pityusa.

Esula dulcis.

Fagus suis Iulis.

Fragaria, Erdberfraut.

Fungorum genera, Pfifferling.

Geranium primum, Storchenschnabel.

Geranium maius, vel montanum.

Gnaphalij genus, Mattenflachs.

Gramen vulnerarium.

Hedera terrestris, Gündelrâb.

Hieracium minus, dens leonis.

Heliotropio congener, Vergiß mein nütz.

Hepatica terrestris, trinitas, guldty leberfrut

Iris, Blaw gilgen.

Lapathum hortense, magnum, groß Lend-  
wurz.

Lapathi vel acetosa species.

Leucoion bulbosum.

Leucoium luteum, Geiß negeli.



# APRILIS.

Liguſtraria.  
 Liliū conuallium, Meyenryßli.  
 Liliū Mariæ, vnſer frauen gilgen.  
 Lithoſpermon, Meerhriß.  
 Lunaria Græca.  
 Lunaria lutea, abyſſos quorundam.  
 Meſpilus, Eſpelbaum.  
 Myrrhis, Wilderforſſel.  
 Narcifſus quorundam, quibuſdam liliū diuæ  
 virginis.  
 Naſturtium pratense, Wyſſen Freſſich.  
 Naſturtium petraeum.  
 Nux iuglans, Nußbaum.  
 Ocimoides purpureum.  
 Ornithogalum, Erdnuß.  
 Oxys, Saurenſlee.  
 Pœonia mas, Pœonien roſen.  
 Pentaphyllum minus.  
 Perſicus cuiuſcunq; generis, allerley pferſich  
 bōum.  
 Petafites, peſtilenzwurtz.  
 Phu minimū ſylueſtre, Baldrian gſchlechter.  
 Phu paruum ſaxatile.  
 Pimpinella, Bibinell.  
 Polygonaton, Weyßwurtz.  
 Populus nigra, ſchwarz Sarbachbaum.  
 Prunus, Kriechen ald pflaumenbōum.  
 Prunus ſylueſtris, Schlehdorn.  
 Pſeudamomum.  
 Pulmonaria Plin. ſpecies, Kleinwalwurtz.  
 Pyretrum,



Pyretrum, Bertram.

Pyrus, Byrbaum.

Quercus Eichbaum.

Quinq; folium minus.

Ranunculi genus, quod flores Martij appellant,

Wiossbuimen, hanenfüß.

Ranunculus alpinus, petraeus.

Ranunculus hortensis.

Ranunculus sylvestris albus, Fidertsche.

Ranunculus Sardonius.

Ranunculus quem flammulam dicunt.

Ranunculus chamemali folijs.

Ranunculus humilis.

Ranunculus pratensis.

Ribes vulgò dictum, Sant Johans tressel.

Ribes sylvestre, aquaticum.

Rosa Maij sine spinis, Meyenrößlin.

Ruta pratensis, thalictrum.

Ruscus.

Salices, Wydboum.

Sambucus montana vel rubra, Holdersboum.

Sambucus aquatica.

Sanicula alpina.

Satyrion erythraicum.

Saxifraga aurea Dodonei, Steimbrech.

Saxifraga granata.

Saxifraga montana.



APRILIS.

Senecion, Creütz Frant.  
Solanum syluaticum.  
Symphytum maius, Schmärwurtz.  
Symphytum alterum minus.  
Tithymallus myrtites.  
Thymelæa.  
Tußilago, Rosshüb.  
Valeriana, Baldrian.  
Verbenaca supina.  
Vetonica, Graß blumen.  
Viola heptachrus, matronalis, Winteruiolē.  
Viola purpureæ odoratæ.  
Vitis nigra & alba puto.  
Viscum, Mistel.  
Vrtica mortua, Taubneßlen.  
Vua crispa, Kruselbeer.  
Vua quercina.

SEMINA PROFERUNT  
& fructum.

Aristolochia phragmites.  
Cyclaminum, Seuro brot.  
Hepatica terrestris.  
Nieß Beere.

MAIO FLORENT.

Abietes, Sannen.  
Absinthij species, Wurmet.

Acer



- Acer maius*, Thorn.  
*Acorus falsus*.  
*Alismatis species*, Archus Fuchf.  
*Alliaria*, Knoblauchfraut.  
*Allium alpinum*.  
*Allium vrsinum*, Waldknoblauch.  
*Alfne species*.  
*Alysson Plinij*.  
*Alysson Ruellij*.  
*Anagallis aquatica*, Wasserpungen.  
*Angelica inodora*, Angelicken.  
*Angelica odorata*.  
*Antirrhinum*, Oiant.  
*Aparine*, Klebfraut.  
*Aphace Fuchfij*.  
*Apij aquatici genus*.  
*Aquilegiae genera omnia*, allerley agleyen.  
*Asclepias*, Schwalbenwurtz.  
*Asparagus*, Spargen.  
*Argemone*, Genserich.  
*Aristolochia clematis*, Geschlecht der Oster-  
 Incey.  
*Argentaria alpina*.  
*Barba caprina*.  
*Barba senis*. Habermarck.  
*S. Barbaræ herba*.  
*Barba hirci*, Bocksbart.  
*Bellis maior*, Mullenblümlin.  
*Betonica*, Battonicken.  
*Betonica Aeginete*, Turnero.

Q.



# M A I V S.

*Betonica species minor*, Friesnägelt.  
*Bistorta maior*, Viaterwurz.  
*Borrago*, Buretsch.  
*Brassica*, Rabiß / Edel Kraut.  
*Bryonia, vitis alba*, Hundstürbs.  
*Englossus Italica*.  
*Cacalia lutea*.  
*Calceoli D. Mariae*.  
*Caros albus & purpureus*, Wyßtümich.  
*Caryophyllata urbana. & sylvest. Benedicta*  
*wurz*.  
*Caucalidis species, caro similis*.  
*Cerisolum, chærephyllon*, Rößbly Kraut.  
*Chamæcyparissus*, Cypress.  
*Chamædry similis*, Schaffkraut.  
*Chamæpithys*, Je lenger je lieber.  
*Chamæsyce*.  
*Chamæsyce flore unico, paruo*.  
*Chelidonium maius*, Großschelkraut.  
*Chalidonium alpinum*.  
*Cheiri*, Gälbe negeli.  
*Chondrilla*.  
*Christophoriana, costus niger*.  
*Chrysanthemon Fuchs. Hanenfuß*.  
*Cicuta*, Scharling.  
*Cicutaria minor*.  
*Clematis purpurea*.  
*Colytea Fuchs*.  
*Consiligo, Letißkraut*.  
*Conuoluulus aruensis*, gschlecht der windt.  
Cono



- Conuoluulus separius.*  
*Conyza alpina.*  
*Cornus foemina*, Thierlin boum.  
*Cotula foetida*, Hundsdill.  
*Cruciatarubiae congener*, Gulde waldmeyer.  
*Cucumis erraticus.* (ster.  
*Cyanus*, Kornblumen.  
*Cyanus montanus.*  
*Cynoglossa*, flore puniceo, gschlecht der hunds  
*Cynorrhodon.* (zungen.  
*Daucus Tragi.*  
*Dictamnus vulgo dicta.*  
*Digitalis Fuchs*, Fingerhut.  
*Doronicum vulgo dictum.*  
*Eruca hortensis*, Weisser senff.  
*Eruca sylvestris Fuchs.*  
*Eruca sylvestris nostra.*  
*Eruca sylvestris foetida.*  
*Eryngium*, Raddistel/manstreuw.  
*Erysimum*, Hederich.  
*Esula.*  
*Esula scabiosa non floret.*  
*Flos Iouis.*  
*Fraga, alba, rubra*, Erdbeere.  
*Fraxinus aucuparia.*  
*Fraxinella.*  
*Fungorum genus praecipuum*, Psifferling.  
*Genista mator*, groß pfrimen.  
*Genistella*, klein pfrimen.  
*Geranium*, Blütwurz.



# M A I V S.

Geraniij genus secundum, Storchenschnabel.  
 Geranium montanum.  
 Gladiolus aquaticus.  
 Graminis genera diuersa, allerley grass.  
 Gramen Fuchsj.  
 Gramen collinum.  
 Gerontopogon.  
 Geum, Benedicftenkraut.  
 Gratiola  
 Hedera terrestris, Gündelreb.  
 Heliotropium flore albo, Krebskraut.  
 Hieracium, Habichtkraut.  
 Hyoscyamus vulgaris, Bilsamkraut.  
 Iberis, Bauchblüm.  
 Illecebra, Maupfeffer.  
 Iris, Blauwogel.  
 Iris minor sylvestris.  
 Isatis sylvestris, Wilderweyd.  
 Iuniperus, Weckholterstaud.  
 Lampsana, Wildsenffkraut.  
 Lantana frutex Italicorum.  
 Lappathi genera 4. Lendywurtzen/Grindwurtzen geschlechter.  
 Lathyrus, Springkorn.  
 Lens palustris, Meerlinse.  
 Leucoion, Keiri, Gelb negeli.  
 Leucoium puniceum.  
 Leucoium roseum.  
 Leucoium album.  
 Ligustrum, Beinhülzen.

Lilium



- Lilium conuallium*, Meyenrößlin.  
*Lilij* genus, quod pro *Asphodelo* vsurpatur.  
*Lilium rubrum*, Rottgilgen.  
*Lilium aquaticum*.  
*Lingua herba*, Mäterzung.  
*Limonium nostrum*.  
*Lithospermon*, Meerbirß.  
*Lithospermon minus*.  
     *Unicaule*  
     *Multicaule*.  
*Locusta*, Müßlefraut.  
*Lunaria Græca*, Monefraut.  
*Lunaria*, Glüblumen/gäl.  
*Lunaria montana*,  
*Lunaria lutea*.  
*Lupinus*, Feigbaum.  
*Malorum genera*, Villerley öpfelbüm.  
*Malua sylvestris*, Wildpapelen.  
*Medica cærulea*.  
*Meliloti sylvestris species*, Wilderstein Flee.  
*Meliloti inodori species*.  
*Melissa Fuchsi*.  
*Melampyrum*, Rüweysen.  
*Mercurialis*, Scheißkraut.  
*Mercurialis syluatica*.  
*Millefolium aquaticum*.  
*Moschatella Cordi*.  
*Myagrus*, Flachedotter.  
*Myrrhis, cicutaria*, Wilderförsfel.  
*Narcissus*, Narcisen blümlin.



# MAIVS.

*Nasturtium*, Kressich.  
*Nasturtium palustre*, Brunenkressich.  
*Nigella*, Schwarzkümmel.  
*Nummularia*, Pfennigkraut.  
*Nux vesicaria*, Dimpelnäse.  
*Nymphaea* vtrag, Seebäumen.  
*Ocimoides rub. alpinum*.  
*Ocimoides album*.  
*Olusatrum*.  
*Orchis genus bifolium*, Geschlecht des En-  
benkrauts.  
*Orchis herbe genera quaedam*.  
*Orchis genus rarum*.  
*Orminum sylvestre*, Wilderscharlach.  
*Orobancha nostra*.  
*Oxalis*, Saurampferen.  
*Oxyacantha*, Erbselen.  
*Oxys, aleluia*, Sauwolle.  
*Paeonia*, Deonien.  
*Papaver cornutum*, Gehörnter Magsamē.  
*Paris herba*, Wolfsbeer.  
*Parthenium*, Mütterkraut.  
*Pecten veneris*.  
*Pelecinus sylvest.*  
*Pentaphylli tria genera*, Waldwinden.  
*Periclymenon*.  
*Peplus*, Teufelsmild.  
*Peucedanum*.  
*Phu*, Baldrian.  
*Phyllirea nostra*, Kerngarten.

Piceae



Piceaster.  
Pilosella maior & minor, Nagelkraut.  
Pimpinella, Bibinell.  
Plantagines, Wegerich.  
Polygonatum, Weyßwurtz. vtrunq.  
Polemonium.  
Polium nostrum.  
Porrum, Lauch.  
Prunella vulgaris, Braunnellen.  
Pseudochamedrys, Gamenderly.  
Pulmonaria Gallica, Lungenkraut.  
Quinq; folium minus, Fünffingerkraut.  
Quinq; folium aquaticum.  
Ranunculi genera hortensia et sylvestria, allee  
Raphanus maior, Rettich. (ley benenfuß.  
Rapi sylvestris genus.  
Rapunculi syl genus, flor coeruleo.  
Ribes vulgò dictum, S. Johans kreibel.  
Rose, Rosen.  
Rosa minor, Meyenrößlin.  
Rose alba, Weyßrosen.  
Rose incarnate, Leybsarbrosen.  
Rosmarinus, Rosmarin.  
Rubia minor, & syl. zame vnd wilde rötte.  
Rubus humilis, Niderb: ombeerstaude.  
Rubus idaeus, Hinderbeere.  
Ruta, ruta pratensis, Rauten.  
Sabina, Senybaum.  
Sambucus aquatica Tragi, Bolder.  
Sanicula guttata, alpina, Sanickel.



# M A I V S.

*Sanicula.*  
*Sanguinea virga.*  
*Saxifraga alba, Wyffersteinbrech.*  
*Satyrium basilicum.*  
*Scabiosa, Apostemfraut.*  
*Sclarea sylvestris.*  
*Scorpioides, Vergiß mein nit.*  
*Scrophularia mas, Brunwurtz.*  
*Sedigenus tertium, Maurpfäffer.*  
*Sedum mont. Fischzung.*  
*Serpillum acinarium, Moosbeere.*  
*Sesamoides Anglor.*  
*Seselis genus, Bärwurtz.*  
*Sideritis, gratia Dei, Gottes gnad.*  
*Sideritis. Blüt wurtz.*  
*Sinapium syl. Wilder senff.*  
*Spina alba, oxyacantha, Erbselen.*  
*Spina ceruina.*  
*Spina appendix.*  
*Solani genus syluat.*  
*Solanum somniferum.*  
*Symphytum alterum.*  
*Thlaspi alterum Tragi, Wilderfressich.*  
*Thlaspi allium redolens.*  
*Tilia urbana, Linder boum.*  
*Thymus, Thym.*  
*Trifolium pratense, Wysenflee.*  
*Trifolium, Biberflee.*  
*Valeriana minima, Baldrian geschlecht.*  
*Valeriana saxatilis.*

Vene



*Veneris pecten.*  
*Verbenaca supina, guldin gunsel.*  
*Veronica, Ehrenbreyß.*  
*Vetonica sylvestris, Nütwill.*  
*Vicia flor. rubicundis, wicken.*  
*Vicia montana.*  
*Vicia sylvest.*  
*Vicia minor, vogelwicz.*  
*Viola Alpina.*  
*Viola matronalis, pfingstnägele.*  
*Viola multicolor.*  
*Viola trinitatis, denckenblümle.*  
*Viola alba & nigra, Violen.*  
*Virga sanguinea, cornus fœm.*  
*Vitis, weynrâb.*  
*Vitis idæa, Heidelbeer.*  
*Vnifolium.*  
*Vrtica mortua, taubnessel.*  
*Vulneraria, hasentlee.*  
*Vua crispa, Fruselbeer.*  
*Vuularia pratensis, Brune glockenblümle.*

## M A I O SEMINA FERUNT.

*Aegolethros, Bößblüm.*  
*Asarum, haselwurtz.*  
*Cerasa, Kirse.*  
*Fraga, Erdtbeere.*  
*Ranunculus Sardonius.*  
*Saxifraga alba, weyßer steinbrech.*



IV N I V S.

IV N I O F L O R E N T.

- Absinthium commune*, Wurmst.  
*Abietes*, Tannen.  
*Aconitum luteum, coeruleum, flauum*, Wollst.  
 wurz.  
*Acorus vulgaris*, Gälb wassergilgen.  
*Alcea*, Louwenzan.  
*Alliaria*, Knoblauchkraut.  
*Alfina italica*.  
*Alfina speciosa*, Beñendarm.  
*Amgracus*, Mayoran.  
*Anagallis*, Gauchheyl.  
*Anagallis aquatica*, Bachpungen.  
*Anagallis rubro flore*, Gauchheyl mit roten  
 blümen.  
*Androsamon*, Unser frouwen Bettstrouwe.  
*Anethum*, Dill.  
*Antirrhinum purpureū, album*, Sterckkraut  
 mit roten blümen.  
*Antirrhinum folijs hyssopi*.  
*Antirrhinum aruense*, Großer süßer flec.  
*Aphaca species*, S. Chustoffels kraut.  
*Apios quorundam*, Erdnuß.  
*Apium*, Garten eppich.  
*Apium montanum*, Berg eppich.  
*Argentaria*.  
*Arthemisia tenuifolia*, Wildercypreß.  
*Arhritica alpina*, Gschlächt der schlüßel-  
 blümen.

Aristo-



*Aristolochia clemat.* Lange osterluccey.

*Asclepias siue hirundinaria*, Vincetoxicum,  
Schwalmenwurtz.

*Ascyrhoides*, Gschlächt des S. Johannis

*Aspergula*, Kläberkraut. Kraut.

*Asphodelus*, Goldgilgen.

*Astrantia*, vulgò Laser.

*Astrantia nigra*, Schwartzmeisterwurtz.

*Atriplices*, Burckharts Kreutter.

*Auicularia Syluij.*

*Auena*, Haber.

*Ballote*, Stinckender andorn.

*Barba caprina*, Ymbenkraut.

*S. Barbara herba*, Weysser senff/S. Bara  
blenkraut.

*Bellis maior*, Geyßblümen.

*Bellis albus & ruber*, Weysser/rote müly-  
blümly.

*Betonica altilis*, Betonien/Graßblümen.

*Betonica foetida.*

*Bistorta*, Waterwurtz.

*Blattaria Fuch.* Gschlächt des wullkrauts.

*Blitum*, Meyer.

*Blitum rubrum*, Rotmeyer.

*Botrys*, Traubenkraut/Frottenkraut.

*Branca vrsina*, Bärenklauwen.

*Bryonia*, Schmarwurtz/hundstürbs.

*Bulgossium min. & ma.* Ochsenzungen.

*Bursa pastoris*, Teschekraut.

*Cepa*, Zwibeln/Böllen.

*Calamintha*, Steinmüntz.



IV N I V S.

- Calendula*, Ringelblumen.  
*Campanula coerulea*, Zäpflekräut.  
*Cantabrica quorundam*.  
*Cardiaca*, Hertzkraut.  
*Caros vulgò Carui*, Weyssen Kümmech.  
*Carduus aruensis*, Haber distel.  
*Cardui genus maculis albis*.  
*Carduus palustris*.  
*Caryophyllata*, Benediktenwürtz.  
*Cassutha, cuscutha*, Filtzkraut/flachs syden.  
*Centaureum minus*, Tausendguldin kraut/  
 Erdgall.  
*Chamaedrys vera*, Gamanderlin.  
*Chamaecyparissus*, Cypreßkraut.  
*Chamaepithys*, Ye lenger ye lieber.  
*Chamaemalum*.  
*Chamaemalum nobile*, Chamomillen.  
*Chelidonium maius*, Schellwurtz.  
*Chrysanthemum Fuchsij*.  
*Chrysanthemum verum*, Goldblüm.  
*Cicuta*, Schirling/falberkorn.  
*Cicutaria quedam*.  
*Cichorium*, Wägwurt.  
*Clymenum vtrunq;*.  
*Condrylla*, Wild Endiuien.  
*Consiligo*, Letißkraut.  
*Conuoluulus minor*, Winden / zaunglog-  
 gen.  
*Conyca species*, Dürrewurtz.  
*Conyza collina*.

Corcho-



*Corchorus*, Gauchheyl.

*Coronopus*, Krayenfuß.

*Costus hortensis minor*, Costwurgel.

*Cotyla foetida*, Hundtsdill.

*Cucumis anguinus*, Gschlächt der Cucumeren.

*Cyanus mont.* Gschlächt der Kornblumen.

*Cymini sylvestris genus*, Ritterspöly.

*Cynoglossum*, Hundtzung.

*Daucus sepiarius*.

*Dauci tria genera*, Wilde rüblin.

*Dentillaria*, aliquibus Schuppenwurz.

*Digitalis Fuchsij*, Fingerhut / fingerkraut.

*Dipsacus albus & purpureus*, Bartendistel.

*Doria herba*.

*Dulcis radix*, Süßholz.

*Ebulus*, Artich.

*Echion*, Wildochsenzung.

*Eruca syl.* Wilder weyßer sänff.

*Erysimon Fuchsij*, Federich.

*Erysimon hortense*.

*Faba*, Bon.

*Filius ante patrem*, Schoßkraut.

*Flos louis*, Himmelrößly / Marienrößly.

*Flos Portugall.* Indianische nägele.

*Foeniculum*, Fänchel.

*Fumaria*, Erdrauch / rote taubenfröppfle.

*Fungi*, Pfifferling.

*Gallion*, Gälb augen trost.

*Genista minor*, Pfingstblumen.



IV N I V S.

*Gentiana*, Rentian/Bitterwurtz.  
*Gentiana species*, Madelgeer.  
*Geranium*, gratia Dei, Gottes gnad.  
*Geraniū montanū*, Gschlächht der Storchens  
 Schnabel.  
*Gladiolus, xiphiū*, Klein Blaww schwertel.  
*Gramen minus*.  
*Gratiola minor*.  
*Helxine cyssampelos*, Winden.  
*Heptaphyllon, tormentilla*, Tormentill.  
*Hieracij genus in pratis*, Habichfraut.  
*Hirci barba*, Habermerck.  
*Hyoscyamus cōmunis & Syriacus*, Bilsam.  
*Hypericum minus*, S. Johannis fraut.  
*Iacea, D. Iacobi herba*, S. Jacobs Blum.  
*Iasminum*, Veielrāben.  
*Ibiscus*, Ybschen.  
*Intubus sativus*, Endiuien.  
*Iulia Italidis dicta*.  
*Lactuce sylvest genus procerum*, Wilder late.  
*Lagopus*, Katzenflee/basenspfädlin. (rich.  
*Lampsana flore luteo*, Wild senfffraut.  
*Lantana ital.* Kleiner mälbaum.  
*Lathyrus*, Treybörner/springföner.  
*Lauendula*, Lauendel.  
*Lens*, Linse.  
*Lepidium Aeginetæ*, Art deß sänffsfraut.  
*Ligustrum*, Kerngert.  
*Lilij genus montanum*, Art der gilgen.  
*Liliū albū, crocēū & rubrū*, Allerley gilgen  
 Gschlächht. Lina



*Linaria*, Leynfrant.

*Linum*, Flachs.

(brech.

*Lithospermum*, Meerhirs/ weyßer stein

*Lotus inodorus floribus luteis*, Ein flees  
Gschläch.

*Lotus syl.* Stundfrant.

*Lunaria Fuch.* Gschläch des Monatsfrant.

*Lupinus*, Fegbonen.

*Lichen hepatica*, Steinläberfrant. (frant.

*Lysimachia flaua*, Gälber weiderich/ schoß

*Lysimachia purpurea*, Roter weiderich.

*Malua syl. maior.*

*Malua magna*, Ernrosen.

*Marrubium*, Lungenfrant/ etlichen läbera  
frant.

*Medica sylvestris & hortensis*, Art der flees.

*Melampyrum*, Rüweissen aliquibus.

*Melilotus inodora, alba*, Steinflees.

*Melilotus crispus.*

*Melilotus agrestis.*

*Melissa Fuchsij*, Melissen.

*Mentastrium*, Wilde münz.

*Mercurialis*, Scheißfrant.

*Millefolij species*, Gard.

*Millefolium commune.*

*Myrica*, Tamarisc.

*Myrrhidis species*, Art des wilden petero  
ine.

*Narcissi species*, Unser frouwen gilgen.

*Nardus vulgaris.*



I V N I V S.

*Nasturtium*, Kressich.  
*Nigella coronata*, Schabab.  
*Nymphaea* vtrāq; Seeblumen.  
*Noli me tangere*, Springkraut.  
*Nummularia*, Pfännigkraut.  
*Ocimum Tragi*, Heydenkorn.  
*Ocymon Basilicon*, Basilien.  
*Ocymoides album*.  
*Ocymoides rubrum*.  
*Ocymoides croceo flore*.  
*Oenante*, Roter steinbrech.  
*Olea*, Delbaum.  
*Ononis*, Ochsenbräuch/heuwechel.  
*Orchis*, Unser frauen trähen.  
*Origanum commune*, Bodhen costenz.  
*Orminum* vtrūq; Scharlach.  
*Ornus*, grosser Mälbaum.  
*Ophris Fuchsi*, Zweyblatt.  
*Panaces Chironium*, Sonnenblumen.  
*Papauer Erraticum*, Kornrosen.  
*Papauer triplex*, Magsaamen geschlecht.  
*Parhenium*, Mütterkraut.  
*Pastinaca erratica umbellis luteis*.  
*Pentaphyllum erectum*, Fünffingerkraut.  
*Perfoliata rubra*.  
*Perfoliata*, Durchbrochß.  
*Perforata*, Androsomon, S. Johanskraut.  
*Periclymenon*, Späckgilgen.  
*Persicaria maculosa*, Flöbkraut.  
*Pes leonis*, Sinnauw.

Phoenix



- Phœnix, Roten wilden haber.  
 Phalangium, Wilde graß gulgenli.  
 Phu(maius) Dioscor. Baldrian.  
 Pilosella maior & minor, Nagelkraut.  
 Pimpinella, Bibenell.  
 Pyrola, Wintergrün.  
 Pisum, Erbs.  
 Plantago maior aquatica, Wasserwägerich.  
 Polymonium Fontanoni, Lidwey ch.  
 Polymonium viscosum.  
 Polium commune, Feldpolium.  
 Porrum sectium, Louch.  
 Portulaca, Bürtzelkraut.  
 Polytrichon Apuleij, Guldiwiderthon.  
 Polygonum, Wäggras/wägtritt.  
 Prunella, Braunellen.  
 Pseudochamedrys, Schaaffkraut.  
 Pseudonardus.  
 Pseudomelanthium, Ratten.  
 Ptarmice, Nütterwurtz.  
 Quinq; folium, Fünffingerkraut.  
 Ranunculi diuersæ, Allerley moosblumen/  
 hanenfuß.  
 Raphanus, Rettich.  
 Rapistrum flore albo.  
 Rapum syl. Rapunzly.  
 Rhaponticum spurium.  
 Rhododaphne min. Shürkraut.  
 Rosa, Roosen.  
 Rubia syl. species, Eschlächter der rôte.  
 R



I V N I V S.

Rubus, Brombeerstand.  
 Rubus idaeus, Hindbeere.  
 Ruta, Rautten.  
 Sabina, Senuybaum.  
 Salvia nobilis, Edle salbey.  
 Sambucus, Holder.  
 Sanicula, Sanickel.  
 Saponaria, Wesskraut.  
 Satyrion trifolium Fuchsj, Geschläch der En-  
 genkraut.  
 Satyrion basilicon quadrifolium.  
 Saxifraga Fuchsj, Maurrauten.  
 Saxifraga pimpinella similis.  
 Scabiosa, Apostemkraut.  
 Scabiosa maxima.  
 Scordium, Wasser Battenig.  
 Scorpioides coeruleum.  
 Scrophularia maior, Brauwurz.  
 Sedum, Haßwurz.  
 Sedum minus, Klaffenkraut.  
 Senecio, Creutzkraut.  
 Sphondylium.  
 Syderitis, Gottsgnad.  
 Sinapi, Sänff.  
 Sinapi syl. Wilder sänff.  
 Solanum perpetuum, Ye lenger ye lieber.  
 Solanum pomiferum, Nachtschatten.  
 Sonchus uterq;, Genß distel.  
 Sonchus levis.  
 Spicanardi vulgo dicta.

Spina



*Spinae albae species.*

*Stachis* Fuchsi, Riechender andorn.

*Stichas*, Rhein Blumen.

*Symphytum alterum*, Wallwurtz.

*Thamarix*, *Myrica*, Tamariscen holz.

*Tanacetum fatuum*,

*Tanacetum minus*, Reinfarn.

*Telephium*, Mundkraut.

*Thlaspi*, Wilder sänff.

*Thymus*, Thym.

*Tilia*, Linden boum.

*Tithymallus parallius*, Wolffs milch.

*Tithymallus myrthites*.

*Tormentilla*, Tormentill.

*Tribulus terrestris*.

*Trifolia*, Klee.

*Triticum*, Korn.

*Verbascum*, Wullkraut.

*Verbena*, Eysenhart/ eysenkraut.

*Verbena altera* Fuchsi.

*Vicia sylvestres*, Wild wicken.

*Vicia*, Wicken.

*Vincetoxicum*, Schwalmbenwurtz.

*Vitis sativa* & *sylvestris*, Weynraß zam vñ.

*Vlmaria*.

(wild.

*Viola septicolores*, Sibenfarbwen blüme

*Viola anonymos*.

(lyn.

*Virga sanguinea* Plinij, Bartrigel.

*Vrtica*, Vießlen.

*Vuularia flore caeruleo*, Balß kraut.

R 2



IVNIVS.

FRUCTVS ET SEMINA  
proferunt.

Alysson pratense.  
Azarum, Haselwurz.  
Barba caprina.  
Caros.  
Cerasus, Kirschenbaum.  
Colchicon, Zeytosen/herbstblumen.  
Fragaria maior, minor alba, Erdbeerfrant.  
Felix, Farn.  
Graminis vel auenae syl. genus.  
Graminis genera varia, Mancherley gras.  
Hordeum, Gersten.  
Lapathum oxalys, Saurampfer.  
Malus praecox, Paradyß opfel.  
Malus verna.  
Ocymoides rubrum.  
Pimpinella, Bibenell.  
Piper montanum, Zyland.  
Polymonium petraeum.  
Ribes, S. Johannis treübel.  
Viola purpurea.  
Vitis idae.  
Vua crispa, Krauselbeer.

IULIO FLORENT.

Absinthium commune, Wurmet.  
Aconitum luparia dictum, Leüßfrant.  
Aconitum caeruleum, Napellus, Wolffwurtz.  
Alcea



*Alcea*, Sigmarswurtzen.  
*Alge palust. & fluviales*, Wasser violen.  
*Alkali*, Ein meerfraut.  
*Allium hortense & sylvestre*, Knoblauch.  
*Alysson Ruellij*.  
*Amaracus*, Mayoran.  
*Ammi*, Gschlächte des Fümmeichs.  
*Anagallis purpurea*, Gauchheyl mit pur-  
 purfarben Blümlinen.  
*Anagallis aquatica maior*.  
*Androsæmon minus & maius*.  
*Androsæmon Fuchsij*, Künradt.  
*Anemone altera*, Genserich.  
*Anethum*, Dill.  
*Angelica aquatica*, Wasser angelicken.  
*Anisum*, Zeniß.  
*Anonis*, Ochsenbrech.  
*Anthemis*, Chamullen Blumen.  
*Antirrhini genus albis floribus*.  
*D. Antonij herba*.  
*Apij genera*, Eppich gschlächter.  
*Apparine*, Kleberfraut.  
*Aristolochia longa*, Osterluccey  
*Arthemisia*, Beyfuß/rot Ruggeln.  
*Asclepias*, Schwalmenwurtz.  
*Ascyron Fuchsij*.  
*Asparagus*, Spargen.  
*Aspergula*, Kleberfraut.  
*Astrantia*, Meysterwurtz.  
*Atriplex syl.* Wilder Burchhart.



IV L I V S.

Ballote, Stinckender andorn.  
 Bellis maior & minor, Metulle Blümlin.  
 Beta duo genera, Weysser vñ roter man.  
 Betonica, Bastonicken, Betonien. (golt.  
 Betonicum altile, Steinnägely.  
 Betonica Pauli.  
 Blitum (album) Meyer.  
 Borrago, Burretsch.  
 Botrys, Traubenkraut.  
 Branca vrsina, Bärenflauwen.  
 Bryonia, Hunds fürbs.  
 Buphthalmus, cotyla non foetida, Rinds au-  
 gen.  
 Bursa pastoris, Teschelfraut.  
 Cepe, Zwiebeln.  
 Calamintha tria genera, Steinmüntz ge-  
 schlächter.  
 Calamintha montana.  
 Caltha, Ringelblümen.  
 Campanula, Balgkraut.  
 Cannabis, Hanff.  
 Capsicum, Indianischer pfäffer  
 Caput monachi, halicacabus peregrinus.  
 Cardiacum, Hertz gspan.  
 Carlina, Eberwurtz.  
 Carduus sine caule.  
 Carduus aruensis maior.  
 Carduus benedictus, Cardenbenedicten.  
 Caryophyllus Indicus, Indianische nägele.  
 Caryophyllata syluestris.

Centaur



*Centaurium maius & minus*, Tausend gul.  
*Centimorbia*, Pfennigkraut. Oikraut.  
*Chamaecyparissus*, Hirtzwurtz.  
*Chamaedrys vera*, Gamanderly.  
*Chamaedrys f. Fuchsj.*  
*Chamaeleon*, Eberwurtz.  
*Chamaemalum*, Camillen Blumen.  
*Chamaepithys*, Yelenger yelieber.  
*Chamaesyce*, Gschlächter der wolffs milch.  
*Chondrylla minor*, Genß distel.  
*Cicer sylvestre*.  
*Cichorium*, Wägwurt/wäglügen.  
*Cicuta aquatica*, Schirling.  
*Cicutaria*, Wilder Krieffel.  
*Consolida regalis*, Rittersporn.  
*Conuoluulus maior*, Saunglogggen.  
*Conuoluulo similis*, Schwartz winden.  
*Conyza species*, Gschlächter d' dürrwurtz/  
oder Donnerwurtz.  
*Conyza genus tertium*.  
*Conyza muralis*.  
*Conyza palustris*.  
*Conyzoides*.  
*Corchorus quidam*.  
*Coronopus flore coeruleo*, Kränsfuß.  
*Cucurbita*, Kürbis.  
*Cumini syl genus*.  
*Cyanus*, Kornblumen.  
*Cyclaminus prima*.  
*Cyperus*, Cypreßbaum.



I V L I V S.

- Cytisus suffrutux*, Weltsch Linsen.  
*Daucus sylvestris maior*.  
*Daucus creticus*, Bärwurtz.  
*Daucus palustris*.  
*Dauci sylvestris species*.  
*Dentillaria*.  
*Dentillaria* δεντιλλάρια.  
*Digitalis duplex*, Fingerhütkraut.  
*Dipsacus*, Kartendistel.  
*Dorychnium* Monsp.  
*Draco hortensis*.  
*Ebulus*, Actenwurtz.  
*Echinopus meus*.  
*Elleborus albus*, Weyß Nießwurtz.  
*Eruca vera*.  
*Eruca sylvestris*, Wilder senff.  
*έρυκα δρύαμις* Polonor.  
*Eruca Fuchsij*.  
*Eruum Fuchsij*.  
*Eruum syl. minus*, Eruen.  
*Eryngium marinum*, Geschläch der mans-  
 treiw.  
*Erysimon hortense*.  
*Erysimon sylvestre*, Hederich wild vñ zam.  
*Esula tria genera*.  
*Esula rotunda*, πέπλος, Teüfelmilch.  
*Eupator*, Auic.  
*Eupator*, Græc. Agrimüngen oder monig.  
*Euphrasia*, Augentrost.  
*Filius ante patrem triplex*, Braun ald rot  
 weiderich. Flos



Flos Iouis, Himelrößli.

Flos Portugal, Indianische negli.

Foeniculum, Fenchel.

Foenugracum, Bockshorn/kühorn,

Fragaria, Erdbeerfraut.

Fru mentum turcicum, Türkisch Korn.

Fumaria, Kotte taubenrößli.

Gallion, Gelber augentrost.

Galiopsis, Braunwurtz.

Genista minor non spinosa & spinosa, Erda  
pfrummen.

Gentiana species, Modelgär.

Glycyrrhiza, Süßholz.

Gnaphalion, Kürfraut.

Graminis genus, gschlecht deß gras.

Gratiola.

Hasenöl.

Heliotropium minus, Flein Frebsfraut.

Heliotropij genus, Vergiß min nit.

Heidenhyssop/Bruchfraut.

Helxine, tag vnd nacht.

Helxine cyssampelos, Winden.

Herniaria, Bruchfraut.

Hirundinaria, Schwalmenwurtz.

Hyeracium pratense.

Hypericum Fuchsj.

Hyperici species maior, S. Johansfraut.

Hyppuris vtraq;

Hyosciamus, Bilsamfraut.

Hyosciamus ex Syria.



I V L I V S.

Hyssopus, Byssop.  
 Hyssopus alba.  
 Diui Iacobi flos, S. Jacobs blüm.  
 Iasminum.  
 Ibisus, Ibschen.  
 Intubus, Endinien.  
 Inula, Alantwurtz.  
 Iouis flos, Tondernägel.  
 Iua aruensis quedam.  
 Lāberblümmen. *herba d'herbe.*  
 Lactuca syl. Lattich.  
 Lagopus, Hasen Flee.  
 Lancea Christi, Vatterzünglin.  
 Lapathum aquaticum, Gschlecht der grind-  
 wurtz.  
 Lappa maior, Kletten Fraut.  
 Lauendula, Lauander.  
 Lens, Linse.  
 Lentibularia.  
 Lepidium, Pfeffer Fraut/sensffraut.  
 Leucoium marinum.  
 Libanotis Italica.  
 Libanotidis species.  
 Lichen, Brunnen läberfraut.  
 Limonium Fontanoni.  
 Linaria, Flachs Fraut.  
 Linum, Flachs.  
 Linum syl. Wilder flachs.  
 Lithospermum, Meerhirs.  
 Locusta herba, Mäglefraut.

Loti



Loti species.

Lotus sylvestris, Zigerkraut.

Lupini, Feig bonen.

Lysimachia lutea, rubra, gelb roth weiderich.

Maiorana, Mayoran.

Malva tria genera, pappelen schlecht.

Malva crispa.

Malva maxima.

Marrubium, Andorn.

Medica quaedam.

Melilotus lutea et alba.

Meliloti species, Stein fleck.

Melissophyllum, Melissen.

Mentastrium, Katzenminze.

Mentha, Minze.

Meon aquaticum.

Mercurialis, Scheiß kraut.

Millefolium, Garb.

Millefol. luteum.

Milium Indicum, Indianischer hirs.

Myrica, Tamariskenholz.

Nardus vulgaris.

Nasturtium aquaticum, Brunnen fressich.

Nigella flore luteo, Schwarzkümel.

Noli me tangere, Springkraut.

Numularia Fuchsij, Pfennig kraut.

Nymphaea lutea, Seebliumen gelb.

Ocymus duo genera, Basilgen.

Ocymoides album et rubrum.

Ononis, Ochsenbrech/höwbrech.



I V L I V S.

Oreoselinum.

Origanum vulgare, Wilder wolgemüht.

Orminum hortense & pratense, Scharlach.

Osyris, Harnkraut/flachskraut.

Panaces Chyronium.

Papauer cornutum et erraticum, & sat. Mag  
samen geschlechter.

Parthenium, Mütterkraut.

Pastinaca tria genera, geschlecht der rüblie  
nen/vnd Pastinay.

Pastinaca syl. Brennkraut.

Peecten Veneris.

Pentaphyllum, fünffingerkraut.

Peplus, Esula rotunda, teuffelsmilch.

Periclymenon, Speckgilgen.

Persicaria maculata, flöhkraut.

Pes anserinus, Seewort.

Phalangitis, Graßgilgen.

Phalangitis maior.

Phalaris, Hispanischsaet.

Phu, Baldrian.

Plantago utraq; Wegerich.

Pimpinella maior, Bibenell.

Polymonium palustre.

Polymonium.

Polycnemum.

Portulaca, Birtzelkraut.

Potamogeton, Samkraut.

Prunella, Braunnellen.

Psyllium, flöhkraut.

Pulegium



- Pulegium*, Doley.  
*Pulegium saxatile*.  
*Pulegium ceruinum*.  
*Ranunculus parvus*.  
*Ranunculus palustris*.  
*Ranunculi quidam*, Hanenfuß gschlechter.  
*Rapum syl.* Rapiungly.  
*Rapi syl species*.  
*Rapistrum*, Hederich.  
*Rhaphanus*, Rettich.  
*Rhaponticum minus*.  
*Rhododaphne vera*, Oleander baum.  
*Rhododaphne pumila*.  
*Ros Solis*, Sonnen touw.  
*Rubia palustris parua*, Kleiner ötte.  
*Rubia sativa*, Rötze.  
*Rubie species*, aspergula, Waldmeyer.  
*Rubia syluatica*, Wilder ötte.  
*Ruta*, Kautten.  
*Samsuchum*, Mayeran.  
*Salvia*, Salugen.  
*Saponaria*, Weschfrant.  
*Satyrion basilicon alpinum*.  
*Satureia*, Garten hyssop.  
*Saxifraga hircina duplex*. Stein brech artt.  
*Saxifraga lutea*.  
*Scabiosa trium aut quatuor generum*, Apo-  
 stemfrant.  
*Scolymos*, Cynara, Artischatu.  
*Scordium*, Wasser battenig.



IV L I V S.

Scorpioides Math.  
 Scorpioides quorundam.  
 Securidaca, Peltschen.  
 Sedum maius et minus, Groß vnd Flein hauf  
 wurtz.  
 Serpillum, Quendel.  
 Sisarum hortense, Gerlin.  
 Sysarum syl. wild pasteney.  
 Syderitis prima, Blüt wurtz.  
 Syderitidis species, herba Roberti.  
 Silibus. Eberwurtz.  
 Sinapis duo genera, Senff.  
 Smilax hortensis, Welschbonen.  
 Smyrnum, groß Eppich.  
 Solanum, Nachtschatten.  
 Solanum somniferum, Schlaffbeere.  
 Solanum perpetuum, Lenger ie lieber.  
 Solanum indicum.  
 Solanum pomiferum.  
 Sonchus vterq;, Gensdistel.  
 Sonchi species, Milchen.  
 Sorgi, Welscher hirs.  
 Sphondylium.  
 Spica celtica falsa. Barentappen.  
 Spina albæ species Fuchs.  
 Spina alba quorundam.  
 Spina solstitialis.  
 Spina citrina.  
 Staphisagria, Speichelfrant.  
 Stachys herba, Weiß andorn.

Stora



*Stoechas citrina*, Kein blümen.  
*Symphytum alterum*, Wallwurtz.  
*Tanacetum*, Keinfarn.  
*Tarchon*, *et syl.*  
*Telephium*, Wundkraut/forzwang.  
*Thlaspi Lucae Gyni.*  
*Tomentum.*  
*Tormentilla*, Tormentill.  
*Trifol. pratensis tria genera*, Blee.  
*Trifol. bituminosum.*  
*Triticum vaccinum*, Rüweizen.  
*Typha*, Knospen.  
*Verbascum*, Wulffraut.  
*Verbascum murale.*  
*Verbena foemina*, Eisenkraut  
*Verbena rara.*  
*Verbena recta, mas*, Eisenhart.  
*Vicia syl.* Wicken.  
*Viola matronalis*, Winter violen.  
*Viola trinitatis*, Senckenblümlin.  
*Virga aurea*, Guldinrütt.  
*Vites quaedam adhuc*, ettlich weynraben.  
*Vitis syl. caustica*, Vielen.  
*Ulmaria.*  
*Urtica mortua*, Taubneßlen.  
*Vuularia*, Heffle oder halßkraut.  
*Xiphium*, Schwertel.

IN IVLIO SEMINA PROFERVNT.

*Acer minus*, Ahorn.



IV LIVS.

*Aconitum coeruleum*, Kappenblümen.  
*Anacampteros*, Knabenkraut.  
*Anagallis*, Gauchheil.  
*Anguria*, Angurien.  
*Aron*, Teutscher jamber.  
*Beinhölzen*.  
*Barba caprina*, Geißbart.  
*Caryophyllata*, Benedictt wurtz.  
*Clematis Aegyptia*.  
*Cerasa dulcia*, Süße kirsy.  
*Eldtsbeere*.  
*Fraga rubra & alba*, Erdtbeere.  
*Lantana*.  
*Lapathi genera*, Allerley ampferen lendy  
 wurtz.  
*Lilium conuallium*, Meyenblümlin meyen-  
 ryßlin.  
*Lunaria Græca*, gschlecht des Mons faut.  
*Mala præcocia*, Paradyßopfel.  
*Mahaleb*.  
*Nigella*, Schabab.  
*Orminum*, Scharlach.  
*Periclimenon*, Speckgilgen.  
*Phu hortense*, Garten baldrian.  
*Pimpinella*, Bibenell.  
*Pira præcocia & superba*, Muscatbyrly.  
*Pira à fœno denominaa*, Höwbyren.  
*Plantago aquatica*, Wegerich.  
*Pruni genus*, Blaue friechen.  
*Pseudocyperus*.

Pulmo



*Pulmonaria*, Lungenkraut.  
*Rubus idaeus*, Hindbeerin.  
*Sambucus*, Helder.  
*Spina ceruina*, Creutz bere.  
*Viola inodora*, Dreyfaltigkeit blümli.  
*Vitis*, Weynraß.  
*Vitis idaea, maior*, Moßbeer.  
 Wyß moßblumen.

• AVGVSTO FLORENT.

*Absinthium*, Wurmet.  
*Abrotonum mas & foemina*.. Stabwurtz.  
*Alcea*, Sigmariskraut.  
*Aconitum luteum*, Rappenblumen.  
*Allium montanum*, Bergknoblauch.  
 Alprosen.)  
*Althaea*, Ibschen.  
*Alysson*, Klaffenkraut.  
*Amaracus*, Mäyeron.  
*Amaranthus*, Saimet blümē/tausendschön.  
*Ammi*, Ammey.  
*Anagallis*, Gauchheil.  
*Anacampteros*, Knabenkraut.  
*Angelica odorata*, Angelicken.  
*Angelica aquatica*.  
*Arthemisia*, Buckelen/Beyfuß.  
*Arundo*, Ror.  
*Asclepias*, Schwalmenwurtz.  
*Aster atticus* Fuchs. Sternfrut/wägstrow.



# AUGUSTVS.

*Astrantia nigra.*  
*Attractilis* vtraq;, Wilder Veldsaffran.  
*Ballote*, Stinckender andorn.  
*Balsamine veraq;*, Balsam öpfel.  
*Bellis hortensis*, syluest. maior, minor, müllen-  
 blümli.  
*Betonicum mont. duplex.*  
*Borrago*, Buretsch.  
*Botrys*, Traubenfrant.  
*Buphthalmu*, cotyla non foetida, Rindsaug-  
 kñdillen.  
*Bursa pastoris*, Teschel frant.  
*Bryonia*, Hundskurbs.  
*Calamintha montana*, Stein müng.  
*Caltha*, Ringelblumen.  
*Capsicum*, Calcutischer pfeffer.  
*Carduus asininus com.*  
*Caryophyllatae syl. genus*, Nüt willen.  
*Centaurium minus flore rubro*, Tausendguls-  
 dinfrant.  
*Chamaemalum*, Chamillen.  
*Chamaesyce*, geschlecht der wolffsmilch.  
*Chelidonium maius*, Schellfrant.  
*Chondrylla*, Wild endiuien.  
*Cichorium syluest satium*, Sam Endiuien/  
 wegwart.  
*Cici*, Wundel boum.  
*Clinopodium*. Steinpoley.  
*Cicuta*, Schirling.  
*Cnicus*, Wilder saffran.

Colo



Colchicon. Zeitloß/herbstblüm.

Consolida regia, minor, maior, Geschlecht v  
schwarz wurtz.

Conuoluulus maior, minor, Zunglogen.

Conuoluulo similis, Orobanche.

Conyza vtraq, Sürr wurtz.

Conyza aquatica.

Conyzoides caerulea.

Conyzoides in collibus.

Costi hortensis genus minus.

Cucumis erraticus.

Cucurbitarum genera, allerley Kürbisen.

Cuminum genus sylvestre.

Cyperus, Eypreß.

Cyclaminus, Seti wbrote.

Dauci genus. Wildrüblin.

Detrahit.

Dipsacus minor, Kartendistel.

Doronicum, Gemßwurtz.

Dorychnium.

Echinopus carduus.

Erica, Heyd.

Eruca, Wilder weyßer senff.

Erysimum, Bederich.

Eryngium alpinum, Mansthrerw.

Esula.

Euphrasia, Augentrost.

Eupatorium Mesuae, frömb leberkraut.

Eupatorium aquaticum.

Filius ante patrem maior & maximus, weides  
rich flein vnd groß.

S 2



# AVGVSTVS.

Flos Portugal. maior, Indianische negeli.  
 Flos Iouis, Himel rögli.  
 Foeniculum vtrunq;, Fenchel.  
 Frumentum Turcicum, Türckisch Korn.  
 Galliopsis, Braunwurtz.  
 Gentiana minor & maior.  
 Gentiana palust. Bitterwurtz gschlechter.  
 Geranium gratia Dei, Gottes gnad.  
 Geum, Benedicta, Benedicten fraut.  
 Granum Nil.  
 Helxine, tag vnd nacht.  
 Helxine cyssampelos, Winden.  
 Herniaria, Bruchkraut.  
 Hyeracium vtrunq;, Gänßdistel.  
 Hydropiper, Flöh kraut/wasserpfeffer.  
 Hypericon, S. Johans blüm.  
 Hyssopus, Byssop.  
 D. Iacobi flos, S. Jacobs blüm.  
 Ibisus, Ibisch.  
 Iberis Matthioli, Besemkraut.  
 Inula, Allantwurtz.  
 Lactuca sylvestris, Wilderlattich.  
 Lagopus, Rätzlyflee.  
 Lancea Christi, Natterzünglin.  
 Lathyrus, Springkörner.  
 Leucoia Medicorum.  
 Limonium, bistorta, Natterwurtz.  
 Linaria, Flachskraut.  
 Lotus urbanus, trifol. caballinum, Seibens-  
 zeyt.

Lupus



Lupus salictarius, Hopfen.

Ly simachij genera, gschlächter d weiderich.

Malum insanum, Dollöpfel.

Malua vulgaris, Pappeln.

Malua hortensis maior.

Malua crispa.

Marrubium, Andorn.

Marrubio similis herba.

Medica floribus violaceis.

Melilotus lutea & alba, Unser frouwen  
schüchlin.

Melilotus inodora, Steinflee.

Melon, Melopepon, Melaun.

Mentha genera, Münz gschlächter.

Mentastrum, Wilde münz.

Mercurialis, Scheyßfraut.

Milium, Hirß.

Millefolium album, purpureum, Garb.

Morsus diaboli, Teufels abbisß.

Nasturtium alpinum, Berg fressich.

Noli me tangere, Springfraut.

Nux Methel.

Ocimum, Basilien.

Ocymoides peregrinum.

Ocymoides floribus albis.

Ocymoides rubrum.

Orobanche Ruellij.

Origanum vulgare, Rohencostentz.

Oxylapathum vulgare, Lendy wurtz.

Papauer erraticum, Kornrosen.



# AUGVSTVS.

*Pastinaca erratica*, Vogelnäst.  
*Pentaphyllum petraeum*.  
*Periclymenū*, Speckgilgen.  
*Persicaria*, Pfersichkraut.  
*Petroselinum* Fuchsj.  
*Peucedanum*, Haarstrang/seiwofenchel.  
*Plantago*, Wägerich.  
*Polycnemon*, Langer doß.  
*Polymonium*, Widerstoß.  
*Porrum*, Louch.  
*Prunella*, Brunellen/guldegungel.  
*Psyllium*, Flöhkraut.  
*Ptarmice*, Mütterwurz.  
*Pulmonaria muralis*, Büchspick.  
*Ranunculus pratensis*, Moßblüm.  
*Rapum petraeum*, Augenkraut.  
*Rapistrum*.  
*Raponticum ignobile*.  
*Rosa aliquando*, Rosen.  
*Rubus maior, humilis*, Brombeer.  
*Rubia sylvest.* Waldmeister.  
*Ruta*, Kaurten.  
*Saponaria*, Wäschkraut.  
*Satyrion*, Unser frauen trähen.  
*Scabiosa*, Apostemkraut.  
*Scordium*, Wasser Rachenig.  
*Sedi vel phylli mont. genera*.  
*Serpillum*, Quendel.  
*Seselis genus*.  
*Syderitis prima*.

Sisym-



*Sisymbrium*, Visch oder wasser münz.

*Sylibus*, Eberwurtz.

*Sium cardamine*, Brunenfressich.

*Solanum*, Nachschatten.

*Solanum vesicarium*, Alkekengi, Judenkirse.

*Solanum perpetuum*, Ye lenger ye lieber.

*Solanum pomiferum*, Goldopfel.

*Solidago Sarracenica*, Heydnisch wunda  
fraut.

*Sonchus agrestis*, Hasenföl.

*Sonchi genus quoddam*.

*Sorgi*, Sorgsamen.

*Spatula foetida*, Welsch schwertel.

*Sphondylion*.

*Strammenia* Stechöpfel.

*Tanacetum*, Wurmfraut.

*Thlaspi*, Gyni.

*Tormentilla*, Tormentill.

*Tribulus terrestris*, Burtzeldorn.

*Trifolia*, Klee.

*Verbascum*, Wullfraut.

*Verbascum apicibus purpureis*.

*Verbena*, Eysenfraut.

*Verbena lutea* Fuchsj.

*Viburnum*, Schlingbaum.

*Viola matronales* Fuchsj, Winter violen.

*Viola nigra* syl. Zame vnd wilde violen.

*Viola inodora*.

*Virga dura*, Guldin rüt / Heydnisch wūd  
fraut.



AUGVSTVS.

*Vrtica*, Nessel.

*Vrtica mortua*, Taubnessel.

*Vuularia minima*, Blauw augentrost.

AUG. PROFERVNT SEMINA.

*Aconitum luteum*, Gälb wolffwurtz.

*Anemone mont.* gschlächt der fuchenschell.

*Aron*, Teütscher Ingber.

*Balsamine pomifera*, Balsam opfel.

*Botrys*, Traubenfrant.

*Cerasa duracina*, Knelkirse.

*Cornus*, Thierlinbaum.

*Corylus sativa*, Haselstand.

*Dauci genus humile*, Gschlächt des küm.

*Digitalis vtraq;*, Fingerhüt. (michs.)

*Ebulus*, Artich.

*Eruca*, Wilder weyffer pfäffer.

*Ficus in Italia*, Feygenbaum.

*Filius ante patrem maximus*, Weiderich.

*Fraga*, Erdbeere.

*Gentiana cruciata*, Gschlächt der Bitterwurtz.

*Genistella*, Pfrummen blümle.

*Herba S. Anthonij.*

*Hordeum*, Gersten.

*Hydropiper*, Wasser pfäffer.

*Hyosclamus syriacus*, Syrischen Bilsam.

*Laureola vulgaris*, Zyland.

*Lithospermon*, Meerhirs.

Lotus



*Lotus sylvest.* Wilder steinlee.

*Lunaria Græca*, Gschlächter des Monats  
Fraut.

*Lupus salictarius*, Hopfen.

*Lysimachij genus purpureis floribus.*

*Mali diuersa*, Allerley opfelbaum.

*Mala insana*, Soll opfel.

*Mercurialis mas & foemina*, Scheysßkraut.

*Morus*, Maulbeerbaum.

*Nigella*, Schwartz kummel.

*Nux iuglans*, Nußbaum.

*Ocymoides peregrinum.*

*Oxyacantha*, Erbselen.

*Pastinaca maior*, Rübli.

*Phalaris*, Canarien saamen.

*Pira diuersa*, Mancherley birein.

*Plantagines*, Wägerich.

*Polygonaton erectum.*

*Pruna diuersa*, Mancherley friechen.

*Pseudomelanthium.*

*Quercus*, Eichbaum.

*Rubus Idæus*, Hindsbeerin.

*Rubus maior & minor*, Brombeer.

*Ruta capraria*, Geyß raute.

*Sambucus*, Holderbaum.

*Saxifraga hircina.*

*Seseli montan.* Berg kummel.

*Sonchus*, Hasentöl/gänß distel.

*Sorbus aucuparia*, Vieläschchen.

*Spina appendix*, Weyßdorn.

T



AUGVSTVS.

Spina alba Diolcor. Mariendistel.  
 Symphitū magnū, Wallwurtz/schwarz.  
 Tanacetum, Wurmkraut. (wurtz.)  
 Tilia urbana, Lindenbaum.  
 Tormentilla, Tormentill.  
 Trifolium bituminosum, Hartzklec.  
 Vitis idæa, nigra & rubra.  
 Vitis syluest. caustica, Vielen.  
 Vitis sativa, Weynraß.  
 Vrtica mortua, Taubnessel.

SEPT. FLORENT.

Alfene maior, Lännendarm/vogelkraut  
 Amaracus, Meyoran. (gschlächt.)  
 Ammi.  
 Asteratticus, Fuchsj.  
 Ballote, Stinckender andorn.  
 Bellis minor, Mülleblümlin.  
 Betonicum altile, Graßnägel.  
 Borrago, Bozetsch.  
 Bursa pastoris, Täschlekraut.  
 Calendula Ringelblumen.  
 Calamintha mont. Gschlächt der Mäing.  
 Cardamomū Arabicū, Calecutischer psäffer.  
 Carduus asininus.  
 Carduus benedictus. Cardobenedict.  
 Chamemalum, Chamemillen.  
 Cichorium syl. Wilder Endiuien art.  
 Colchicon, Herpstblumen.  
 Costus hortensis.

Crocus,



*Crocus*, Saffran.

*Cucurbita*, Kürbs.

*Cyclaminū*, Seiwobrot.

*Dipsacus*, Kartendistel.

*Dorycnium*.

*Echion*, Wilde Ochsenzung.

*Ennea dynamis* Polonor.

*Erice*, Heyd.

*Filices*, Farn.

*Flos Iouis*, Himmelrößli.

*Foeniculum*, Fänchel.

*Granum Nil*.

*Hyeracium minimum*.

*Indici flores crocei*.

*Lactuca*, Lattich.

*Lactuce sylvestris* genus, Wilder Lattich.

*Lapathi* genus, Geschlecht der Ländewurß.

*Lauendula pauca*, Lauendel.

*Leucoia*, Gälbe Nägeli.

*Libanotis*, *Coronaria*, *Rosmarinus*, Roßmaryn.

*Lotus urbana*, Seibengezeyt.

*Malua quædam domestica*, Pappeln.

*Malua crispa*.

*Malum insanum*, Dollöpfel.

*Mercurialis*, Scheyßkraut.

*Morsus diaboli*, Teufels abbis

*Nasturtium*, Kressich.

*Nil granum*.

T 2



# SEPTEMBER.

*Ocymoides peregrinum minus.*  
*Pentaphyllum minus*, Fünffingerkraut.  
*Personata*, Groß Fletten.  
*Polycnemon origano simile.*  
*Prunella vulgaris*, Braunnellen.  
*Ranunculus pratensis*, Moßblümen/hanen  
*Rhapontici genus degener.* (fuß.  
*Saliunca.*  
*Satyrii genus quoddā*, Gschlächte der Stendel  
*Serpillum*, Quendel. (wurz.  
*Solanum*, Nachtschatt.  
*Trichomanes*, Roter Steinbrech.  
*Trifolium pratense flore albo*, Weysen Flee.  
*Verbascum similis*, Gschlächte des wulfrants.  
*Verbena*, Eysenkraut.  
*Verbena lutea* Fuchsi.  
*Viola inodora*, Dencenblümlin.  
*Viola flammea*, Dreyfaltigkeit Blümlin.  
*Viola autumnales caeruleae*, Gschlächte des  
 Modelgeers.

## SEPTEMBRI PROFERUNT semina.

*Acer minus*, Klein Maßholtern.  
*Acorus vulgaris*, Gälb schwerttel.  
*Alnus*, Erlinboum.  
*Amygdalus*, Mandelboum.  
*Apium*, Eppich.  
*Arbutus*, Bagdorn.  
*Balsamine utraq;*, Balsamöpfel.

*Bellis*



*Bellis*, Mäulenblümlin / Maßlieben.  
*Betula*, Birchen.  
*Bryonia*, Hundskürbs.  
*Buxus*, Buchsbaum.  
*Cardamomum Arabicum*,  
*Castanea*, Kestenbaum.  
*Cicuta maior*, Schirling.  
*Conuoluulus maior*, Winden.  
*Corylus syl.* Wildhaselnuß stand.  
*Cucurbitarum genera*, Allerley Kürbsen.  
*Dauci genus humile*, Wilder Kümmel ge-  
*Echion*, Hundszung. schlächt.  
*Fagus*, Buch.  
*Ficus*, Feigenbaum.  
*Foeniculum*, Fenchel.  
*Glycyrrhiza*, Süßholz.  
*Ilex aquifolia*, Stächend palmen.  
*Juniperus*, Reckholteren.  
*Lactuca syluest. genus*.  
*Lantana*, Kleiner mälbaum.  
*Ligustrum*, Kernigerten.  
*Mala diuersorū generū*, Mancherley äpfel.  
*Nux iuglans*, Nußbaum.  
*Nux vesicaria*, Dimpfernüßle.  
*Ornus*, Großer mälbaum.  
*Oxyacantha*, berberis, Erbselen.  
*Papauer erraticum*, rheas, Kornrosen.  
*Pastinaca erratica*, Wilde rüblin.  
*Periclymenum*, Speckgilgen.  
*Persicus*, Pfersichbaum.



# SEPTEMBER.

*Pirorum genera diuersa*, Allerley biren.  
*Plantago*, Wägerich.  
*Populi nigra*, Schwartz Sarbach.  
*Pruni genera quedam urbana*, Ziparten.  
*Prunus syluest.* Schleehenboum.  
*Quercus quedam*, Etliche Eichboum.  
*Rhamni genus*, Sandthorn.  
*Rosa*, Rosen.  
*Rubus maior*, Brombeer groß.  
*Sabina*, Seuy boum.  
*Sambucus*, Holderboum.  
*Sambucus aquatica* Tragi.  
*Saxifraga pimpinellæ similis*.  
*Siser*, Mören oder gälb rüben.  
*Sorbus*, Sperwerboum.  
*Spina ceruina*, Creutzbeer/wägdorn.  
*Spina appendix*, spina alba, Mariendistel.  
*Tamarix*, Tamarisc.  
*Taxus*, Ybenboum.  
*Thymelææ genus*, Wolfsmilch gschlächt.  
*Virga Sanguinea* Plinij, Bartrigel.  
*Viscum*, Mistel.  
*Vitis domestica*, Weynräb.  
*Vlmaria*  
*Xanthium*, lappa minor. Spitzfletsen.  
 OCTOB. FLORENT.  
*Alfinc mator & minor*, Hännendarm.  
*Althæa peregrina*.  
*Amaranthi Pliniani species*.  
*Ammi*.  
*Bellis maior & minor*, flein vnd groß mü-



lin Blümlin/maß lieben.

*Betonica altilis*, Graßnägelin.

*Borrago*, Buretsch.

*Bursa pastoris*, Teschel Frant.

*Calendula*, Ringelblumen.

*Cardamomū Arabicū*, Calcuttscher pfeffer.

*Cichorij genus*, Nulchen.

*Cicuta*, Schirling.

*Clematidis Aegyptiae genus*.

*Conyze genus*, dürrwurtz gschlecht.

*Costus hortensis*, costwurtz.

*Doronicum*.

*Erysimum hortense* garten hederich.

*Foeniculum*, Fenchel.

*Gentiana pumila*, gschlecht der Enzian.

*Herba Iulia*, frömbd leberkraut.

*Helxine*, tag vnd nacht.

*Hieracium alterum*, Rösle Kraut.

*Iberis Mathioli*, Senffkraut.

*Iouis flos purpureus & albus*, Bim Irößlin.

*Iulia herba*, frömbd läber kraut.

*Lapathum*, Lendy wurtz.

*Latoris Plinij*.

*Leucolum purpureum*.

*Libanotis coronaria*, Rosmarin.

*Lotus urbana & syl*.

*Lunaria species*, monns Frautgschlechter.

*Ocimoides*, Basilien gschlecht.

*Malva crispa*, Winter rosen.

*Nigella sativa*, Schabab.

T ↑



OCTOBER.

- Polycnemum origano simile.*  
*Prunella vulgaris*, Braunellen.  
*Ranunculi pratenses*. Weißblumen/hanens  
fuß.  
*Raphanus*, Rettich.  
*Satureia*, Hünerfülle/Isöple.  
*Scabiosa*, Apostemkraut/grindkraut.  
*Securidaca*, Peltchen.  
*Senecio*, Beinbrech/creutzwurtz.  
*Sideritidis genus*, geschlecht des Juden-  
krauts.  
*Sonchus quidam*, Basenöl.  
*Thlaspi Gyni*, Wildkressich.  
*Tithymallus heliotropius*, Milch kraut.  
*Trifolium pratense*, groß flec.  
*Viola dasypus*, geschlecht der Osterlütze.  
*Viola septicolor*, Däncken/treysaltigkeits-  
blümlin.  
*Vrtica mortua*, Taubneßlen.

OCTOBRI SEMINA  
proferunt.

- Atriplex sylvest.* wilderburchhart.  
*Cardamomum Arabicum*, Calcutischer pfeffer.  
*Carduus asininus*.  
*Cichorij genus*, Wärgwart.  
*Convolvulo similis*.  
*Cornus*, Welsch hirschen/kurbeere.  
*Cucurbita*, Kürbsen.

Fraxis



*Fraxinus*, Aeschboum.

*Helxine*, tag vnd nacht/S. Petters fraut.

*Hieracium alterum*, Teüffelsfraut.

*Iris non foetida*.

*Iuniperus*, Wäckholteren.

*Lepidium*, Senfftraut/pfeffertraut.

*Libanotidis ferulaceæ* genus.

*Ligustrum*, Kerngert/Beynhölzlin.

*Mala quædam*, etlich öpfel.

*Mespilus*, Nâsplen.

*Oxyacantha*, erbselen/weynlegelin.

*Pastinaca erratica*, Wilde rüble.

*Persica duracina*, Rotte pferfich.

*Personata*, Klettenfraut.

*Pira quædam*, etlich biren.

*Polycnemō*, origano simile, gschlecht deß wil  
den wolgemüts.

*Prunus*, Kriechenbaum.

*Prunus syl.* Schlehen.

*Ruta*, Reut.

*Sabina*, Seuenboum/seuenpalmen.

*Satureia*, Hünnerfülle/Isöple.

*Senecio*, Creütz wurtz.

*Sifer*, Gelbe rüben.

*Solanum amplexicaule*, gschlecht der nacht-  
schatten.

*Sonchus pinguis*, Basentöl.

*Sorbus torminalis*, Baum der holzbirly  
tregt.

*Verbena*, Eisenkraut.



# OCTOBER.

*Viscum*, Mistel.  
*Vitis urbana*, Weynräben.  
*Vitis sylvestris caustica*, Nielen.  
*Xanthium*, Klein Kletten.

# NOVEMBRI FLORENT.

*Arthritica inodora*, Schlüsselblumen.  
*Bellis hortensis* Mülleblümle.  
*Borrago*, Buretsch.  
*Bursa pastoris*, Teschelkraut.  
*Calendula*, Ringelblumen.  
*Carduus asininus*.  
*Cichorium sylvestre*, wägwurt.  
*Consiligo*, Leißkraut.  
*Conyza Laniflora*, groß dürrwurt.  
*Fumaria*, Erdrauch/rotte taubenkröpslin.  
*Hyssopus rara*, Kirchen hyssop.  
*Iouis flos rarissimus*.  
*Leucoia rara*, Gälbe nägelin.  
*Locusta herba*, Nüßlin kraut.  
*Mercurialis*, Scheißkraut.  
*Ocymoides*, Wildebasilien.  
*Papauer cornutum*, Nagsamen mit häsen.  
*Ranunculus*, geißblumen/moßblumen.  
*Ruta*, Rauten.  
*Saxifraga pimpinella similis*, Steinbrech.  
*Scabiosa*, Apostemkraut.  
*Senecio*, heimbrech/creutz wurtz.  
*Sonchi vel lactuca syl.* Bajenöl.

Thithy.



*Tithymali* genus paruum, Milchfraut.  
*Viola septicolor*, Sänckenblümly.

## SEMINA PROFERVNT NOVEM.

*Alnus*, Erlinboum.  
*Carduus asininus*.  
*Costus hortensis*, Costwurtz.  
*Dipsacus minor*, Kartendistel.  
*Ligustrum*, Kerngerten.  
*Papauer cornutum*, gehornter magsamen.  
*Plantago*, Wägerich.  
*Polycnemon*.  
*Rosa*, Rosen.  
*Saxifraga*, Steinbrech.  
*Solanum com.* Nachtschatten.  
*Solanum lignosum*, Je lenger ie lieber.  
*Sonchi* & *lactuca syl.* Wilder lattich.  
*Spina appendix*, Nälbeere.  
*Vitis sylvestris caustica*, Vielen.

DECEMBRI FLORENT INITIO  
 præsertim & locis tepidioribus.

*Arthritica species quædam*, Schlüsselblü-  
 men gschlechter.  
*Bellis hortensis*, Müllly blümlin.  
*Betonium altile*, grasß blümen.  
*Borrago*, Buretsch.  
*Calendula*, Ringelblümen.



DECEMB.

*Cariophylli Indici*, Indianische negeli.  
*Consiligo*, Leußkraut.  
*Cynoglossus minor*, Hundszung gschlecht.  
*Helleborus niger*, Chustwurtz.  
*Hepatica aurea*, Edel läberkraut.  
*Hypoglossis*, Zepflinkraut.  
*Hieranij species apij solijs*.  
*Laurus Alexandrina*.  
*Lithospermi florum principia*.  
*Ruscus*, Neußdorn/Feerbürsten.  
*Senecio*, Creutzkraut.  
*Tithymallus helioscopius*.  
*Viola heptachrus*.  
*Vrtica mortua*, Taubneßel.

F I N I S.



